



**សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
ផ្នែកស្ថាវិក្យាមូលដ្ឋាន**

សត្វវិទ្យា ZOOLOGY



**អ្នកនិពន្ធ
សាស្ត្រាចារ្យរង ឌុក នេង
ឧបត្ថមដោយ**



២០២១

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
ផ្នែកសិក្សាសត្វប្រមាញ់

សត្វវិទ្យា
ZOOLOGY

អ្នកនិពន្ធ
ស្រីស្រី ឌីណា ឌីណា

២០២១

កេរ្តិ៍សិទ្ធិ

© ២០២១

កេរ្តិ៍សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃសៀវភៅនេះ អាចត្រូវបានចម្លង និងផលិតឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកនិពន្ធឡើយ។

បោះពុម្ពលើកទី១ ដោយមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន (ន.គ.ស) និងកីឡា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន:

អ្នកនិពន្ធ: ឌុក ឆេង

ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៥១៨ ១៧៩/០៩២ ៨៨៨ ១៧៩/ ០៩៦៦ ៨៨៨ ១៧៩

អ៊ីមែល: seyhaduk@rua.edu.kh/dseyha@gmail.com

© 2021 Duk Chheng All right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any process with the prior written permission from the author.

First Edition

Printed in the Kingdom of Cambodia

Enquiries about the book:

Author: Duk Chheng

Mobile phone: 012 518 179/092 888 179/0966 888 179

Email: seyhaduk@rua.edu.kh/dseyha@gmail.com

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យ បំផុតមួយ ដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានវិស័យនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសន្តិភាព ត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ៨% ក្នុង មួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និង ឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្ម ពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើន សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរក ការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្រប ទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បី ចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សឺដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមាន ភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥%នៃការវិនិយោគទាំងមូល របស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជនពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ រួមមាន សហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ៧០%នៃទុនវិនិយោគ សរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយ របៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួត ប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះ

ចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលបានមនុស្សធម៌ និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះនៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សុំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួតត្រាយមាតិកាសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទាក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មពីព័ត៌មានទៅជាមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ឋ គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជាស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ស្ថានឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាស្ថានឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិ

នៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័ន ស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និង ជាពិសេសគឺការបណ្តុះបណ្តាលអំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យា កំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យ គោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះ ប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន១២០ពាន់ ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មាន ច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវីដេអូ និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយ សំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណាន ដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថាន មួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណាន កំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជា បច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និង មាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហោះចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការអប់រំពីចម្ងាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកា ឌីជីថលដែលមានភាពចម្រុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាព នៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំជាមួយ ការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្តុំនៅតាម សហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែ មានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាង ក្រោម៖

- ១. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែម ទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជា ខេមរភាសា

២. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ
៣. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
៤. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថលជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
៥. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលវេលាដើម្បីអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
៦. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលែលកចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន.” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភារូបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន. បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមានឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅ នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និងនិពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និងនិពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិត

ដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

១. ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិត នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា
២. លើកកម្ពស់ទំនើបការប្រតិបត្តិ និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវ នៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
៣. បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និង អ្នកស្រាវជ្រាវ
៤. រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌ នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការ វិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជា ខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធាន សិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណ គ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែល គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុង មួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិ ស.គ.ន រួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំថវិកាមូលនិធិ ដើម្បី រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា សូមរូសរាន់ចូលរួមដើម្បីជា គុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទូទូចនិងថ្លៃថ្លានៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិត ឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់
នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តថវិកាមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និងនិងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និងនិង ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្នើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ ឬរូបភាព ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះ គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឡើយ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

សៀវភៅ សត្វវិទ្យា នេះអាចបង្កើតចេញមកបានក៏ដោយសារមានការចូលរួម និងការផ្តល់វិភាគ ទានយ៉ាងធំធេងពីបណ្តាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត សាស្ត្រាចារ្យ និងសាស្ត្រាចារ្យរង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកស្រាវជ្រាវកសិកម្មជាច្រើនរូប។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកកប្បការដល់ការពិនិត្យ ជួយកែលម្អ អក្ខរាវិរុទ្ធ ឃ្លាប្រយោគ ខ្លឹម សារអត្ថបទលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមិនខ្លាចនឿយហត់ និងផ្តល់ជាមតិល្អៗក្នុងការរៀបចំ សៀវភៅនេះដល់៖

- ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត **ខ័រ ម៉ីនថាន** សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម ក៏ដូចជាអង្គការសាមី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
- មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
- ឯកឧត្តម **សាន វឌ្ឍនា** អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
- គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមហាវិទ្យាល័យផលិតកម្មសត្វនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនៃសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដែលបានជ្រុមជ្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវ
- គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបណ្ឌិត ហែម ផាវ៉ាត នាយកផ្នែកឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន និងសមាជិក គ ណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនៃផ្នែកឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានទាំងអស់
- ភរិយា ហេ យីម ព្រមទាំងកូនប្រុស កូនស្រី ចៅប្រុស ចៅស្រី មិត្តភក្តិ ក្មួយៗនិស្សិត និងអ្នកផ្តល់ យោបល់នានាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងទាំងអស់គ្នាក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ សៀវភៅនេះ ឱ្យចេញជារូបរាងឡើង។

អារម្ភកថា

សៀវភៅសត្តវិទ្យាដ៏ស្មើនេះបានរៀបចំចងក្រងទុកជាចំណងជំនួយបួនៗនិស្សិត និងអ្នកបច្ចេកទេស។ ពិតមែនហើយ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភូមិន្ទសិកម្ម មានកង្វះខាតនូវឯកសារដ៏ច្រើន សម្រាប់ការងារស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការលើកស្ទួយចំណេះដឹងពួកគេឱ្យ បានកាន់តែប្រសើរឡើង យើងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកឯកសារ ជាភាសាបរទេសនានាមកបកប្រែឱ្យ បានសម្រេចជាកូនសៀវភៅនេះ។ សៀវភៅសត្តវិទ្យា ជាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសត្វដែលទាក់ទិននឹង មុខវិជ្ជាជាច្រើនដូចជាសរីរវិទ្យា កាយវិភាគវិទ្យា ម៉ែក្រូកាយវិភាគវិទ្យា ប្រព័ន្ធអេកូអ៊ីប៊ីយ៉ូឡូស៊ីវិទ្យា។ល។ សៀវភៅនេះមិនមានគោលបំណងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាឯកសារយោងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ។

សៀវភៅនេះប្រាកដជាមានកំហុសឆ្គងជាច្រើនដូចជាអក្ខរាវិរុទ្ធិពាក្យបកប្រែមិនសមរម្យជាដើម។ យើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលនូវការទិៀននិងកែលម្អក្នុងន័យស្ថាបនាពីសំណាក់លោកលោកស្រីអ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយសេចក្តីរីករាយបំផុត។

សៀវភៅសត្តវិទ្យានេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យរង **ឌុក ឆេង** នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភូមិន្ទសិកម្ម។ សំណួរពរនិងយោបល់អំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅនេះសូមផ្ញើទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥១៨១៧៩។

ព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ២០២៥ ស.
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា គ.ស.២០២១
អ្នកនិពន្ធ

សាស្ត្រាចារ្យរង ឌុក ឆេង

អំពីអ្នកនិពន្ធ

នាម និងគោត្តនាម ៖ សាស្ត្រាចារ្យរង ឌុក ឆេង

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ ៩៧ ផ្លូវ២២៩ DT មេតុង ភូមិព្រៃសកើត

សង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

ស្ថាប័នការងារ ៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

ឯកទេស ឬមុខជំនាញ ៖ ផលិតកម្មសត្វ



ប្រវត្តិការសិក្សា ៖

- បេក្ខជន បណ្ឌិត ២០០៥-២០០៩ ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា ប្រទេសកម្ពុជា
- បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ២០០២-២០០៤ ជំនាញ ផលិតកម្មសត្វ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា
- DESS ១៩៩០-១៩៩១ ជំនាញ ផលិតកម្មសត្វ នៅវិទ្យាស្ថានចិញ្ចឹម និងសុខភាសត្វ (IEM VT) ប្រទេសបារាំង
- បរិញ្ញាបត្រ ១៩៨៥-១៩៨៩ ជំនាញ បសុព្យាបាល នៅ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកទេសកសិកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា

បទពិសោធន៍ការងារ ៖

- ថ្ងៃទី២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០២១ ៖ សមាជិកគណៈកម្មការបច្ចេកទេសកសិកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
- ពីខែ មករាឆ្នាំ២០១២(ចូលនិវត្តន៍)ដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ៖ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងការិយាល័យការងារសង្គម
- ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ខែ មករា ឆ្នាំ២០១២ ៖ ប្រធាន ការិយាល័យការងារសង្គម មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំបង
- ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៦ ៖ ប្រធានស្ថានីយ៍ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង មាន ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំបង
- ថ្ងៃទី១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០២ ៖ អនុប្រធានស្ថានីយ៍ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំបង ៖
- ឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ៖ អនុប្រធានស្ថានីយ៍ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំបង
- ឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ៖ ប្រធានអាសនៈ នៃមហាវិទ្យាល័យ ផលិតកម្ម បសុព្យាបាល ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំបង
- ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៨៤ ៖ ប្រធានពេទ្យសត្វ ស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ។

សហអ្នកនិពន្ធ

គោត្តនាម និងនាម ៖ ឌុក សីហា
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 97 ផ្លូវបេតុង លេខ 27 បុរីខេ សេរីន ភូមិព្រៃក្រោយ សង្កាត់ស្មៅរ ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថាប័នការងារ ៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
ឯកទេស ៖ ផលិតកម្មសត្វ និងអតិសុខុមសាស្ត្រ



ប្រវត្តិការសិក្សា

- ១៩៩៨-២០០៣៖ ជំនាញ ផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល នៅមហាវិទ្យាល័យផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា
- ២០០៤-២០០៥៖ ជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអាហារ នៅ Kasetsart University, Thailand in collaboration with Cirad, Montpellier, France

បទពិសោធន៍ការងារ

- ២០១៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ៖ ត្រីទ្វេបុរសរង មហាវិទ្យាល័យ កសិឧស្សាហកម្ម នៃសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
- ២០១៩៖ អ្នកជំនាញបសុសត្វនៅកសិដ្ឋានគីរីស្លី (ក្រុមហ៊ុនគោយកទឹកដោះគីរីស្លី)
- ២០១៦-២០១៩៖ មន្ត្រី នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- ២០១២-២០១៥៖ អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសបសុសត្វថ្នាក់ជាតិ គម្រោង MALIS, FAO
- ២០១៥-២០១៩៖ អនុប្រធានសម្របសម្រួល ថ្នាក់ខេត្ត (SSP3) គម្រោងកាត់បន្ថយភាព ក្រីក្រ ខ្នាតតូចតំបន់ទន្លេសាប NCDD, IFAD AND ADB
- ២០០៦-២០១០៖ ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍អតិសុខុមសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុន Confirel Co., Ltd. និង PPM- Pharma Product Manufacturing Co., Ltd.
- ២០០៧៖ នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមន៍កសិកម្មសរីរាង្គកម្ពុជា(Cambodian Organic Agriculture Association-COrAA)
- ២០០៦-២០១០៖ គ្រូកម្រិតឧត្តមបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាស្ថាននានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
- ២០០២-២០១០៖ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា មហាវិទ្យាល័យ កសិឧស្សាហកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម។

រក្សាសិទ្ធិ.....iii

បុព្វកថា..... ii

សេចក្តីបញ្ជាក់នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍.....vii

ឧទ្ទិសកថាError! Bookmark not defined.

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ..... ix

អារម្ភកថា..... x

ការបដិសេធ xi

អំពីអ្នកនិពន្ធ.....xii

សហអ្នកនិពន្ធ.....xii

បញ្ជីវិចិត្ររូបxiv

សេចក្តីផ្តើម

សេចក្តីផ្តើម 1

ក. KINGDOM PROTISTA (Unicellular) 2

ខ. KINGDOM ANIMALIA (Multicellular or Tissue Organisms) 2

គ. ការធ្វើវគ្គនរណ៍សត្វ (Taxonomy of Animal) 4

ជំពូកទី១

ជំពូកទី១ សាខាប្រូតូសូអា (Phylum Protozoa)..... 5

១.១. លក្ខណៈទូទៅ 5

១.២. ចរិតលក្ខណៈ: 6

១.៣. សាខារងមានផ្លាសែល Sarcomatigophora(Pseudopodia or Flagellata)..... 7

 ១.៣.១ ករណីសិក្សាពី Phytoflagelles..... 7

 ១.៣.២ ករណីសិក្សាពី Zooflagelles 8

 ១.៣.៣ ករណីសិក្សាពី Trypanosoma brucei gambiense..... 9

 ១.៣.៤ ករណីសិក្សាពីអាមីប Ameba (Class Sarcodina) 10

១.៤. សាខារង មានរោមញ័រ: Subphylum Ciliophora(Ciliata) 11

១.៥. សាខារងមានស្ព័រ: Sporozoa 13

 ១.៥.១ ថ្នាក់កុកស៊ីដ្យា (Coccidia)..... 14

 ១.៥.២. Plasmodium..... 16

ក. ការបន្តពូជដោយឥតភេទ (Schizogony)..... 17

ខ.ការបន្តពូជដោយភេទ (Gamogony) 17

១.៥.៣. ពីរូបសមីដា (Piroplasmida)..... 18

ក. បាបេស្យា (Babesia).....	18
ចំណែកថ្នាក់.....	18
ប្រវត្តិ	19
គ្លីនិក	19
ចម្លងមេរោគ.....	20
លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ.....	20
វដ្តជីវិត.....	20
រោគវិនិច្ឆ័យ និង ការព្យាបាល	21
ខ. តេឡេរីយ៉ា (Theileria).....	22
ចម្លងរោគដំបូងទៅថនិកសត្វ	23
ដំណាក់កំឡុងហ្វូសែ (Lymphocyte)	23
ដំណាក់មេរូសូអ៊ីត (Merozoite).....	23
ដំណាក់ចៃ	23
រោគសញ្ញា	23
វិធានការណ៍ការពារដំណោះស្រាយ	24
១.៦. សាខារងស្នីដូស្ត្រា (Phylum Cnidospora).....	24
១.៦.១. ម៉ៃខូស្ត្រីដា (Myxosporidea)	25
១.៦.២. ម៉ៃក្រូស្ត្រីដា (Microsporidea)	26
រូបសាស្ត្រ.....	26
ចម្លងរោគ	27

ជំពូកទី២

ជំពូកទី២ សាខាពរីរ៉ា (Phylum Porifera: Sponges)	27
២.១. ចរិតលក្ខណៈ.....	28
២.២. ស្ប៉ុងសាមញ្ញ	28
២.៣. ស្ប៉ុងដរីទៀត.....	29
២.៤. បន្តពូជ.....	30
២.៥. ទាក់ទងនឹងសត្វផ្សេងទៀត	30
២.៦. ស្ប៉ុងឧស្សាហកម្ម	30

ជំពូកទី៣

ជំពូកទី៣ សាខាស្នីដារីយ៉ា: PHYLUM CNIDARIA (Coelenterata)	32
៣.១. ចរិតលក្ខណៈ.....	32
៣.២. ថ្នាក់ Hydrozoa (Hydroids).....	32
៣.២.១. ទម្រង់របស់ Hydra	33

៣.២.២. ណេម៉ាតូស៊ីស (Nematocysts).....	34
៣.២.៣. ប្រវត្តិ.....	35
៣.២.៤. បន្តពូជ.....	35
៣.២.៥. ហៃដ្រូអ៊ីត.....	36
៣.៣. ថ្នាក់ Scyphozoa (ខ្ញែសមុទ្រ).....	37
៣.៣.១. រចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រវត្តិធម្មជាតិ.....	37
៣.៤. ថ្នាក់ Anthozoa (sea anemones, corals, etc.)	38
៣.៤.១. រចនាសម្ព័ន្ធ.....	38
៣.៤.២. ប្រវត្តិធម្មជាតិ.....	39
៣.៤.៣. ផ្កាថ្ម.....	39

ជំពូកទី៤

ជំពូកទី៤ សាខាដង្កូវខ្លួនសំបែត(Phylum Platyhelminthes).....	42
៤.១. លក្ខណៈទូទៅ.....	42
៤.២. សិក្សាពីថ្នាក់ Trematoda	42
៤.៣. សិក្សាពីថ្នាក់ Cestoda (Tapeworm).....	45
៤.៣.១. ឧទាហរណ៍ ករណី Taenia Saginata	46
៤.៣.២. ឧទាហរណ៍ ករណី Taenia Solium (Pork Tapeworm)	47
ក. Taeniasis	47
ខ. Cysticercosis.....	48

ជំពូកទី៥

ជំពូកទី៥ សាខាព្រូនខ្លួនមូល (Phylum Nematelminthes)	50
៥.១. លក្ខណៈទូទៅ	50
៥.២. សិក្សាពី Ascaris lumbricoides	51
៥.២.១. ប្រដាប់រំលាយអាហារ.....	51
៥.២.២. ប្រដាប់បន្តពូជញី	51
៥.២.៣. ប្រដាប់បន្តពូជឈ្មោល	51
៥.២.៤. វដ្តជីវិតរបស់ Ascaris lumbricoides.....	51
៥.២.៥. វដ្តជីវិតរបស់ Nematode Trichuris trichiura (human whipworm).....	52
៥.៣. សិក្សាពីព្រូនទំពាក់ (Hookworms).....	53
៥.៤. សិក្សាពីណេម៉ាតូដផ្សេងទៀត.....	54
៥.៤.១. ទាក់ទងទៅនឹងមនុស្ស.....	55
៥.៤.២. ណេម៉ាតូដនៅប្រុសដំណាំ (Root Nematodes)	55
៥.៤.៣. ដង្កូវក្នុងសាច់ជ្រូក (Trichinella Spiralis)	55

ជំពូកទី៦

ជំពូកទី ៦ សាខាអ៊ីស៊ីណូដេម៉ាតា (PHYLUM ECHINODERMATAI) (ផ្កាយសមុទ្រនិងអ្វីៗដែល
ទាក់ទងវា).....57

៦.១. ចរិតលក្ខណៈ.....57

៦.២. ថ្នាក់Asteroidea (ផ្កាយសមុទ្រ).....58

 ៦.២.១. រចនាសម្ព័ន្ធ.....58

 ៦.២.២. ប្រវត្តិធម្មជាតិ.....59

 ៦.២.៣. បង្កកំណើត.....60

៦.៣. អ៊ីស៊ីណូដេម៉ាតាផ្សេងៗទៀត Other Echinoderms..... 60

 ៦.៣.១. ថ្នាក់ Ophiuroidea (brittle stars) 60

 ៦.៣.២. ថ្នាក់ Echinoidea (Sea urchins, sand dollars and heart urchins).....60

 ៦.៣.៣. ថ្នាក់ Holothuroidea (sea cucumbers: ត្រីសក់សមុទ្រ) 62

 ៦.៣.៤. ថ្នាក់ Crinoidea(ព្រលិតសមុទ្រនិងផ្កាយរោម).....63

ជំពូកទី៧

ជំពូកទី៧ សាខាដង្កូវខ្លួនកង់(PHYLUM ANNELIDA) 64

៧.១. លំនាំដើម.....64

៧.២. លក្ខណៈទូទៅ.....64

៧.៣. សិក្សាពីជន្លនជី (Class Ologochaeta:Earthworms).....64

 ៧.៣.១. លក្ខណៈខាងក្រៅ.....64

 ៧.៣.១. លក្ខណៈខាងក្នុង.....65

 ៧.៣.១. ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ.....65

 ៧.៣.១ ប្រព័ន្ធឈាមរត់ និងដកដង្ហើម.....65

 ៧.៣.១.ប្រព័ន្ធបន្តពូជ.....65

៧.៤. លក្ខណៈធម្មជាតិនិងផលប្រយោជន៍.....66

៧.៥. សិក្សាករណី ថ្នាក់ជន្លនសមុទ្រ (Class Polychaeta: Marine worm).....67

៧.៦. សិក្សាករណីល្បឿង (Class Hirudinea: Leeches).....67

 ៧.៦.១. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ល្បឿង.....67

 ៧.៦.២. លក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ល្បឿង.....68

ជំពូកទី៨

ជំពូកទី៨ សាខាអាកត្រូប៉ូត(Phylum Arthropoda) 69

៨.១. លំនាំដើម.....69

៨.២. លក្ខណៈទូទៅ.....70

៨.៣. ចំណែកថ្នាក់..... 70

៨.៤. សិក្សាថ្នាក់ Crustacea	70
៨.៤.១. លក្ខណៈទូទៅ	70
៨.៤.២. លក្ខណៈពិសេស.....	70
៨.៤.៣. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ	70
៨.៤.៤. លក្ខណៈធម្មជាតិនិងផលប្រយោជន៍.....	72
៨.៥. សិក្សាថ្នាក់ Arachnida	73
៨.៥.១. លក្ខណៈទូទៅ.....	73
៨.៥.២. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ.....	73
៨.៥.៣. លក្ខណៈធម្មជាតិ.....	74
ជំពូកទី៩	
ជំពូកទី៩ សាខា ខរដេត(Phylum chordates(.....	75
៩.១. លំនាំដើមសាខាខរដេត.....	75
៩.២. ចរិតលក្ខណៈទូទៅរបស់ខរដេត.....	75
៩.២.១. ពួរឆ្អឹងខ្នង (Notochord).....	76
៩.២.២. ពួរប្រសាទ (nerve chord).....	76
៩.២.៣. ថង់ស្រកីជាគូ (Paired gill pouches)	77
៩.៣. ចំណែកថ្នាក់សាខាខរដេត.....	78
ជំពូកទី១០	
ជំពូកទី១០ សត្វខរដេតថ្នាក់ទាប (Lower Chordates)	79
១០.១. ចំណែកថ្នាក់សាខាខរដេត.....	79
១០.២. សាខាង យូរ៉ូខរដេ (Subphylum Urochordata - Tunicate)	79
១០.៣. សាខាង សេហ្វាល់ឡូខរដេត(cephalochordata -lancelets)	82
ជំពូកទី១១	
ជំពូកទី១១ សាខាងសត្វឆ្អឹងកង(Subphylum Vertebrata or Craniata).....	86
១១.១. ចរិតលក្ខណៈទូទៅ.....	86
១១.១.១. ដងខ្នង	87
១១.១.២. គ្រោងឆ្អឹង	87
១១.១.៣. សាច់ជុំ.....	87
១១.១.៤. បំពង់រំលាយអាហារ.....	87
១១.១.៥. ប្រព័ន្ធណាមរត់.....	88
១១.១.៦. ការដកដង្ហើម.....	88
១១.១.៧. តម្រងនោម.....	88
១១.១.៨. ខួរក្បាល.....	88

១១.១.៩. ក្រពេញអង់ដូត្រីន.....	88
-------------------------------	----

ជំពូកទី១២

ជំពូកទី១២ អំពីត្រី.....	90
១២.១. ចំណែកថ្នាក់សាខាខរដេត (Classification of Phylum Chordate).....	92
១២.២. ថ្នាក់ត្រី (Fishes).....	92
១២.២.១. ថ្នាក់ត្រីអត់ឆ្អឹងថ្នាម (Class Agnatha: Jawless fishes)	93
១២.២.២. ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្ចី (Class Chondrichthyes: Cartilaginous fishes)	93
១២.២.៣. ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹង (Class Osteichthyes: bony fishes)	93
១២.៣. ករណីសិក្សា.....	93
១២.៣.១. ថ្នាក់ត្រីអត់ថ្នាម (Agnatha) :Class JawlessFishes.....	93
១២.៣.២. ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្ចីClass Chondrichthyes (Cartilaginous fishes)	94
១២.៣.៣. ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងClass Osteichthyes(Bony fishes)	95
ចរិតលក្ខណៈទូទៅនៃត្រីឆ្អឹង	96
ចរិតលក្ខណៈពិសេសរបស់ត្រីឆ្អឹង.....	96

ជំពូកទី១៣

ជំពូកទី១៣ ថ្នាក់បណ្តុកសត្វ (Class Amphibians)	100
១៣.១. ចរិតលក្ខណៈទូទៅ	100
១៣.២. ករណីសិក្សាអំពីសត្វដង្កែប	101
១៣.២.១. លក្ខណៈរូបខាងក្រៅ.....	101
១៣.២.២. ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង	101
១៣.២.៣. ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ.....	102
១៣.២.៤. ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ	102
១៣.២.៥. ប្រព័ន្ធលាមរត់	103
១៣.២.៦. ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម	103
១៣.២.៧. ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោល.....	104
១៣.២.៨. ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ	104
១៣.២.៩. ប្រព័ន្ធបន្តពូជ.....	104
១៣.២.១០. ប្រវត្តិធម្មជាតិ និងវដ្តជីវិត	104
១៣.៣. សាឡាមិនឌី (Salamanders: លំដាប់ Caudata)	106

ជំពូកទី១៤

ជំពូកទី១៤ ថ្នាក់ល្អិត (Class reptile)	108
សេចក្តីផ្តើម.....	108
១៤.១. ចរិតលក្ខណៈសត្វល្អិត.....	109

១៤.២. ករណីសិក្សា សត្វក្រពើ (Alligator)	110
១៤.២.១. គ្រោងឆ្អឹង	110
១៤.២.២. ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ	111
១៤.២.៣. ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ	111
១៤.២.៤. ប្រព័ន្ធឈាមរត់	111
១៤.២.៥. ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម	111
១៤.៣ អំពីថ្លែន	111
១៤.៤ អំពី	112

ជំពូកទី១៥

ជំពូកទី១៥ ថ្នាក់បក្សី (Class Aves: birds)	114
១៥.១. ចរិតលក្ខណៈ	114
១៥.២. ករណីសិក្សាបក្សីស្រុក (Domestic Fowl)	116
១៥.២.១. ចរិតលក្ខណៈខាងក្រៅ	116
១៥.២.២. គ្រោងឆ្អឹង	116
១៥.២.៣. ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ	117
១៥.២.៤. ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ	117
១៥.២.៥. ប្រព័ន្ធឈាមរត់	118
១៥.២.៦. ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម	119
១៥.២.៧. ប្រព័ន្ធបន្តពូជ	120
១៥.២.៨. ប្រព័ន្ធសរីរាង្គផ្សេងទៀត	121
១៥.៣. បក្សីតំណាងប្រទេសកម្ពុជា	121

ជំពូកទី១៦

ជំពូកទី១៦ ថ្នាក់មន្ត្រីសត្វ (Class mammals)	124
១៦.១. តើមន្ត្រីសត្វជាអ្វី ?	124
ក. លំនាំដើម	124
ខ. ចរិតលក្ខណៈ	124
១៦.២. ករណីសិក្សាសត្វឆ្មាស្រុក (Domestic Cat)	126
ក. ចរិតលក្ខណៈខាងក្រៅ	126
ខ. ចរិតលក្ខណៈខាងក្នុង	127
ឯកសារយោង	130

បញ្ជីវិចិត្ររូប

	ទំព័រ
រូបភាពទី១ រចនាសម្ព័ន្ធនៃ Euglena	7
រូបភាពទី៣ Trypanosoma gambiense	10
រូបភាពទី៤ អាមីប.....	10
រូបភាពទី៥ ប្រូតូសូអាឯកកោសិកា.....	11
រូបភាពទី៦ សាខាប្រូតូសូអាត	12
13	
រូបភាពទី៨ Paramecium Conjugation: បរាមេច្យូមបំបែកខ្លួន.....	13
រូបភាពទី៩ វដ្តជីវិតនៃជំងឺ Coccidiosis.....	15
រូបភាពទី១០ វដ្តជីវិត Coccidia.....	16
18	
រូបភាពទី១៣ វដ្តជីវិតនៃប៉ារ៉ាស៊ីត Babesia microti ឬ Babesia divergens ចម្លងទៅមនុស្ស.....	22
រូបភាពទី១៤ វដ្តជីវិត តេឡេរីយ៉ា (Theileria).....	24
រូបភាពទី១៥ វដ្តជីវិតនៃម៉ៃខូស្ទ័រីដា (Myxosporidea)	26
រូបភាពទី១៧ វដ្តជីវិតនៃ ណេម៉ាតូស៊ីស (Nematocysts)	34
រូបភាពទី១៨ វដ្តជីវិតនៃ ហៃដ្រូអ៊ីត	36
រូបភាពទី១៩ វដ្តជីវិតខ្មែសមុទ្រ	38
រូបភាពទី២១ វដ្តជីវិត Fasciola spp.	44
រូបភាពទី២២ ការវិវត្តក្នុង Fasciola hepatica	44
រូបភាពទី២៣ ការវិវត្តក្នុង Fasciola gigantica.....	45
រូបភាពទី ២៤ វដ្តជីវិតរបស់ Taenia saginata.....	47
រូបភាពទី២៥ តេនីញ៉ា Taenia Solium (Pork Tapeworm)	49
រូបភាពទី២៦ កាយវិភាគនៃណេម៉ាតូត	50
រូបភាពទី២៧ ភាពខុសគ្នារវាងណេម៉ាតូតញី និងឈ្មោល.....	52
រូបភាពទី២៨ វដ្តជីវិត Nematode Trichuris trichiura (human whipworm)	53
រូបភាពទី២៩ វដ្តជីវិតព្រូនទំពាក់ Hookworm.....	54
រូបភាពទី៣០ រូបផ្កាយសមុទ្រ	59
រូបភាពទី ៣២ Sea cucumbers	62
រូបភាពទី ៣៤ សាខាអាក្រូប៉ូត (Arthropoda)	69
រូបភាពទី៣២ រចនាសម្ព័ន្ធសាខាខរជេត.....	75
រូបភាពទី៣៥ ទម្រង់ទូទៅរបស់សាខាខរជេត.....	76

រូបភាពទី៣៦ ភាពខុសគ្នារវាងសត្វមិនមែនខរដេត និងសត្វខរដេត	77
រូបភាពទី៣៨ ទម្រង់ទូទៅរបស់សាខារង យូរ៉ូខរដេ	80
រូបភាពទី៤០ អាស៊ីរៀនពេញវ័យ (Adult ascidian)	82
រូបភាពទី៤១ ទម្រង់ទូទៅរបស់សាខារង សេហ្វាល់ឡូខរដេត (Cephalochordata)	83
រូបភាពទី៤២ ទម្រង់ទូទៅរបស់ត្រី ឡង់សេលេត.....	84
រូបភាពទី៤៣ ទម្រង់ទូទៅសាខាសត្វខរដេត	86
រូបភាពទី៤៤ ចរិកលក្ខណៈទូទៅសត្វឆ្អឹងកង.....	87
ក. ដងខ្លួន	87
ជំពូកទី១២	90
អំពីត្រី	90
90	
រូបភាពទី៤៥ ភាពផ្សេងគ្នានៃ ខរដេត.....	90
រូបភាពទី៤៦ ប្រភេទត្រីផ្សេងៗគ្នា	91
រូបភាពទី៤៧ ប្រភេទត្រីម្យ៉ាងរស់នៅបាតសមុទ្រ	91
រូបភាពទី៤៩ ថ្នាក់ត្រីអត់ឆ្អឹងថ្នាម	93
រូបភាពទី៥០ ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្លី.....	94
រូបភាពទី៥៣ លក្ខណៈពិសេសរបស់ត្រីឆ្អឹង.....	97
រូបភាពទី៥៦ កាយវិភាគកង្កែប.....	102
រូបភាពទី៥៧ ប្រព័ន្ធឈាមរត់កង្កែប.....	103
រូបភាពទី៥៨ វដ្តបង្កកំណើត	105
រូបភាពទី៥៩ សាឡាមិនឌី.....	106
ជំពូកទី១៤.....	108
ថ្នាក់ល្អួន (Class reptile)	108
សេចក្តីផ្តើម	108
រូបភាពទី៦១ ប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់សត្វល្អួន.....	109
រូបភាពទី៦២ កាយវិភាគសត្វក្រពើ.....	110
រូបភាពទី៦៣ លក្ខណៈទូទៅសត្វថ្លែន.....	112
រូបភាពទី៦៤ លក្ខណៈទូទៅសត្វពស់	113
រូបភាពទី៦៥ លក្ខណៈទូទៅរបស់ថ្នាក់បក្សី	114
រូបភាពទី៦៦ លក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វបក្សី	115
រូបភាពទី៦៧ ប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់សត្វបក្សី.....	115
រូបភាពទី៦៨ ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹងរបស់សត្វបក្សី	116
រូបភាពទី៦៩ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំរបស់សត្វបក្សី.....	117

រូបភាពទី៧០ ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ	118
រូបភាពទី៧១ លក្ខណៈទូទៅបេះដូងបក្សី.....	119
រូបភាពទី៧២ ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម	120
រូបភាពទី៧៣ ប្រព័ន្ធបន្តពូជ	121
រូបភាពទី៧៥ សាខាថ្នាក់ថនិកសត្វ.....	124
រូបភាពទី៧៦ សត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ.....	125
រូបភាពទី៧៧ ប្រព័ន្ធឈាមរត់.....	126
រូបភាពទី៧៨ ប្រព័ន្ធគ្រោងផ្លែឆ្មា	127
រូបភាពទី៧៩ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ	128
រូបភាពទី៨០ ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម រូបភាពទី៨១ ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោល	128

សេចក្តីផ្តើម

និយមន័យ: សត្វវិទ្យាជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីសត្វ។ ការទាក់ទងរវាងសត្វវិទ្យាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដទៃទៀតមានដូចជា៖

- កាយវិភាគវិទ្យា
- មីក្រូកាយវិភាគវិទ្យា
- សរីរវិទ្យា
- អំប្រើយ៉ុងវិទ្យា
- អេកូឡូស៊ី (Ecology)

ជាការវិនិច្ឆ័យអំពីលក្ខណៈ នៃមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់សត្វ និងវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដែលស្រាវជ្រាវ អំពីសត្វល្អិត ត្រី ល្អិត បក្សី និងថ្មីសត្វ។

▪ ប្រវត្តិនៃចំណែកថ្នាក់សត្វ

- នៅស.វ ទី៤ លោក Augustin ជនជាតិ Algeria
- ឆ្នាំ ១១៩០ លោក Thomas Moufet ល្ខោនរឿងកណ្តាប់
- ឆ្នាំ១៧៣០ Carl Linnaeus អ្នកធម្មជាតិវិទ្យាជនជាតិស៊ុយអែតបានសរសេរពី Systema Naturaeហើយបានបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបអំពីចំណែកថ្នាក់ ឬប្រព័ន្ធពណ័នាពីសត្វ។

▪ វិធីចំណែកថ្នាក់សត្វរបស់ Linnaeus បានធ្វើទៅលើសត្វយោង៖

- ទៅតាមពណ៌សម្បុរ សមាមាត្រនៃរូបរាង និងផ្នែកនានានៃដងខ្លួន
- ទៅតាមទម្រង់សរីរវិទ្យានិង អំប្រើយ៉ុងវិទ្យា
- ទៅតាមលក្ខណៈបន្តពូជ និងជួនកាលទៅតាមលក្ខណៈរូបរាង និងទីកន្លែងរស់នៅរបស់វា។

▪ គោលការណ៍នៃការចែកថ្នាក់សត្វរបស់លោក Linnaeus ៖

- ឈ្មោះសត្វ និងរុក្ខជាតិត្រូវតែខុសគ្នា
- ឈ្មោះសត្វត្រូវមាន ២ពាក្យ គឺឈ្មោះពួក និងឈ្មោះប្រភេទ។

Ex: Lumbricus herculus សត្វជន្លេន

Lumbricus ជាឈ្មោះពួក

Herculus ជាឈ្មោះប្រភេទ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែជាអក្សរឡាតាំង និងសរសេរទ្រេតទៅមុខ
- ឈ្មោះពួកត្រូវតែជាពាក្យងាយ និងផ្តើមដោយអក្សរធំ
- ឈ្មោះប្រភេទផ្តើមដោយអក្សរធំមួយតា ប៉ុន្តែវិធីដាក់ឈ្មោះមិនមែនវិទ្យាសាស្ត្រឱ្យសត្វខុសគ្នា

ទៅតាមលំដាប់ភាសានិងកំណត់ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទេ។

តាមលោក Linnaeus បានចាត់ថ្នាក់សត្វជាពីរប្រភេទ: KINGDOM PROTISTA and KINGDOM ANIMALIA ហើយវាមាន៣២សាខាទៀត។

ក. KINGDOM PROTISTA (Unicellular)

PHYLUM1- PROTOZOA: មានកោសិកាតែមួយរស់នៅក្នុងទឹកសាបទឹកប្រៃ ឬដីសើម។

Subphylum A. Sarcomastigophora

Class 1 Sarconida

Class 2 Opalinata

Class 3 Mastigophora

Subphylum B. Sporozoa

Subphylum C. Ciliophora (Ciliata)

Ex: Amoeba, Paramecium...

Subphylum D. Cnidospora

ខ. KINGDOM ANIMALIA (Multicellular or Tissue Organisms)

PHYLUM 2- MESOZOA

PHYLUM 3- PORIFERA: សត្វពហុកោសិកា រស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រ

Class 1. Calcarea

Class 2. Hexactinellida

Class 3. Demospongiae

Class 4. Sclerospongiae

Ex: Cyconoid

PHYLUM 4-CNIDARIA(Coelenterata): ជាសត្វពហុកោសិកាដែលរស់នៅក្នុងទឹកសាប និងទឹកសមុទ្រ។

Class 1. Hydrozoa

Class 2. Scyphozoa

Class 3. Anthozoa

ឧទាហរណ៍៖ Hydra,Aurelia,Coral...PHYLUM5-STENOPHORA: ខ្លួនរបស់វាដូចស្និតស្និទសក់និង ទ្រង់ទ្រាយវាមានការប្រែប្រួល។ វាមានរន្ធដ្រងសម្រាប់ធ្វើចលនា។ វាមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ(មាត់ ក្រពះ)និងទ្វារបញ្ចេញចោល។

PHYLUM6-PLATYHELMINTHES: សាខាដង្កូវខ្លួនសំប៉ែត

Class 1. Turbellaria

Class 2. Trematoda

Class 3. Cestoda

ឧទាហរណ៍៖ Planaria, Fasciola...PHYLUM 7-NEMATHELMINTHES NEMATODA): សាខា ជង្គុវខ្លួនមូល។

ឧទាហរណ៍៖ Ascaris , Oxyuris ,Strongylus, Filaria....

PHYLUM 8-NEMATOMORPHA

Ex: Horsehair worm...

PHYLUM 9-ANNELIDA: សាខាជង្គុវខ្លួនកង់ៗ

Class 1. Polychaeta

Class 2. Olygochaeta

Class 3. Hirudinea

Ex: Earth worm, Sand worms...

PHYLUM 10- MOLLOSCA: ខ្យង ខ្មៅ ងាវ

PHYLUM 11- ARTHROPODA: លក្ខណៈជា Exoskeleton

ឧទាហរណ៍៖ ក្ដាមពីងពាង (spiders)កន្ទុយ (dragonfly) ជង្គុវ (shrimp) Cryfish (បង្កង កម្រីស) សត្វល្អិត (insect) ម្រើមព្រះ (millipedes) និងcondipedes...

PHYLUM 12- ECHINODERMATA: លក្ខណៈជា Endoskeleton

Ex: ក្របាច់សមុទ្រ (Starfish)និង Sea urchin...

PHYLUM 13- CHORDATA: វាជាប្រព័ន្ធស៊ីមេទ្រីសង្ហាងនិងមានប្រព័ន្ធប្រសាទ។

Subphylum A Urochordata

Class1. Larvacea

Class2. Ascidiacea

Class3. Thaliacea

Subphylum B Cephalochordata

Subphylum C Vertebrata

Class 1. Ostracodermi

Class 2. Agnatha: Lamprey, Hagfishes.

Class 3. Osteichthyes: bony fishes.

Superclass TETRAPODA

Class 1. Amphibia: អំបូរកង្កែប (Frogs, Salamander)

Class 2. Aves: ថ្នាក់បក្សី

Class 3. Reptilia: (បង្កួយ Lizard)និងពស់ (snakes)

Class 4.Mammalia: មានក្រពេញដោះ

ឧទាហរណ៍៖ មនុស្ស កណ្តុរ គោក្របី...

គ. ការធ្វើវិភាគនៃជីវសត្វ (Taxonomy of Animal)

ឧទាហរណ៍ឆ្កែស្រុក (domestic dog):

- Kingdom (រដ្ឋៈកាល) : Animal
- Phylum (សាខា) : Chordata
- Subphylum (សាខាវង់) : Vetebrata
- Class (ថ្នាក់) : Mammalia
- Order (លំដាប់) : Carnivora
- Family (អំបូរ) : Canidae
- Genus (ពួក) : Canis-all dog
- Species (ប្រភេទ) : Canis familiari

ជំពូកទី១

សាខាប្រូតូសូអា (Phylum Protozoa)

១.១. លក្ខណៈទូទៅ

Protozoa(Gr.protos,first+zoon,animal) ខុសពីសត្វផ្សេងទៀតដោយសារមានកោសិកាតែមួយដែលមាននាទីរ៉ាប់រងសរីរាង្គផ្សេងៗ។ គេមើលឃើញវាដោយមីក្រូទស្សន៍។ ប្រូតូសូអាមានទំហំ ខុសៗដូចខាងក្រោម៖

- ប្រូតូសូអាជាច្រើនមានទំហំធំជាង ១០μ
- ប្រូតូសូអា ជាបរាសិតរស់ក្នុងពោះវៀន មានទំហំធំជាង ២០០μ
- ប្រូតូសូអា មានបន្តពូជដោយឥតភេទ និងភេទ

ឧទាហរណ៍៖Amoeba មានទំហំ ៦០០μ, Leishmania មានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង ១μ

- ចំណែកថ្នាក់ប្រូតូសូអាត្រូវបានបែងចែកជាសាខាដ៏ចំនួនបួនសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
 - o សាខា Sarcomastigophora(Phizopoda,Pseudopodia(ជើងបញ្ឆោត) or Flagelata(កិន្ទុយ)
 - o សាខា Ciliophora (មានរោមញ័រ)
 - o សាខា Sporozoa (មានស្ព័រ)
 - o សាខា Cnidospora (គ្មានរោមញ័រគ្មានប្រូតូសូអាដែលមានស្ព័រព្រមទាំងមានប៉ូលហ្វីឡាម៉ង់ចាប់ពី០១ឡើងទៅ។ ប្រូតូសូអាភាគច្រើនជាឯកកោសិកាហើយឯកកោសិកាទាំងនេះមើលឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍។ ទម្រង់និងមុខងារ ប្រូតូសូអាមានភាពសំប្រាប់ជាងកោសិកាមេតាសូអា(Metazoa)។ដោយហេតុផលសព្វដំបូងកាយនេះអាចចាត់ក្នុងរដ្ឋៈកាលប្រូទីស្តា (Kingdom Protista)។ ប្រូតូសូអាខ្លះទៀតមានទម្រង់ងាយនិងខ្លះទៀតមានអង្គតូចៗ (Organelles:សរីរាង្គកោសិកា) ក្នុងកោសិកាដែលមានមុខងារស្រដៀងនឹងប្រព័ន្ធសរីរាង្គមេតាសូអាសត្វដែរ។ ប្រូតូសូអាចំនួន៣០,០០០ប្រភេទត្រូវបានគេរកឃើញហើយនៅក្នុងចំនួននៃប្រភេទនីមួយៗមានចំនួនលើសសត្វផ្សេងៗទៀត។ ជាងនេះទៅទៀតប្រភេទទាំងនោះរស់នៅកន្លែងសើមទឹកសមុទ្របាតសមុទ្រទឹកសាបទឹកភ្លៀងក្នុងដីឬរូបធាតុសរីរាង្គពួកផុយ។ខ្លះរស់នៅដោយសេរីនិងហែលដោយសេរីខ្លះទៀតដោយតោងភ្ជាប់ នឹងកន្លែងខ្លះទៀតរស់ នៅជាក្រុមខ្លះទៀតរស់ នៅលើរុក្ខជាតិនិងសត្វហើយវាអាចរស់នៅលើមនុស្ស។អន្តរៈទាក់ទងរបស់ពួកវាប្រែប្រួលពីការគាប់ជួនទៅជាភាពជាបរាសិត។ ប្រូតូសូអាខ្លះជាចំណីរបស់សត្វល្អិតខ្លះជួយបន្សុតទឹកស្អុយ។ ប្រភេទខ្លះទៀតបង្កឱ្យកើតជំងឺមានដូចជាជំងឺរាកមូលជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺដង្កុយដេកអាហ្វ្រិច។ ប្រភេទជំងឺទាំងនេះហើយដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះ។

ចំណែកថ្នាក់របស់ប្រូតូសូអាមានភាពសំបូរណាស់។ វាមានសាខាចំនួន០៤ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសត្វវិទ្យា។ នៅក្នុងមេរៀននេះយើងលើកយកតែក្រុមសំខាន់ៗជាងគេមកពិភាក្សាតែប៉ុណ្ណោះ។

១.២. ចរិតលក្ខណៈ

- វាមានមាឌតូចឯកកោសិកាខ្លះរស់នៅជាក្រុមមិនស៊ីមេទ្រីរស់ជាគូមានទម្រង់ស្មើគ្នាប្រវែងជាស្មើ។
- ទម្រង់កោសិកាមិនប្រែប្រួលរាងពងក្រពើវែងស្មើៗគ្នាប្រភេទខ្លះមានការប្រែប្រួលឬផ្លាស់ប្តូរតាមបរិស្ថាននិងអាយុ។
- វាមាននុយក្លេអូសុស្មុគ្រ (ខ្លះមានមួយឬច្រើន)។ វាគ្មានសរីរាង្គប្រដាប់លិកាទេ។
- ពួកវាផ្លាស់ទីដោយរោមញ័រដើងបញ្ឆោត (Pseudopodia) រោមឬផ្លាស់ទីដោយកោសិកាវាផ្លាស់ទីតែម្តង។
- ប្រភេទខ្លះមានជម្រកការពារឬសំបកខ្លះផលិតគីស (Cysts) ឬស្ត្រីសម្រាប់ការពារក្នុងខណៈពេលដែលមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនប្រកប។
 - o របៀបរស់នៅរបស់វាគឺដោយសេរីរស់ជាមួយគ្នា (Commensal) អន្តរទាក់ទងរវាងសារពាង្គកាយ (Symbiotic) ឬបរាស៊ីត។
- ការចិញ្ចឹមជីវិត: (a) holozoic រស់នៅលើសត្វកាយផ្សេងទៀត (បាក់តេរីយីសសាវាយប្រូតូសូអិផ្សេងទៀត)។ល។ (b) saprophytic រស់នៅលើសារធាតុរលួយជាដីនៅជុំវិញវា។ (c) holophytic ឬ Autotrophic ដោយការធ្វើស្មីសំយោគដូចរុក្ខជាតិដែរខ្លះទៀតរស់នៅតាមបែបវិធីទាំងពីរខាងលើ។
- បង្កកំណើតដោយអកេទដោយប្រេះចេញជាពីរប្រេះចេញច្រើនឬដោយខ្លួនខ្លះបង្កកំណើតដោយកេទដោយទម្លុះពីកាមេតូដោយបំបែកចេញ (Conjugation) សម្រាប់ពួក (Ciliophora)។ ប្រូតូសូអាមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅលើផែនដីយើងនេះ។ ប្រភេទ មានខ្លួនទន់មិនបានរកឃើញនៅហ្សូស៊ីលទេ។ ប៉ុន្តែស៊ីតរបស់វាត្រូវបានគេរកឃើញទុកជាកស្តុតាងដោយនៅសល់ប្រភេទ Radiolaria នៅ Precam-brian Rocks។ ខ្លះបែកចេញជាកន្ទុយដែលមានលក្ខណៈពណ៌បៃតងដូចសារាយបៃតងដែរ។ សរីរវិទ្យាខ្លះបានឱ្យយោបល់ថា មានលក្ខណៈជារុក្ខជាតិនិងសត្វ។ ពួកប្រូតូសូអាតភាគច្រើនមានមាឌតូចណាស់។ គេវាស់វាដោយមីក្រូម៉ែត្រ (១μm=0,00១ម.ម)។ ប្រភេទខ្លះមានប្រវែងត្រឹមតែ ០.២ទៅ ០.៣ μm។


ឧទាហរណ៍៖ បាបេស្យាមានប្រមាណ១២នៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមមួយ Leishmania (flagella) ពី២០០-៣០០មាននៅក្នុងជាលិកាតែមួយ។ ប្រភេទខ្លះទៀតមានប្រវែងតិចជាង២៥០μm ប៉ុន្តែប្រូតូសូអាតមានរោមញ័រ (Spirostonum) លូតលាស់ដល់៣ម.មនិងប្រូតូសូអាត Porospora gigantean លូតលាស់រហូតដល់១៦ម.ម។

១.៣. សាខាខ្វែងស្រទាប់ Sarcomatigophora(Pseudopodia or Flagellata)

- លក្ខណៈទូទៅរបស់វាមានដូចខាងក្រោម៖
- វាជាសត្វពងកាយផ្លាស់ទីគឺកន្ទុយដែលអាចរុញខ្លួនឱ្យមានចលនាបាន
 - Parabasal មាននាទីផ្តល់ថាមពលឱ្យកន្ទុយដើម្បីធ្វើចលនា
 - Blepharoplast មាននាទីផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹម
 - Axostyleជាចង្កឹះរឹង មាននាទីឱ្យសត្វមានលំនឹង។
 - ពពួកFlagellataឬ Pseudopodiaមាន២ប្រភេទ៖
 - o Phytoflagelles : ជាប្រូតូសូអាមានពណ៌បៃតងដូចរុក្ខជាតិ
 - o Zooflagelles:ជាប្រូតូសូអាគ្មានពណ៌វាស៊ីរូបធាតុសរីរាង្គជាអាហារ។ជាញឹកញាប់វាជាបរាសិតដែលមានកន្ទុយ១ ឬច្រើន។

១.៣.១ ករណីសិក្សាពី Phytoflagelles

- Stigma: សម្រាប់តម្រង់ទិសដៅទៅរកកន្លែងដែលមានពន្លឺ
- Contractilevacuole:នាទីកន្ត្រាក់ទឹកឱ្យចេញមកក្រៅនិងធ្វើចលនាតំណកដង្ហើម
- Chloroplast : ផ្ទុកក្លរូភីល សម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ
- Pellicle : ការពារការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ
- Reservoir : មាននាទីសម្រាប់ផ្ទុកចំណីអាហារ
- Flagellum : បំលាស់ទីនិងចាប់ចំណីបញ្ចូលក្នុងដងមាត់
- Nucleus : ណ្វៃយ៉ូផ្ទុកDNA
- Paramylongranule:ជាគ្រាប់សម្រាប់ផ្ទុកសារធាតុបម្រុងនិងថាមពលដល់ខ្លួនវាទាំងមូល។



រូបភាពទី១ រចនាសម្ព័ន្ធនៃ Euglena

របៀបចាប់ចំណី: ដោយយោលទៅតាមរបៀបនៃការចាប់ចំណីអាហារ គេបែងចែក Euglena ជា២ប្រភេទ:

- Phagotrophic Euglena: ជា Euglena ដែលចាប់ចំណីអាហារតាមមាត់ជាលក្ខណៈសរីរាង្គបំបែក ហើយវាសំយោគឡើងវិញ។
- Osmotrophic Euglena: ជា Euglena ស្រូបតាមភ្នាស (សូលុយស្យុងអសរីរាង្គ Autotrophic N P K) ។

ការបន្តពូជ: ជាទូទៅ Euglena តពូជដោយឥតភេទតាមរយៈការធ្វើចំណែកកោសិកាតាមបណ្តោយខ្លួន។ លក្ខខណ្ឌប្រកបរបស់វាមាន០៤យ៉ាង៖ ចំណីអាហារកំដៅសំណើមនិងសីតុណ្ហភាព។ Euglena មានលក្ខណៈតពូជដូចខាងក្រោម:

- កោសិកាលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង
- ណ្វៃយ៉ូខិតមកនៅក្បែរចង់មាត់ ហើយលាតសន្ធឹងយ៉ាងវែង
- ណ្វៃយ៉ូ និង Stigma ធ្វើការផ្តាច់ខ្លួនជាមួយគ្នា
- Blepharoplastក៏ផ្តាច់ចេញនិងបង្កើតកន្ទុយថ្មីមួយទៀតហើយកោសិកាក៏ចាប់ផ្តើមផ្តាច់ខ្លួនជាពីរ ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិត។

១.៣.២ ករណីសិក្សាពី Zooflagelles

ជាទូទៅពពួកប្រូតូសូអាគ្មានពណ៌មានភ្នាសកោសិកាស្តើងនិងមានParabasalជាប់នឹងសង់ត្រូសូម។វាជាសាប្រូហ្វីត(Saprophyte)និងស្ទើរតែទាំងអស់រស់នៅតាមរបៀបSymbiosis (អន្តរទាក់ទងរវាងសត្វកាយ២ដែលមានប្រភេទខុសគ្នា)។ ភាគច្រើននៃពពួកZooflagellesដែលរស់នៅជាបរាសិតនោះគឺជាពពួកTrypanosoma។

- Trypanosoma brucei gambiense និងTrypanosoma brucei វាយ:ពេលrhodesian ជាមេរោគនៃជំងឺងងុយដេករបស់មនុស្ស ហើយវាឆ្លងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយទៀតតាមរយៈការទិចនៃរុយTse-Tse។ ជំងឺងងុយដេកច្រើនកើតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិចនិងនៅអេក្វាទ័រ។
- Trypanosoma leishmania dronovoni បង្កើតជំងឺថ្លើមរឹក។ នៅប្រទេសឥណ្ឌូចិនគេហៅថា Kalaazar។ វារស់នៅជាបរាសិតក្នុងឈាមដោយបំផ្លាញគោលិកាឈាមស។
- Trypanoso maleishmania tropic បរាសិតរស់នៅលើកោសិកាស្បែក និងបង្កជំងឺមហារីកស្បែក។
- Trypanosoma leptoplana ជាបរាសិតក្តាម ខ្យង។
- Trypanosoma leishmania ជាបរាសិតរស់នៅក្នុងគោលិកាឈាមស នៃសត្វមានផ្តឹងកង។


អាការៈនៃជំងឺងងុយដេករបស់មនុស្ស។ ចន្លោះពេលដែលមេរោគឆ្លងចូលក្នុងសត្វកាយ និងលេចចេញជា រោគសញ្ញាមានរយៈពេលពី១០-១៥ថ្ងៃ។ នៅពេលនោះវាធ្វើឱ្យស្ទុះសរសៃឈាមកែវ

ក្លែកស្លូតចលនាបេះដូងមិនទៀងទាត់(ក្នុងបេះដូង)។ រយៈពេលដែលមេរោគចូលក្នុងខួរក្បាល និងខួរ ឆ្អឹងខ្នង ធ្វើឱ្យមនុស្សមានសភាពស្លាក់ ងងុយដេកពេលថ្ងៃ ហើយតប់ប្រមល់ និងដេកមិនលក់នៅពេល យប់ អស់កម្លាំង ចុះស្គម សីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួននឹងចុះខ្សោយទៅៗ និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។


១.៣.៣ អេស៊ីសិក្រូតិ Trypanosoma brucei gambiense

វាស់នៅក្នុងឈាមរបស់មនុស្សពេញវ័យ។ វាមានប្រវែង១៥-៣០μm មានរាងស្មើ និងវែង ហើយមានដងខ្លួនរមូលអង្កាញ មានកន្ទុយតែមួយដែលនៅផ្នែកខាងមុខជាប់ជាមួយនឹងBlepharoplast។ វាធ្វើការបន្តពូជដោយឥតភេទតាមរយៈការធ្វើចំណែកកោសិកាតាមបណ្តោយខ្លួន។វាឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈរុយ Tse-Tse ។

ទ្រីប៉ាណូសូម៉ាដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងពោះវៀននៃសត្វល្អិតនៅ ពេលវាទិច។នៅទីនោះវាធ្វើការវិវត្តកាន់តែស្មើទៅៗ។ ប៉ុន្តែវានៅរក្សាទ្រង់ទ្រាយជាទ្រីប៉ាណូសូម៉ាដដែល ។ នៅថ្ងៃទី១០-១២ទ្រង់ទ្រាយស្មើនេះឡើងមកដើមក។ នៅទីនោះ Blepharoplast ផ្លាស់ប្តូរទី តាំងមកនៅពីក្រោយណ្ហយុវិញទ្រង់ទ្រាយថ្មីនេះហៅថាCrithidia។ បន្ទាប់មកវាក៏ភ្ជាប់កន្ទុយទៅនឹង ផ្នែនៃដើមកហើយក៏បង្រួញខ្លួនបន្តិចម្តងៗ និងក្លាយទៅជាទ្រង់ទ្រាយថ្មីហៅថា Metatrypanosoma។ បន្ទាប់មកក៏ជ្រៀតចេញពីផ្នែនដើមកចូលទៅក្រពេញទឹកមាត់និងសរីរាង្គផ្សេងទៀតហើយក៏វិវត្តទៅជា ទ្រង់ទ្រាយដើមវិញ។ វាចូលទៅក្នុងសព៌ាងកាយមនុស្សផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការទិចឬខាំពីTse-Tse។




រូបភាពទី២ ទ្រីប៉ាណូសូម៉ាដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស



រូបភាពទី៣ Trypanosoma gambiense

១.៣.៤ ករណីសិក្សាពីអាមីប Ameba (Class Sarcodina)

ពពួក Sarcodina គ្មានកន្ទុយឬរោមព្រំទេរ។ ពួកវាធ្វើចលនាដោយមធ្យោបាយ Ameboid Motion។ វាមានជំនួយពីហ្វីឡាម៉ង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីនហៅថាអាក់ទីន(Actin)។ ស៊ីតូប្លាស្មសប្រូតូសូអាអាចបណ្តែតក្នុងកោសិកាខាងក្រោយទៅមែកជាងថ្មីៗដែលគេហៅថាជើងបញ្ឆោត (Pseudopods) នេះបណ្តាលឱ្យកោសិកាមានចលនាទៅតាមទិសដៅណាមួយ។ Sarcodina ដ៏ច្រើនជាបរាសិតនៃពោះវៀននិងប្រហោងមាត់មនុស្សនិងពួកសត្វមានឆ្អឹងកង។



រូបភាពទី៤ អាមីប


១.៤. សាខារង មានរោមញ័រ: Subphylum Ciliophora (Ciliata)

១.៤.១. លក្ខណៈទូទៅ:


- រោមញ័ររបស់វាហៅថា Cilia ។ តួនាទីសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទីនិងនាំអាហារចូលក្នុងមាត់ ។ វាជាពួករស់នៅក្នុងទឹកសាប (ត្រពាំងបឹង) ដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរីរាង្គ។
- សាខារោមញ័រនេះមានលក្ខណៈខុសពីពួកសាខាប្រូតូសូអាដីទៀតដោយសារមានមាឌធំនិងមានណ្វៃយ៉ូ២៖
 - o ណ្វៃយ៉ូធំដែលហៅថាម៉ាក្រូនុយក្លេអ៊ីស (Macronucleus)
 - o ណ្វៃយ៉ូតូចហៅថាមីក្រូនុយក្លេអ៊ីស (Micronucleus) ។

ឧទាហរណ៍៖ Paramecium Caudatum:

- o ថង់កម្រិត (Contractile vacuole)
- o ចង្កូវមាត់ (Oral groove)
- o មីក្រូនុយក្លេអ៊ីស (Micronucleus)
- o ម៉ាក្រូនុយក្លេអ៊ីស (Macronucleus)
- o រោមញ័រ (Cilia)
- o សៃតូកែ (Cytopyge): ការបញ្ចេញកាកសំណល់
- o ទ្រីកូស៊ីស (Trichocyst): ប្រព័ន្ធការពារក្នុងអ៊ីចតូប្លាស
- o ថង់អាហារ (Food vacuole) ។




រូបភាពទី៥ ប្រូតូសូអាដកកោសិកា




រូបភាពទី៦ សាខាប្រូតូសូអាត

១.៤.២. បន្តពូជរបស់ Paramecium :

- បន្តពូជរបស់ពួកប៉ារ៉ាមេតូមមាន០២យ៉ាងដូចរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
- បន្តពូជដោយឥតភេទ:ធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើមីតូសនិង
- បន្តពូជដោយភេទ:ជាការតពូជដោយមានមេបាពោលគឺមានញីនិងឈ្មួល។



រូបភាពទី៧ រចនាសម្ព័ន្ធ Paramecium



រូបភាពទី៨ Paramecium Conjugation: បរាមេច្យូមបំបែកខ្លួន

១.៥. សាខារងមានស្បែក: Sporozoa

១.៥.១. លក្ខណៈទូទៅ

Sporozoa រស់នៅជាបរាសិត។ ក្នុងវដ្តជីវិតរបស់វាបង្កើតបានជាស្បែកដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្ចាស់បញ្ជី (Host) របស់វា។ សាខារង Sporozoa មាន៣ថ្នាក់៖

- Coccidia: វាមានមាឌតូចនិងជាបរាសិតសត្វមានឆ្អឹងកង់ និងសត្វឥតឆ្អឹងកង់។
- Gregarina: វាជាប្រូតូសូអាដែលរស់នៅក្នុងប្រជាប្រិយវិលាយអាហារនៃសត្វល្អិតខ្លះ: Arthropods, Annelids និងសត្វមានឆ្អឹងកង់ផ្សេងទៀត។ វាមានមាឌធំ និងជាបរាសិតសត្វមានឆ្អឹងកង់។
- Piroplasmida: ជាលំដាប់នៃប្រូតូសូអា។ តំណាងរបស់វាមាន Babesia និង Theileria ។ បរាសិតក្នុងឈាមចំពោះសត្វមានឆ្អឹងកង់ថ្នាក់ខ្ពស់។

១.៥.២. ថ្នាក់កុកស៊ីដ្យា (Coccidia)

ជំងឺកុកស៊ីដ្យាស៊ីសជា ជំងឺសត្វស្លាបដែលបណ្តាលមកពីពពួកប្រូតូសូអា។ ពពួកវាបង្កឱ្យសត្វ រាកនិងកម្រិតងាប់មានសភាពប្រែប្រួល។ ទោះបីមានការស្រាវជ្រាវដ៏ច្រើន ដើម្បីឱ្យការព្យាបាលនិង ការត្រួតពិនិត្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក៏បន្ទុកនូវតម្លៃជំងឺខ្ពស់ក្នុងឧស្សាហកម្មបក្សី។

ជំងឺកុកស៊ីដ្យាបណ្តាលមកពីមេរោគហៅថាកុកស៊ីដ្យា។មានកុកស៊ីដ្យាច្រើនប្រភេទដែលអាចបង្ក ឱ្យមានជំងឺដល់បក្សីសត្វពាហនៈនិងមនុស្ស។ ប្រភេទនីមួយៗនៃកុកស៊ីដ្យាមានម្ចាស់របស់វាជាក់លាក់ ហើយវាមិនបង្កជំងឺដល់សត្វដ៏ច្រើនប្រភេទទេ។ បន្ទាប់ពីផ្ទះជំងឺកុកស៊ីដ្យាជាក់លាក់មកហ្នឹងសត្វបង្កើត ភាពស៊ាំនឹងមេរោគនោះប៉ុន្តែសំណល់ភាពស៊ាំអាចធន់នឹងប្រភេទផ្សេងទៀត។ នេះបានន័យថាហ្នឹង សត្វមានបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើន ពីការផ្ទះជំងឺកុកស៊ីដ្យាសត្វមានឆាប់ទទួលនូវប្រភេទជំងឺកុកស៊ីដ្យា។ មាន បារាំងឆាប់ទទួលនូវប្រភេទជំងឺកុកស៊ីដ្យាចំនួន០៧ប្រភេទ និងពពួកក្រូចឆាប់ទទួលនូវប្រភេទជំងឺកុកស៊ីដ្យា យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន០៤ប្រភេទដែរ។

ជំងឺកុកស៊ីដ្យាឆ្លងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលតាមរយៈមេរោគកុកស៊ីដ្យាបក្សី។ ខណៈពេលដែល សត្វលេបចូលកុកស៊ីដ្យា សារពាង្គកាយត្រូវបានរាតត្បាតតាមបណ្តោយពោះវៀន និងធ្វើឱ្យខូចខាត ជាលិកា។ ក្នុងរយៈមួយអាទិត្យបន្ទាប់ការឆ្លងជំងឺមកកុកស៊ីដ្យាចងជាជំងឺនេះជាអូហ្វូស៊ីស(Oocysts)។ អូហ្វូស៊ីសចងជាជំងឺក្នុងដំណក់ទឹកមាត់មិនអាចឆ្លងជំងឺទៅសត្វផ្សេងទៀតលុះត្រាតែមេរោគទាំងនោះឆ្លង កាត់ដំណើរស្ត្រី(Sporulation) នៅក្នុងកំរាល(Litter) សិន។ ដំណើរស្ត្រីកើតឡើងរយៈពេល១-៣ថ្ងៃបើសិន កម្រាលនោះក្តៅខ្លះៗនិងស្អុយរលួយ។ ប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងរយៈពេលយូរលើក្នុងខ្លួនត្រជាក់ហើយ ស្ងួត។ បន្ទាប់ពីដំណើរស្ត្រីមេរោគកុកស៊ីដ្យាឆ្លងយ៉ាងរហ័សបើសិនមេរោគទាំងនោះត្រូវបានស៊ីដោយ បក្សីបញ្ជីថ្មីៗទៀត។

ចំនួនកុកស៊ីដ្យាដែលត្រូវបានលេបចូលដោយម្ចាស់បញ្ជីគឺជាកត្តាដំបូងនាំឱ្យកើតជំងឺ។ ការឆ្លង រោគតិចតួចមិនអាចកាត់សំគាល់បានទេ ប៉ុន្តែចំនួនកុកស៊ីដ្យាដ៏ ច្រើនអាចបង្កឱ្យមានស្លាកស្នាមនិង បណ្តាលឱ្យសត្វឈឺនិងងាប់។ កុកស៊ីដ្យាអាចរស់រយៈពេលយូរខណៈនៅខាងក្រៅខ្លួនបក្សី។ ជំងឺអាច ឆ្លងពីទ្រុងមួយទៅទ្រុងមួយ តាមរយៈស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់សត្វស្លាបផ្សេងៗ សម្ភារបារិច្ចសត្វ ល្អិតនិងពួកសត្វកកែរដែលផ្ទុកមេរោគ។

តាមធម្មតាជំងឺកុកស៊ីដ្យាស៊ីសកើតឡើង ចំពោះបក្សីនៅក្មេងនិងបក្សីកំពុងលូតលាស់។ គេមិន សូវមានឃើញជំងឺនេះកើតលើបក្សីដែលមានអាយុក្រោមបីអាទិត្យឬសត្វមានអាយុពេញវ័យទេ។ សញ្ញា នៃការផ្ទះជំងឺនេះគេសង្កេតឃើញសត្វមានសភាពស្លេកស្លាំងសត្វស្រពោនផ្អែមស៊ីចំណីតិចនិងដឹកទឹក តិចរាកនិងស្នមកំព្រឹងហើយខ្សោះទឹក។ ចំពោះមាន់យកពងវិញអត្រាពងរបស់វាធ្លាក់ចុះ។


ជំងឺកុកស៊ីដ្យូកើតឡើងក្នុងពោះវៀនធំ (CecalCoccidiosis) បង្កឱ្យមានឈាមនិងបណ្តាលឱ្យខ្វះឈាមក្រហមដែលជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យសត្វស្លាប់។ ជំងឺកុកស៊ីដ្យូកើតឡើងក្នុងពោះវៀនតូចគឺមិនមានលក្ខណៈស្រួចស្រាលទេ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃ។ វាបណ្តាលឱ្យសត្វងាប់តិចជាងជំងឺកុកស៊ីដ្យូកើតឡើងក្នុងពោះវៀនធំ។

ស្លាកស្នាមដែលបង្កដោយរោគអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទកុកស៊ីដ្យូដែលបង្កហើយមេរោគនេះបង្កឱ្យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ជំងឺកុកស៊ីដ្យូធ្វើឱ្យពោះវៀនធំប៉ោង និងអាចបង្កឱ្យហើមចង់ពោះវៀនធំ និងបណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាមនៅពាសពេញ។ នៅដំណាក់កាលក្រោយត្រូវបានបង្កលក្ខណៈឱ្យពោះវៀនធំពោរពេញទៅដោយសម្ភារៈជាប់ៗគ្នាលាយឡំជាមួយឈាម។ ស្លាកស្នាមនៃជំងឺកុកស៊ីដ្យូពោះវៀនតូចប្រែប្រួលពីរលាកពោះវៀនមិនសូវខ្លាំងទៅជាប្រភេទខ្លាំងពេលគឺក្រិនឬមានឈាម។


ជំងឺកុកស៊ីដ្យូកើតក្នុងពោះវៀនធំអាចច្រឡំ នឹងជំងឺសាល់ម៉ូណូលឡូសដោយមានស្លាកស្នាមដូចគ្នា។ រីឯជំងឺកុកស៊ីដ្យូកើតឡើងក្នុងពោះវៀនតូចវិញអាចច្រឡំនឹងជំងឺខ្វះឈាមនិងជំងឺពោះវៀនតូចផ្សេងៗទៀត។ ការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍លើប្រដាប់រំលាយអាហារដើម្បីរកមេរោគទាំងនោះ។

វាមានការលំបាកណាស់ ក្នុងការការពារជំងឺកុកស៊ីដ្យូដោយ ប្រើតែវិធានការណ៍អនាម័យតែមួយគត់។ វាជាការប្រសើរណាស់គេត្រូវប្រើឧសCocciostatបែបលើចំណីដើម្បីពិនិត្យការលូតលាស់របស់មេរោគក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារ។

Cocciostat ភាគច្រើនមានលក់នៅទីផ្សារ។ វាក៏សំខាន់អាចរកទិញនៅទីផ្សារ។ ផលិតផលទាំងនេះអាចប្រើលើប្រភេទផលិតកម្មបក្សីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ។ គួរពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញមុននឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនោះ។



រូបភាពទី៩ វដ្តជីវិតនៃជំងឺ Coccidiosis



រូបភាពទី១០ វដ្តជីវិត Coccidia

១.៥.៣. Plasmodium

ជាជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈមូសដែកគោលញីពិសេសនៅតំបន់ត្រូពិច។

❖ Plasmodiumមាន៤ប្រភេទ៖

- Plasmodium Vivax: ជាប្រភេទមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបណ្តាលឱ្យគ្រុនញាក់២ថ្ងៃម្តង។
 - Plasmodium Malaria: ជាប្រភេទមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបណ្តាលឱ្យគ្រុនញាក់រាល់ថ្ងៃ។
 - PlasmodiumFalciparum: ជាប្រភេទមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបណ្តាលឱ្យគ្រុនញាក់៣ថ្ងៃម្តង។
 - PlasmodiumOvale: ជាប្រភេទមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបណ្តាលឱ្យគ្រុនញាក់២ថ្ងៃម្តង។
- វដ្តជីវិតរបស់វាទាំង៤ប្រភេទនោះមានសភាពដូចគ្នា។

❖ សិក្សាពីវដ្តជីវិតរបស់ Plasmodium Falciparum

Plasmodium Falciparum មានបន្តពូជ០២យ៉ាងដូចខាងក្រោម៖

- បន្តពូជឥតភេទ (Schizogony)ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
- បន្តពូជដោយភេទ (Gamogony)ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខ្លួនមូសដែកគោលញី


ក. ការបន្តពូជដោយឥតភេទ (Schizogony)

នៅពេលដែលមូសដៃកគោលញីផ្ទុកមេរោគគ្រុនចាញ់ទៅខាំមនុស្សវាបញ្ចេញ Sporozoites ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធណាមតាមរយៈឈាម។ វាក៏ចូលដល់កោសិកាថ្លើមពេលនោះវាក៏ចាប់ផ្តើមធ្វើចំណែក ណែនាំហើយស៊ីតូប្លាសមួយរុំព័ទ្ធនៃណែនាំបង្កើតបានជា Merozoites ។ ខណៈពេលនោះវាបញ្ចេញអង្គ ស៊ីមដើម្បីរំលាយក្លាសកោសិកាថ្លើមរួចចូលក្នុងរបត់ឈាម។ នៅទីនោះវាលូតលាស់ជា Gametocyte អាចជាការម៉ែតញី-ឈ្មោល។ ការម៉ែតញីហៅថា Macrogametocyte និង ការម៉ែតឈ្មោលហៅថា Microgametocyte ។

ការម៉ែតមួយចំនួនបន្តវិវត្តក្នុងកោសិកាឈាមក្រហម។ វាចាប់ផ្តើមធ្វើចំណែកណែនាំបន្ទាប់ មកធ្វើចំណែកស៊ីតូប្លាស។ ស៊ីតូប្លាសរុំព័ទ្ធនៃណែនាំបង្កើតជា មេរោគ Merozoites ហើយវាចេញពីកោសិ កាឈាមចូល ក្នុងប្រព័ន្ធរបត់ឈាមវិញដោយលូតលាស់ជាការម៉ែតដូចដើម។ ដូចនេះមេរោគគ្រុន ចាញ់ក្នុងប្រព័ន្ធរបត់ឈាម តាមរយៈការធ្វើចំណែកដដែលៗដូចខាងលើ។

ខ. ការបន្តពូជដោយភេទ (Gamogony)

ខណៈពេលមូសដៃកគោលញីខាំមនុស្សដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់វាស្រូបយកឈាមដែលផ្ទុកដោយ Macrogametocyte ជាច្រើន។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រដាប់រំលាយអាហាររបស់មូសការម៉ែតឈ្មោលក៏បានលូត លាស់ទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដោយគ្មានចលនា។ ចំណែកឯការម៉ែតញីធ្វើចំណែកណែនាំជាច្រើន ដងបន្តដែលអាចមានណែនាំតូចៗថ្មីពី ៤-៦។ បង្កកំណើតធ្វើឡើងដោយមានការផ្តាច់ណែនាំតូចមួយ ទៅភ្ជាប់ជាមួយការម៉ែតតូស៊ីតតូចមួយហើយបង្កើតបានជាស៊ីតបង្កកំណើតហៅថា Ookinete ។ បន្ទាប់ មកក៏ធ្វើចលនារំកិលជ្រៀតចូលស្រទាប់ពោះវៀន (Epithelium) រួចបង្កជាគីសនៅទីនោះ។ Oocyst ដែលបន្ទាប់មក វាធ្វើចំណែកស៊ីតូប្លាសទៅតាមចំនួននៃណែនាំ។ ស៊ីតូប្លាស១រុំព័ទ្ធនៃណែនាំ១បង្កើត បានជាទ្រង់ទ្រាយថ្មីដែលហៅថា Sporozoites ហើយក៏ធ្វើចលនាចាកចេញពីស្រទាប់ពោះវៀនចូលទៅ ក្រពេញទឹកមាត់និងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃសត្វកាយ។ ទម្រង់នេះហើយដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុង សត្វកាយរបស់មនុស្សដែលវាបានខាំ។



រូបភាពទី១១ វដ្តជីវិត P. Falciparum

១.៥.៣ ពីរូប្លាសមីដា (Piroplasmida)

ក. បាបេស្យ៉ា (Babesia)

បាបេស្យ៉ាគឺ ពពួកប្រូតូសូអារដែលជាបរាសិត នៅក្នុងឈាមបង្កឱ្យកើតមានជម្ងឺបែកគ្រាប់ឈាមដែលត្រូវបានហៅថា Babesiosis។ អំបូរបាបេស្យ៉ាមានប្រមាណជា ១០០ ប្រភេទ។ ប៉ុន្តែមានប្រមាណតែមួយចំនួនតូចត្រូវបានគេលើកយកមកសិក្សាជាមេរោគនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។

Babesia microti គឺជាមេរោគរួមគ្នាជាមួយមនុស្សនិងសត្វពាហនៈ។ ចំពោះមនុស្សផ្ទុកនូវបរាសិតនេះទទួលរងការឈឺចាប់ដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែរ។ ជាលទ្ធផលជំងឺគ្រុនចាញ់ (malaria) មានរោគសញ្ញាដែលពិបាកវិនិច្ឆ័យចំពោះជម្ងឺនេះណាស់។

- ចំណែកថ្នាក់

បាបេស្យ៉ាមានអំបូរពីរ៖ *Babesia microti* និង *Babesia divergens* ជាញឹកញាប់ឆ្លងទៅមនុស្ស។ ចម្លងរោគពីប្រភេទផ្សេងៗនៃបាបេស្យ៉ាបានត្រូវកត់ទុក ក្នុងឯកសារថាវាឆ្លងទៅមនុស្ស ប៉ុន្តែដោយកម្រកើតមានណាស់។ ជំងឺបាបេស្យ៉ាក៏ត្រូវបានគេហៅថា Piroplasmosis។ តាមរយៈចំណែកថ្នាក់ដោយមានការភ្ជាប់ប្រូតូសូអារនេះត្រូវបានគេហៅឈ្មោះជាច្រើនដែលគេលែងប្រើនៅសម័យនេះ។ ឈ្មោះជម្ងឺរួមមាន Texas Cattle Fever, Redwater fever, Tick fever, and Nantucket Fever។

• ប្រវត្តិ

អស់ជាច្រើនសតវត្សរ៍ដំបូងបានប្រកាសឲ្យបានគេស្គាល់ថា ជាជម្ងឺយ៉ាងកាចសាហាវដែលកើតមាន ចំពោះសត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃជាពិសេសចំពោះសត្វគោ និងក្របី។លោកVitorBabesអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររ៉ូម៉ាំងបានធ្វើការកត់ត្រាជម្ងឺនេះនៅឆ្នាំ១៨៨៨លោកបានពណ៌នាថា រោគសញ្ញាយ៉ាងកាចសាហាវនៃ ជម្ងឺ hemolytic នៅក្នុងជំងឺសត្វ។ ប្រមាណជា២-៣ឆ្នាំ បន្ទាប់មក Theo bald Smith and Fred Kil borne បានធ្វើការកត់សម្គាល់បរាសិតនេះបង្កឱ្យមានជម្ងឺTexas Cattle Fever ដែលជាជម្ងឺបានកំណត់ ដោយ Vitor Babes។ Smith និង Kilborne បានធ្វើកំណត់សម្គាល់ថាចៃជាភ្នាក់ងារ ចម្លងនេះជា បេកគំហើញដំបូងបានបញ្ចូលជាទស្សនៈទានថាពួក arthropods ជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ។ ជាយូរយារ ណាស់មកហើយគេជឿថាវាបង្ករោគទៅលើតែសត្វមិនចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះតែប៉ុណ្ណោះ។ រហូតមក ដល់ឆ្នាំ១៩៥៧គេរកឃើញករណីដំបូងដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។ករណីទី១ត្រូវបានអង្កេតទៅ លើអ្នកជម្ងឺធ្លាក់ផាលដែលមានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៦៩។ ករណីដំបូងនៃជំងឺបាបេស្យាបាន រកឃើញនៅក្នុងអ្នកជម្ងឺមិនធ្លាក់ផាលដោយយល់ស្របថាជាបរាសិត។ វាជាជម្ងឺឆ្លងទៅគ្រប់មនុស្ស។

• គ្លីនិក

លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនៃ Babesia microti មានភាពផ្សេងៗគ្នា។ករណីមនុស្សពេញវ័យមាន ២៥% នោះកុមារពាក់កណ្តាលនៃករណី។ជម្ងឺនេះមិនបញ្ចេញរោគសញ្ញាអ្វីទេបើមានលក្ខណៈខ្សោយដូចនឹង រោគសញ្ញាផ្តាសាយដែរ។នៅក្នុងករណីមានរោគសញ្ញាឆ្លងច្បាស់លាស់រោគសញ្ញាបង្កលក្ខណៈគ្រុនមិន ទៀងទាត់រងាយរក្សាលក្ខណៈអស់កម្លាំងឈឺចុកចាប់និងរសាប់រសល់។ នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឱ្យខ្វះឈាម កើតលឿងដកដង្ហើមខ្លីៗ និងទឹកនោមលាយឈាម។ អ្នកជំងឺកាត់ផាលចេញឆាប់ទទួលជំងឺនេះណាស់ ហើយក្នុងរយៈពេលរោគមានគ្រោះថ្នាក់ពី៥-៨ថ្ងៃដំបូង។ កម្រិត Parasitemia អាចឈានដល់ទៅ៨៥% ចំពោះអ្នកជម្ងឺគ្មានផាលបើប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតParasitemiaអ្នកដែលមានផាលមាន១-១០% ព្រម ទាំងមានប្រព័ន្ធភាពសំល្គ។ អ្នកជម្ងឺវះកាត់យកផាលចេញទទួលរងការខ្វះឈាមយ៉ាងច្រើន។ ភាពស្មុគ ស្មាញដែលបង្កឡើង B.microti រួមមានដំណកដង្ហើមចម្រុះធ្វើឱ្យឈាមកកកក្នុងបេះដូងនិងបញ្ហា តម្រងនោម។

ចំពោះបង្ករោគនៃ B.Divergens នេះបណ្តាលឱ្យមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់(៤២%) ហើយវាបង្ហាញ នូវរោគសញ្ញាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត។ ចំពោះអ្នកជម្ងឺដែលបានឆ្លងរោគរងនូវការធ្លាក់ឈាមតាមទឹកនោម (Hemoglobinuria)នាំឱ្យមានសភាពស្លេកស្លាំងគ្រុនរងា និងបែកញើស។ បើនៅតែមិនព្យាបាលទៀត មេរោគនេះធ្វើឱ្យហើមសួតនិងតម្រងនោមខ្សោយដែលអាចវិវត្តទៅជារោគសញ្ញាមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ ដូច ជាហើមសួតនិងតម្រងនោមខ្សោយ។ សញ្ញានៃបង្ករោគតែងតែលេចឡើងចាប់ពី ១-៨ សប្តាហ៍បន្ទាប់ ពីចំខាំមនុស្សនោះ។ ចម្លងរោគនៃ B.divergens មានរយៈពេលខ្លីចាប់ពី ១-៣ សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។

• ចម្លងមេរោគ

Babesia ត្រូវបានឆ្លងទៅក្នុងខ្លួនតាមរយៈទឹកមាត់ចៃនៅពេលដែលវាខាំ។ នៅដំណាក់ដឹកឡើ (Nymph) ចៃខាំចូលស្បែកដើម្បីបិតយកឈាមជាអាហារ។ ប្រសិនបើចៃមិនបានកំចាត់ចេញទេនោះវានឹងរស់នៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្បែកពី៣ទៅ៦ថ្ងៃជាមួយរយៈពេលដ៏វែងដែលបានបង្កឱ្យកើតមានបរាសិត។ បរាសិតអាចរស់នៅបាននៅក្នុងខ្លួនចៃតាមដំណាក់កាលស្លាប់ផ្សេងៗគ្នា។ ប្រភេទបាបេស្យាខ្លះអាចត្រូវបានឆ្លងពីចៃទៅឱ្យកូនចៃរបស់ពួកវាមុននឹងចូលទៅក្នុងក្រពេញទឹកមាត់។ B.microtic ជាពូជរួមគ្នានៃបាបេស្យាដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។

នៅអាមេរិក Ixodes capularis ជាភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺសាមញ្ញបំផុត។ ចៃប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថា Deer tick គឺជាភ្នាក់ងារចម្លងទៅចៃដទៃទៀតដែលបង្កឱ្យមានជម្ងឺ Lyme: Erythema chronicum migrans)។ មានប្រភេទបាបេស្យាជាច្រើនដែលមិនឆ្លងមនុស្ស ប៉ុន្តែវាឆ្លងតែលើសត្វពាហនៈដូចជាគោក្របីសេះនិងសត្វចៀម។ B.microtic និង B.divergens សុទ្ធជាអ្នកបង្កជម្ងឺនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយ៉ាងចំបង។

• លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

បាបេស្យាចូលទៅក្នុងអេរីត្រូសៃ (កោសិកាឈាមក្រហម) ក្នុងដំណាក់ស្ត្រូហ្វូសូអ៊ីត។ នៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមប្រូតូសូអារីត្រូវទៅជាត្រូហ្វូសូអ៊ីត (Trophozoitering)។ ត្រូហ្វូសូអ៊ីត (Trophozoite) ប្តូររូបរាងទៅជាមេរូសូអ៊ីត (Merozoite) ដែលមានទម្រង់តេត្រាហើយបង្កើតជាទម្រង់ Maltese-cross។ រូបរាងតេត្រាអាចមើលឃើញពេលដែលលាយ Giemsa នៃគំនាសឈាមនេះជាក្លាមួយដែលព្រែកបាបេស្យានិង Plasmodium Falciparum ជាប្រូតូសូអារដែលបង្កជម្ងឺគ្រុនចាញ់។ ការលូតលាស់នៃត្រូហ្វូសូអ៊ីតនិងមេរូសូអ៊ីតធ្វើឱ្យឆ្លុះឆ្លាយកោសិកាឈាមក្រហមនិងនាំឱ្យបញ្ចេញកូនដង្កូវ (vermicule) នោះបរាសិតចម្លងជម្ងឺតាមរយៈឈាមយ៉ាងរហ័ស។

• វដ្តជីវិត

វដ្តជីវិតនៃ Babesia microti ត្រូវការដំណាក់ដំរីនៅក្នុងសត្វកកេរនិងសត្វក្តាន់ហើយត្រូវបានចម្លងតាមរយៈអំបូរចៃ Ixodidae រវាងបញ្ជីទាំងនោះ។ ជាដំបូងចៃបញ្ចូលស្ត្រូហ្វូសូអ៊ីតនៅក្នុងសត្វកកេរបន្ទាប់មកវាស៊ីឈាមជាសារធាតុចិញ្ចឹម។ ស្ត្រូហ្វូសូអ៊ីតចូលក្នុងអេរីត្រូសៃហើយចាប់ផ្តើមលូតលាស់ជាវដ្តរវាងត្រូហ្វូសូអ៊ីតនិងមេរូសូអ៊ីត។ មេរូសូអ៊ីតខ្លះបង្កើតកាម៉ែតតូសៃ។ ចៃបញ្ជីបញ្ចប់ផ្ទុកមេរោគ (អំបូរ Ixodidae) បង្កើតកាម៉ែតតូសៃខណៈពេលដែលវាស៊ីឈាមជាសារធាតុចិញ្ចឹម។ កាម៉ែតបង្កកំណើតនៅក្នុងពោះវៀនចៃនិងលូតលាស់ទៅជាស្ត្រូហ្វូសូអ៊ីតនៅក្នុងក្រពេញទឹកមាត់។ ស្ត្រូហ្វូសូអ៊ីតឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមរយៈការខាំនៃចៃមានជម្ងឺ។ ដំណាក់នៃការប្រែប្រួលដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរាសិតក៏មានសភាពដូចជាក្នុងមនុស្សផងដែរ។

បាបេស្យាអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅ ដំណាក់ត្រូហ្វូសូអ៊ីតនិងអាចត្រូវបានចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈភ្នាក់ងារចែប្រក៏តាមរយៈការបញ្ចូលឈាម។

• រោគវិនិច្ឆ័យ និង ការព្យាបាល


- តេស្តរោគវិនិច្ឆ័យ

មធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីសម្គាល់ពីចម្លងរបស់បាបេស្យាគេធ្វើតេស្តតាមរយៈយកសំណាកឈាមដើម្បីរកបរាស៊ីត។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដោតការម្នាក់ទៅលើរូបរាងពិសេសមេរោគបាបេស្យានៅក្នុងគំនាសឈាមពីព្រោះវាមានសារធាតុស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបរាស៊ីត *Plasmodium falciparum* ដែលអ្នកជម្ងឺជាច្រើនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុស។ កត្តាខុសគ្នាខ្លះនៃបាបេស្យារួមមានប្រូតូសូអាមានទំហំនិងរូបរាងប្រែប្រួល។ ត្រូហ្វូសូអ៊ីតនៅក្នុងអេរីត្រូស៊ែលចឡើងជាទម្រង់តេត្រានេះជាការបង្ហាញពីបាបេស្យា។ ការពិនិត្យមើលដើម្បីញែកឲ្យច្បាស់ប្រភេទទាំងពីរនេះ។


ទោះបីជាមានការសិក្សាយ៉ាងច្រើនលើ *Babesia* និង *Malaria* ក៏ដោយក៏ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានការខុសដែរដោយសារគំនាសឈាមអាចកើតឡើងជាញឹកញាប់និងមានបញ្ហា។ រោគវិនិច្ឆ័យគួរត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងការតេស្តចាំងពន្លឺជាមួយអង់ទីកូរមិនផ្ទាល់ (Indirect Fluorescent Antibody: IFA)។ ការធ្វើតេស្ត IFA មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងការធ្វើតេស្តតាមរយៈគំនាសឈាមពី ៨៨%-៩៦% នៃអ្នកមានជម្ងឺ។ វិធានការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈអង់ទីគីវាមានសារៈយោជន៍ដើម្បីកំណត់សម្គាល់ Serumprevalence ក្នុងអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាមិនច្បាស់លាស់។ ដោយហេតុភាពឆ្លង *Babesia* តាមរយៈការបញ្ចូលឈាមការធ្វើតេស្ត IFA ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពលើការត្រួតពិនិត្យជម្ងឺក្នុងឈាមដែលត្រូវបានធ្វើអំណោយ។

- ការព្យាបាល

មានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងព្យាបាលជម្ងឺបាបេស្យាសត្វ។ នៅក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកជម្ងឺមានអាការៈជាសះស្បើយឯកឯងចំពោះអ្នកធ្លាប់ឈឺជំងឺនេះ ដែលគ្មានរោគសញ្ញាជាក់លាក់។ អាការៈបែបនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងករណីនៃជំងឺ *B. microti* ដែលជាទូទៅកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋ។ ចំពោះជំងឺ *B. divergens* និង *B. microti* ការព្យាបាលទៅតាមរោគសញ្ញាដោយផ្តល់ថ្នាំតាមមាត់ឬតាមសរសៃឈាម។



រូបភាពទី១២ វដ្តជីវិត Babesia microti



រូបភាពទី១៣ វដ្តជីវិតនៃប៉ារ៉ាស៊ីត Babesia microti ឬ Babesia divergens ចម្លងទៅមនុស្ស

ខ. តេឡេរីយ៉ា (Theileria)

តេឡេរីយ៉ាជាបរាសិតដែលបង្កជំងឺដល់សត្វទំពារអៀងស្រុកនិងព្រៃ។ សត្វទាំងនោះត្រូវបានឆ្លងពីចៃ។ វាមាន២ប្រភេទ៖

- Theileria parva ជាប្រភេទជំងឺដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងកើតឡើងជាពិសេស នៅតំបន់ខាងកើតកណ្តាលនិងខាងត្បូងអាហ្វ្រិកហើយវាបង្កឱ្យមានជំងឺ East Coast fever។
- Theileria annulata កើតឡើងនៅអាស៊ីឥណ្ឌូរុស្ស៊ីមជ្ឈិមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងវាបណ្តាលឱ្យមានជំងឺtheileriosisត្រូពិច។ ជាពិសេសសត្វពាហនៈឆាប់ទទួលជំងឺនេះណាស់។ ជំងឺទាំង២ខាងលើនេះកើតឡើងលើផលិតកម្មសាច់និងផលិតកម្មទឹកដោះក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។

• ចម្លងរោគដំបូងទៅថនិកសត្វ

បរាសិតចូលទៅបញ្ជីតាមរយៈនៃការខាំរបស់ចៃ។ ពពួកស្បែកស្នូរស្និតនៅក្នុងទឹកមាត់ចៃត្រូវបានចាក់បញ្ចូលក្នុងសត្វពាហនៈ។ កំឡុងពេលចៃខាំពួកស្បែកស្និតស្វែងរកនឹងចូលទៅក្នុងឡាំហ្វូសែ (កោសិកាឈាមស) នៃបញ្ជីនោះ។

• ដំណាក់ឡាំហ្វូសែ (Lymphocyte)

នៅក្នុងដំណាក់ឡាំហ្វូសែពួកស្បែកស្និតលូតលាស់នឹងក្លាយជាស្តីសុន (schizonts)។ ឡាំហ្វូសែនឹងក្លាយជាឡាំហ្វូប្លាស (lymphoblasts) ។ វានឹងដុះជាលំដាប់ឡើងទ្វេបរាសិតនៅក្នុងដំណើរនោះ។ នេះហើយអនុញ្ញាតឱ្យជំងឺរាលដាលយ៉ាងរហ័សនិងបណ្តាលឱ្យសត្វឈឺងាប់ក្នុងរយៈពេល៣-៤អាទិត្យ។

• ដំណាក់មេរូសូអ៊ីត (Merozoite)


ការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងស្តីសុនខ្លះនឹងប្តូរជាមេរូសូអ៊ីត។ វាចាកចេញពីឡាំហ្វូសែហើយវាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាម។ បន្ទាប់មកវានឹងចូលទៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហម ហើយវាលូតលាស់ជាពិរូប្លាសយ៉ាងពេញលេញ (piroplasms)។

• ដំណាក់ចៃ

កាលណាចៃខាំសត្វមានជំងឺវា នឹងលេបកោសិកាឈាមក្រហមដែលផ្ទុក ទៅដោយពិរូប្លាស។ នៅក្នុងពោះវៀនចៃពិរូប្លាសបង្កជាគីណេត (kinetes) បន្ទាប់មកវានឹងជ្រៀតចូលទៅក្នុងក្រពេញទឹកមាត់។ កន្លែងនេះហើយដែលវានឹងក្លាយជាស្បែកស្និតនិងបន្តស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ចៃខាំនិងចម្លងទៅបញ្ជីផ្សេងទៀត។

• រោគសញ្ញា

អំឡុងពេលពី៣ទៅ៤អាទិត្យសត្វពាហនៈឈឺនិងមានភាពច្របូកច្របល់។ ភាពច្របូកច្របល់ចេះតែវិវត្តន៍យ៉ាងលឿនដែលនឹងនាំឱ្យចៀសមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយ។



រូបភាពទី១៤ វដ្តជីវិត តេឡេរីយ៉ា (Theileria)

• វិធានការណ៍ការពារ/ដំណោះស្រាយ

បំបាត់ជំងឺដោយពន្លឺចសត្វទៅក្នុងទឹកដែលមានថ្នាំសម្លាប់រោគប្រូតូដាស្តូស៊ីសនេះជាវិធានការណ៍ដ៏សក្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃ។ ចែធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនេះជាការលំបាកដើម្បីត្រួតពិនិត្យជំងឺតាមមធ្យោបាយទាំងនេះ។ រោគវិនិច្ឆ័យអាចប្រតិបត្តិដោយយកឈាមឬលសិកា (lymph) មកវិភាគដើម្បីរកបរាសិត។ ការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកអង់ទីសែនជាក់លាក់អាចជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺបាន។ សត្វពាហនៈដែលរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីឈឺហើយវានឹងអាចមានភាពសុំបូបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងស្របការពារជំងឺ។

១.៦. សាខារេស្មីដូស្ត័រ៉ា (Phylum Cnidospora)

ស្មីដូស្ត័រ៉ា (Cnidospora) ជាសាខារេស្មីដូស្ត័រ៉ាដែលមានស្មីដូស្ត័រ៉ាមាន០២ថ្នាក់គឺថ្នាក់៖ Myxosporidea និង Microsporidea.

-Myxosporideaមានលំដាប់០៣គឺMyxosporida, Actinomyxida, and Helicosporida.

-Microsporideaមានតែលំដាប់០១គឺMicrosporida។

ក្រុមទាំងនេះមានស្បែងនិងមានប៉ូលហ្វីឡាម៉ង់មួយឬច្រើន។ Myxosporidiansមានគម្របប៉ូល

ហើយប៉ូលនីមួយៗមានបំពាក់ហ្វីឡាម៉ង់ភាគច្រើនវាជាបរាសិតនៅក្នុងខ្លួនត្រី។ ចំណែក Microsporidiansវិញមានបំពាក់ប៉ូលហ្វីឡាម៉ង់មួយវែង។ វាជាបរាសិតនៅក្នុងសត្វឥតមានឆ្អឹងកងនិង

សត្វមានឆ្អឹងកងដែលមានឈាមត្រជាក់។


Nosemadiseaseជាជំងឺដែលកើតក្នុងពោះវៀនឃ្មុំ (Louis Pasteur) បណ្តាលឱ្យកើតជំងឺ Pebrine នៃដង្កូវសូត្រនិងជំងឺផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកឃ្មុំ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃសាខារងនេះមានស្រូវដែលមាន ០១ឬច្រើនម៉ាស់ប្រូតូប្លាហៅថាស្រូវប្លាស (sporoplasms) ស្រូវមាន ០១ឬច្រើនហ្វីឡាម៉ង់ដែលព័ទ្ធពេន ក្នុងស្រូវតែម្តងឬក្នុង ០១ឬច្រើនប៉ូលរបស់កាប់ស៊ុល (capsules) ។ ភ្នាសស្រូវជាស្រូវ ០១០២ឬច្រើន ជាន់ដែលហៅថាប្រើស (valves) ។

ខណៈស្រូវត្រូវបានលេបពីម្ចាស់ថ្មីហ្វីឡាម៉ង់លយចេញហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះស្រូវប្លាសត្រូវ បានរំដោះ។ ឥឡូវនេះស្រូវប្លាសហៅថាអាមេបូឡា (amebula) បានទៅដល់កន្លែងជាក់លាក់មួយដោយ ឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងពោះវៀនឬតាមសរសៃឈាម។ ក្នុងដំណាក់កាលនៃវដ្តជីវិតអាមេបូឡាបានក្លាយជា trophozoite ដែលបានលូតលាស់ដោយម្ចាស់របស់វា។

បន្តពូជដោយអភេទដោយសារប្រេះជា ០២ ប្រេះជាច្រើនដុះពន្លកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចបាន ជាភោសិកាបន្ទាប់មកលូតលាស់ជាស្រូវរុង (sporonts) និងបន្ទាប់មកក្លាយជាស្រូវប្លាសដែលផលិតបាន ស្រូវ ០១ ឬច្រើន។

១.៦.១. ម៉ែខូស្តីរីដា (Myxosporidea)

ថ្នាក់ Myxosporidea ជាសាខារងនៃស្ទីដូស្តីរី។ វាបង្កលក្ខណៈដោយផលិតស្រូវដែលមានប្រើស (valves) ០១ ឬ ០២ ដោយមានស្រូវប្លាសទោលព្រមទាំងមានប្រូតូប្លាស Iodinophil ០១។ Myxosporidian ភាគច្រើនជាបរាសិតត្រី។ វាបង្ករោគគ្រប់ផ្នែកខ្លួនសត្វដូចជាបេះដូងខ្នុរក្បាលនិងជា ញឹកញាប់នាំឱ្យផ្លាស់ប្តូររោគសាស្ត្រយ៉ាងសម្បើមក្នុងជាលិកាគោល។ បង្ករោគដោយលេបស្រូវរបស់ត្រី។ សេរីលាយអាហារធ្វើឱ្យហ្វីឡាម៉ង់ប៉ូលលយចេញនិងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវែងស្រូវប្លាសត្រូវបានរំដោះ ចេញពីស្រូវ។ ស្រូវ រុង ឬ amebula ទៅដល់កន្លែងបង្ករោគជាក់លាក់ផ្ទាល់តែម្តងដោយឆ្លងជញ្ជាំងពោះ វៀនឬតាមសរសៃឈាម។ Amebula បានក្លាយជា trophozoite ក្នុងខណៈវាចាប់ផ្តើមទទួលអាហារពីជា លិកា។ ជាបន្តបន្ទាប់មក trophozoite ប្រព្រឹត្តទៅរហូតបានជាចំណែកណែយ៉ូបន្តបន្ទាប់បង្កើតចំនួន ភោសិកា។ ដោយដំណើរពន្លកទាំងនោះវាបានលូតលាស់ជាស្រូវរុង។ ស្រូវរុងបានក្លាយជា mono-sporoblast (ស្រូវតែ ០១) រីឯ Pansporoblast បង្កើតស្រូវពី ០២ ឡើងទៅ។ ស្រូវរុងទទួលរងនូវសេរីពីការធ្វើចំណែក ណែយ៉ូហើយចំនួនណែយ៉ូដែលបានផលិតនឹងកំណត់ចំនួនស្រូវនិងប៉ូលកាប់ស៊ុលត្រូវបានបង្កើតឡើង ណែយ៉ូទាំង ០២ រលាយចូលគ្នាបង្កើតបានជាស៊ីកូតស្រូវប្លាស។



រូបភាពទី១៥ វដ្តជីវិតនៃមីខូស្ទ័រីដា (Myxosporidea)

១.៦.២. មីក្រូស្ទ័រីដា (Microsporidea)

មីក្រូស្ទ័រីដាបង្កបង្កើតជា សាខានៃពួកបរាសិតដែលមានកោសិកាមួយព្រមទាំងមានស្រូវផង។ ភាគច្រើនវាចម្លងរោគដល់សត្វល្អិតប៉ុន្តែវាក៏ចម្លងដល់ពួកខ្លាខ្នងនិងត្រីផងដែរ។ តាមធម្មតាប្រភេទមីក្រូស្ទ័រីដាផ្សេងគ្នាបង្ករោគអ្នកបញ្ជើមួយជាក់លាក់ឬទាក់ទិននឹងក្រុមបញ្ជើ។ ក្នុងបីទៅបួនប្រភេទភាគច្រើនវាមានឱកាសបង្ករោគដល់មនុស្សផងដែរ។ ប្រមាណ១០% នៃប្រភេទគឺជាបរាសិតសត្វមានផ្ទឹមកងក្នុងនោះក៏មានមនុស្សផងដែរ។

បន្ទាប់ពីបង្ករោគមកវាមានឥទ្ធិពលលើបញ្ជើរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗហើយនៅគ្រប់សីវរាងនិងជាលិកាត្រូវបានរាតត្បាត។ ប្រភេទខ្លះអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាន។

- រូបសាស្ត្រ

មីក្រូស្ទ័រីដាខ្លះមីតូកុងដ្រីយ៉ាប៉ុន្តែវាជំនួសដោយមីតូសូម។ ពួកវាខ្លះចេតនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើចលនាឬកន្ទុយ។ មីក្រូស្ទ័រីដាផលិតស្រូវដ៏រឹងមាំសម្រាប់រស់រានមានជីវិតខណៈពេលវារស់ក្រៅបញ្ជើរបស់វារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ស្រូវរបស់ពួកវាមានរូបរាងខុសគ្នាពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយ។ ស្រូវនៃប្រភេទជ័ច្រើនមានរាងពងក្រពើឬរាងដូចដប។ ពួកខ្លះមានស្រូវរាងស្រួចចុងម្ខាងតែមួយគត់។

ស្លឹកត្រូវបានការពារដោយជញ្ជាំងមួយដែលមានបីស្រទាប់៖ស្រទាប់ក្រៅ (exospore) ស្រទាប់ក្នុង (endospore) និងភ្នាសប្លាស្មា (plasmamembrane) ។


នៅក្នុងករណីដ៏ច្រើនវាមានណ្វៃយ៉ូពីរជិតគ្នាដែលបង្កើតបានជាឌីប្លូការីយ៉ូ (diplokaryon) ប៉ុន្តែជួនកាលមានតែមួយគត់។

នៅពាក់កណ្តាលខាងមុខនៃស្លឹកមានប្រដាប់មួយដូចជាស្នូសនឹងតាមបណ្តោយប៉ូលហ្វីឡាម៉ង់ បំពាក់នៅពាក់កណ្តាលខាងក្រោយនៃស្លឹក។ នៅផ្នែកខាងមុខប៉ូលហ្វីឡាម៉ង់ត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយប៉ូឡារ៉ូប្លាស្ត (polaroplast: បន្ទះៗនៃភ្នាស) ។ នៅចន្លោះប៉ូលហ្វីឡាម៉ង់មានវ៉ាកុយអូល។

• ចម្លងរោគ

នៅក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារ នៃបញ្ជីនោះស្លឹកមានការលូតលាស់។ វាក៏សាងបានសម្ពាធអូស្តូរ ហូតជញ្ជាំងដ៏រឹងរបស់វាដាច់ចេញពីចំណុចស្តើងនៃកំពូលរបស់ស្លឹក។ វ៉ាកុយអូលខាងមុខប៉ោងត្រូវបាន ជំរុញហ្វីឡាម៉ង់ប៉ូល ដើម្បីបញ្ចេញធាតុចម្លងយ៉ាងរហ័សទៅក្នុងស៊ីតូប្លាស្តនៃអ្នកបញ្ជី។ ជាបន្ត បន្ទាប់មកសម្ភារៈហ្វីឡាម៉ង់ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដើម្បីបង្កើតបានជាបំពង់មួយដែលមានគ្លុនាទីដូច ជាមូលស្បែកមួយចាក់បញ្ចូលភ្នាសពោះវៀន (gut epithelium) ។

ចុងម្ខាងខាងក្នុងកោសិកាបញ្ជីស្លឹកលូតលាស់ធ្វើចំណែកប្រដាប់ប្លាស្តិកដូចដែលមានណ្វៃយ៉ូ ច្រើនមុនផលិតស្លឹកថ្មី។ វដ្តជីវិតប្រែប្រួលយ៉ាងសម្បើម។ ខ្លះបន្តពូជដោយអភេទដ៏ងាយក្នុងវដ្តជីវិតរបស់ វាក្នុងខណៈពេល ពពួកខ្លះមានសភាពសាំញ៉ាំពេល គឺវាតពូជដោយអភេទនិងដោយភេទផង។ ប្រភេទ ស្លឹកខុសៗគ្នាអាចផលិតដំណាក់ផ្សេងគ្នាព្រមទាំងមានគ្លុនាទីខុសគ្នារួមមានស្វ័យចម្លងរោគ (ចម្លងតែ ក្នុងបញ្ជីមួយគត់) ។



រូបភាពទី១១៦ វដ្តជីវិតនៃ មីក្រូស្ទីរីដា (Microsporidea)

ជំពូកទី២

សាខាពិរេកា (Phylum Porifera: Sponges)

សេចក្តីផ្តើម

ស្ប៉ុងគឺជាសត្វពហុកោសិកាថ្នាក់ទាបមិនអាចបំលាស់ទីបានហើយ គេឃើញវាដុះតាមទម្រង់របស់វា។ ពួកវាមានប្រភេទខុសៗគ្នាខ្លះមានលក្ខណៈជាសំបកស្មើរាងដូចជូផ្កាដូចផែនដីមានបែកមែក។ រាងរបស់វាមិនទៀងទាត់ដែលមានប្រវែងពី១ម.មទៅ១.៨ម។ ភាគច្រើនមានពណ៌ប្រផេះឬប្រផេះស្រអាប់។ ផ្សេងៗទៀតមានពណ៌ក្រហមរលោងលឿងខៀវឬខ្មៅ។ ស្ប៉ុងទាំងអស់រស់នៅក្នុងទឹកនិងតោងជាប់នឹងជួសំបកខ្នងគ្រែនិងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀត។ ប្រភេទស្ប៉ុងភាគច្រើនរស់នៅសមុទ្ររស់នៅពីទឹករាក់ទឹកជ្រៅ (ជំរៅពី៧.៣គ.ម) ប៉ុន្តែមានមួយគ្រួសាររស់នៅពាសពេញទឹកសាប។ ឈ្មោះ: Porifera (L.porus+spore+ferreto bear) ដែលខ្លួនមានរន្ធតូចៗចំហលើផ្ទៃខ្លួនសត្វ។ គ្រប់ប្រភេទស្ប៉ុងរស់ក្នុងទឹកសមុទ្រមានគ្រោងផ្តិតអាចបត់បានប៉ុន្តែគ្រោងណាមួយវាវាវាជាប្រូតូប្លាសហើយអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។

២.១. ចរិតលក្ខណៈ:

- ស៊ីមេន្តមានសណ្ឋានដូចកាំបូគ្មានពហុកោសិកា។ កោសិកាមិនបានរៀបចំពេញលក្ខណៈជាជាលិកាទេដោយមានមេសង់យីម (mesenchyme) នៅចន្លោះ។
- ខ្លួនមានរន្ធតូចៗ លក្ខណៈដូចប្រឡាយ ឬមានបន្ទប់តូចៗដែលទឹកអាចហូរឆ្លងកាត់បាន គ្មានខ្នែងផ្សេងៗចំណែកខ្លះអាចធ្វើចលនាបាន ឬជាសរីរាង្គ។
- ផ្នែកផ្ទៃខាងក្នុងខ្លះឬទាំងអស់មានភ្ជាប់នឹងកោសិកាដាក់ដង្កូវនៃផ្លាសែល (choanocytes) និងរំលាយអាហារក្នុងកោសិកា។
- ជាញឹកញាប់គ្រោងផ្តិតមានលក្ខណៈធ្មាញក្តីមានលក្ខណៈកំណាត់ៗ (spicules) ឬជាតិសរសៃសរីរាង្គមានការប្រែប្រួល។
- បន្តពូជដោយអភេទ (ខ្នែងឬgemmules) និងដោយភេទ (ស៊ុតនិងស្ពែម៉ាតូអ៊ីត) កូនមានរោមនិងហែលដោយសេរី។

ស្ប៉ុងទាំងឡាយដូចប្រូតូសូអ៊ែរខ្លះដែលមានកោសិកាដាក់ដង្កូវផ្លាសែលនិងរំលាយអាហារក្នុងកោសិកា។ ភាគច្រើនពួកវាមិនដូចសត្វពហុកោសិកាទេ (Meta-zoa) ដែលខ្លះសរីរាង្គនៅក្នុងកោសិកា។ ជាលិកាមិនរៀបចំត្រឹមត្រូវ។ ស្ប៉ុងទាំងនោះឲ្យឈ្មោះថា Parazoa (Gr. Para: ក្បែរ) ដែលវាមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ផ្ទាល់នៃការវិវត្តរវាងឯកកោសិកានិងពហុកោសិកានោះទេ។

២.២. ស្បៀងសាមញ្ញ

Leucosolenia មានមាឌតូចរស់នៅទឹករាក់ចំពោះស្បៀងសមុទ្រ។ មានក្រុមខ្លះមានទម្រង់ដូចថ្មស្តើងដូចបំពង់ផ្តេកបញ្ចូលគ្នា។ ផ្នែកត្រង់ទៅលើនីមួយៗមានថង់ស្តើងហើយបិទមិនជិតនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលឬហៅថា Spongocoel និងOsculum បើកដំដំនៅចុងកំពូល។ ភ្នាសបង្កើតដោយ (១)Epidermis ស្បែកលើខាងក្រៅបង្កសំហើយស្តើង និង (២)Choanocytes ភ្នាសខាងក្នុងបង្កសំហើយភ្ជាប់នឹងភ្នាសផ្សេងៗ។ នៅចន្លោះស្រទាប់ទាំងពីរគឺ (៣)ជាតិខាប់អន្ទិលមេសង់យីម។ បន្ទាប់មកមានមាន (៤) Amoebocytes កោសិកាសេរីដែលមាន ២-៣ប្រភេទ និង (៥) Spiculesភាគល្អិតៗពណ៌សនៃកាបូណាតកាល់ស្យូម។ Spicules ខ្លះស្តើងមូលហើយវែងនិងខ្លះទៀតមានពីរបួនកាំរស្មី។ តាមរយៈការកាត់ភ្នាសគេសង្កេតឃើញOstiaតូចៗពីផ្ទៃលើផ្នែកខាងក្រៅរហូតដល់ប្រហោងខាងក្នុង។ រន្ធកោសិកានីមួយៗ (Porecyte) គឺជាចង្កូរដែលឆ្លងកាត់បំពង់កោសិការបស់ស្រទាប់ក្រៅកោសិកា។ កោសិកាកងនីមួយៗមានរាងមូលប្រាង្គពងក្រពើជាប់នឹងមេសង់យីម។

រន្ធនីមួយៗបើកហើយបិទនិងAmoebocytesធ្វើចលនាដោយសេរីនៅក្នុងទឹកឬជាតិអន្ទិលមេសង់យីម។ កន្ទុយវាត់ទៅមកនាំលំហូរទឹកនៅOstiaភាគច្រើនឆ្លងកាត់ប្រហោងកណ្តាលហើយចេញមកក្រៅOscutum។ ទឹកនាំយកអុកស៊ីសនិងអាហារហើយក៏បញ្ចេញកាកសំណល់ចោល។ អាហារគឺជាសត្វល្អិតៗនិងរុក្ខជាតិហើយជាចំណែកតូចៗរូបធាតុសរីរាង្គ។ ពួកវាចាប់និងរំលាយនៅក្នុងកោសិកាកងឬរុញទៅ Amoebocytes។ ការខ្វះសរីរាង្គវិញ្ញាណពិសេសឬកោសិកាប្រសាទវាជំរុញដំណើរយឺតៗពីកោសិកាមួយទៅកោសិកាមួយទៀត។ ស្បៀងមិនអាចធ្វើចលនាហើយបង្រួញខ្លួនប៉ុន្តែអាចធ្វើចលនាបន្តិចបន្តួចបាន។

២.៣. ស្បៀងដៃទៀត

ចំពោះស្បៀងមានរាងស្តើងគេបានឲ្យឈ្មោះថាស៊ីហ្វា (Scypha) (ពីមុនឈ្មោះ Sycon ឬ Grantia)។ ភ្នាសខ្លួនវាក្រាស់បត់បានហើយវាបង្កើតជាចង្កូរខ្លីៗ៖ (១)ប្រឡាយ (Incurrent canals) បើកនៅខាងក្រៅដោយឆ្លងកាត់រន្ធតូចៗ(Ostia)ប៉ុន្តែបញ្ចប់នៅខាងក្នុង (២)ប្រឡាយបែកដូចកាំ (Radial canals) បិទនៅខាងចុងបង្កសំប៉ុន្តែវាបើកដោយរន្ធតូចៗ (apopyles)ម្តងម្កាលទៅផ្នែកកណ្តាលរបស់ Spongocoel។ ចង្កូរតូចៗ (Prosopytes) ភ្ជាប់ទៅIncurrentនិងRadialcanal។ ផ្ទៃខាងក្រៅត្រូវបានគ្របដោយទ្រនាប់ជាលិកាស្តើងដែលគេហៅថា dermalepitheliumspongocoel ស្ថិតនៅជុំវិញនឹង Gastrale pitheliumនិងកាកងដែលស្ថិតនៅជាមួយRadialcanal។ ប្រឡាយភាគច្រើនរីកធំផ្ទៃខាងលើទៅក្នុងទឹក។ នៅចន្លោះស្រទាប់មានមេសង់យីមលក្ខណៈសថ្លាៗផ្ទុកដោយកោសិកាAmoeboid។ Spicules ទម្រង់វែងហើយត្រង់នៅជុំវិញOsculumពពួកដែលខ្លីៗហើយត្រង់ស្ថិតនៅជុំវិញ Ostia Spicules មានរាងជាអក្សរLទម្រង់ទៅ Spongo coelនិងបែកជាបីក្នុងតួភ្នាសកោសិកា។ Spicules ត្រង់ៗលយចេញពីតួភ្នាសដូចជាមេសង់យីមប្រដាប់នៅលើផ្ទៃខាងក្រៅ។

ស្បៀងផ្សេងៗទៀតនៅតែមានចង្កូរវែកសំបកសំបកជាមួយកោសិកាកង។ ពពួកស្បៀងដែលមានជាតិកំបោរ (Leucosolenia, Scypha, etc) មាន Spicules កំបោរនិងស្បៀងផ្សេងទៀតមាន Silica ។ Spicules ភាគច្រើនសំបកហើយប្រភេទទាំងនោះខ្លះនៅក្នុងទឹកជ្រៅ (Hexactinellida) ។ Spicules និងជាតិសរសៃបញ្ចេញដោយកោសិកា amoebocyte ពិសេសគេឱ្យឈ្មោះហៅថា Scleroblasts នៅក្នុងមេសង់យើម។

២.៤. បន្តពូជ

មួយផ្នែកនៃស្បៀងបាត់បង់ដោយរបូសហើយជំនួសដោយការកើតឡើងវិញ។ ប្រភេទស្បៀងខ្លះកើតឡើងដោយបែកជាពន្លក។ ទោះបីពន្លកទាំងឡាយណាបែកចេញពីស្បៀងដើមមានការលូតលាស់ក៏ដោយក៏សំណល់ភ្ជាប់នោះបង្កើនមាឌឬចំនួនរបស់ផ្នែកនៃក្រុម។ ស្បៀងទឹកសាបនិងស្បៀងផ្សេងទៀតបង្កើតខ្លួននៅខាងក្នុងឬ Gemmules ដែលប្រើប្រាស់ពេលឆ្លងកាត់ភាពត្រជាក់រាំងស្ងួតឬលក្ខខណ្ឌមិនល្អផ្សេងទៀត។ ខ្លួនត្រូវបានបង្កើតពីក្រុមកោសិកា Amoebocytes នៅក្នុងមេសង់យើមដែលសម្បូរដោយអាហារហើយនៅជុំវិញមានប្រដាប់ការពារនៅគ្រប់លើ។ ពេលស្បៀងងាប់ខ្លួនតូចៗបំបែកមួយរំពេចរួចរង់ចាំមានមជ្ឈដ្ឋានសមស្របរបស់វាមកដល់នៅក្នុងខណៈពេល នោះស្បៀងនីមួយៗចាប់ផ្តើមលូតលាស់ជាស្បៀងថ្មី។

បន្តពូជដោយភេទស្បៀងខ្លះផលិតអូវុលផិងនិងស្បែម៉ាតូសូអ៊ីតផិងដោយហេតុថាភេទដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយក៏ខ្លះកោសិកាបានពីកោសិកា Archeocytes នៅក្នុងមេសង់យើមដែលជាកន្លែងអូវុលចាំបង្កកំណើតជាមួយស្បែម៉ាតូសូអ៊ីតពីស្បៀងផ្សេងទៀត។ ស៊ីតលូតលាស់រួចក្លាយទៅជាកូន Amphibla-stula ។ វាហែលដោយកន្ទុយបានរយៈពេល២-៣ម៉ោងបន្ទាប់មកវាតាំងលំនៅហើយក៏ភ្ជាប់នឹងវត្ថុផ្សេងៗហើយវាក៏លូតលាស់ជាកូនស្បៀង។

២.៥. នាក់ទទនិងសត្វផ្សេងទៀត

ពួកសត្វខ្លះស៊ីនិងចាប់ស្បៀងប្រហែលដោយសារ Spicules ។ ប៉ុន្តែ Arthropods ភាគច្រើនដង្កូវសិប្បិសត្វនិងប្រភេទត្រីខ្លះទៀតជាជម្រកនៅក្នុងចង់ស្បៀងទៅវិញ។ ដង្កូវ Spongilla ហែល (លំដាប់ Neuroptera) រស់នៅជាមួយនិងផ្តល់ជាចំណីឱ្យស្បៀងទឹកសាប។ នៅក្នុងសមុទ្រ Nudibranch ពពួកសិប្បិសត្វស៊ីស្បៀង។ ប្រភេទក្តាមខ្លះចាប់ស្បៀងរស់ឱ្យនៅលើខ្លួនរបស់វា។ មានស្បៀងមួយប្រភេទមានលក្ខណៈដូចខ្លួងក្តក់។ ប្រភេទផ្សេងទៀត លូតលាស់ដោយរស់នៅក្នុងប្រហោងសំបកសិប្បិសត្វហើយពេលខ្លះវាក៏បំផ្លាញសំបកសត្វទាំងនោះផងដែរ។

២.៦. ស្បៀងឧស្សាហកម្ម

តាំងពីមុនមកមនុស្សប្រើសរសៃគ្រោងឆ្អឹង (fibrous skeleton) ដូចអំបោះរបស់ស្បៀង។ ទឹកនៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេ និងឈូងសមុទ្ររបស់ប្រទេសមិចស៊ិកូចាប់ពីរដ្ឋ Florida ទៅប្រទេសឥណ្ឌាខាងលិចមានប្រមាណ៩សែនគីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដែលគេបូមបានពីបាតសមុទ្រ។ ស្បៀងត្រូវបានគេ

យកទៅវិលាយបន្ទាប់មកយក ទៅសំអាតរួចហាលហើយយកទៅលក់នៅទីផ្សារ។ ឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេកាត់បន្ថយដីច្រើនដោយសារបញ្ចូលនូវស្បៀងសំយោគ។

ជំពូកទី៣

សាខាស្តីជាវិយ័រ: PHYLUM CNIDARIA (Coelenterata)

{Cnidarians (Coelenterates)}

សេចក្តីផ្តើម

សត្វថ្នាក់ទាបបំផុតដែលមានកោសិកាកំណត់ជាទម្រង់ជាលិកាច្បាស់លាស់ហៅថា Cnidarian (Gr.knide,nettle)។ រហូតដល់ពេលនេះ Cnidarian ឲ្យឈ្មោះថា Coelenterates ហើយគេរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅមួយចំនួន។ គេរាប់វាបញ្ចូលទាំង Hydroids ទម្រង់រុក្ខជាតិ (ថ្នាក់ Hydrozoa)។ វាមានសភាពទន់ភ្លឺដូចខ្លួនសមុទ្រហើយហែលលើយូឡ (ថ្នាក់ Scyphozoa)។ រួមជាមួយនឹងសមុទ្រ Anemones ទំនងដូចជាផ្កាដែលសម្បូរណ៍លើច្រាំង និងផ្កាជួរព្រមទាំងមានគ្រោងឆ្អឹងជាក់បែបដែលបង្កជាថ្មប៉ប្រះទឹកនៅលើឆ្នេរតំបន់ត្រូពិច (ថ្នាក់ Anthozoa) វាស់នៅជាចំណីគ្នាជាមួយគ្នាផង។ វាមាន ០២ ប្រភេទ (១) ប៉ូលីប (polyp) រាងជាបំពង់ដែលចុងម្ខាងបិទនិងវាភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុផ្សេងៗហើយនៅចុងម្ខាងទៀតស្ថិតចំកណ្តាលមាត់នោះរុំព័ទ្ធដោយព្រួញទន់ៗ និង (២) Medusa ហែលដោយសេរីមានខ្លួនអន្លឺលៗមានទម្រង់ដូចផ្លែត្រីដែលមានគែមជាព្រួញទន់ៗហើយមាត់របស់វានៅចំកណ្តាលនៃផ្ទៃផុត។ ប្រភេទទាំងពីរបង្ហាញនូវវដ្តជីវិតរបស់វា។ គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់រស់ក្នុងទឹកសាបប៉ុន្តែមានប្រភេទខ្លះៗរស់នៅក្នុងទឹកប្រៃ។

Hydroid polyp ខ្លួនឯងជាទូទៅតូចៗប៉ុន្តែរស់នៅជាក្រុមអាចមានប្រវែងពី២ម៉ែត្រទៅ១០ម៉ែត្រទៅ។ ប្រភេទខ្លះសមុទ្រមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែងពី១២មីលីម៉ែត្ររហូតទៅលើស២ម៉ែត្រ។ ជារឿយៗផ្កាជួរមានមាឌតូចប៉ុន្តែវាប្រមូលដុំម៉ាស់ហើយអាចលាតសន្ធឹងប្រហែល ១.៦០ គ.ម។

៣.១. បរិកលក្ខណៈ:

- ស៊ីមេទ្រីជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសតាមរយៈមាត់។ ខ្លួនវាមានទ្រនាប់ Epithelium អន្លឺលៗចំនួន ០២ (mesoglea) នៅចន្លោះនោះ។ កាបស៊ីលតូចៗហើយស្រួច (Nemato-cysts) មាននៅក្នុងស្រទាប់តែមួយឬទាំងពីរ។
- គ្រោងឆ្អឹងរបស់វាមិនមានក្នុងប្រភេទភាគច្រើនរីឯប្រភេទខ្លះមានពណ៌ដូចកំបោរ (Limy) ឬក្រិនរឹង។
- រន្ធរំលាយអាហារ (គ្មានទ្វារ) វាមានព្រួយទន់ៗនៅជុំវិញមាត់។
- គ្មានឈាមប្រដាប់ដង្ហើមឬសរីរាង្គបញ្ចេញចោល។ ប្រព័ន្ធប្រសាទជាបណ្តាញកោសិកាប្រសាទ និងសរសៃនៅក្នុងភ្នាសខ្លួននិងព្រួយ។ វាមានចំណុចភ្នែកនិង Statocysts ក្នុងប្រភេទខ្លះ។
- បន្តពូជប្រព្រឹត្តទៅដោយពន្លកអភេទក្នុងដំណាក់ក្លាប់ទៅនឹងថ្មបន្តពូជដោយភេទដោយស៊ុតនិងស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតនៅក្នុងដំណាក់ Medusa សេរី។ ខ្លះមានក្រពេញភេទងាយនិងគ្មានបំពង់ភេទ។

៣.២. ភ្នាក់ Hydrozoa (Hydroids)

៣.២.១. ទម្រង់របស់ Hydra

វាជាប៉ូលីប (polyp) ទឹកសាបតូចៗមានរាងស៊ីឡាំងស្តើង (ប្រវែងពី១០ទៅ៣០មីលីម៉ែត្រ) ដែលមានចុងក្រោមបង្កប់បិទនិងមានរាងដូចជើងសំរាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុផ្សេងៗ។ ខាងម្ខាងនៅទល់មុខមានមាត់ដែលមានព្រួយប្រហោងតូចៗពី៦ទៅ១០ជុំវិញមាត់ដែលអាចនាំឱ្យចង់រំលាយអាហារ ឬ ប្រហោង Gastrovascular (enteron) នៅក្នុងខ្លួន។ ខ្លួនសត្វទាំងមូលមានភាពបត់បែនខ្លាំង។ វាបន្លាយឱ្យវែងដូចជាបំពង់ស្តើងឬបង្រួញឱ្យមូលខ្លីដែលមានព្រួយពកៗប៉ុណ្ណោះ។ ផ្នែកខាងខ្លួនវាបង្កើតជាពន្លកសម្រាប់បង្កកំណើតដោយអកេទ។ នៅពេលនោះវាកើតកូនចៅនៅអូវីប្រូតងស្វាសបង្កកំណើតដោយភេទ។ ភ្នាក់ខ្លួនមានស្រទាប់ពីរ៖ស្រទាប់ក្រៅស្តើងឈ្មោះថាepidermisហើយខាងក្នុងក្រាស់ (gastrodermis) សម្រាប់រំលាយអាហារ។ នៅចន្លោះស្រទាប់ទាំងពីរនោះមានស្រទាប់មួយទៀតស្តើងគ្មានកោសិកាហៅ Mesoglea។ ស្រទាប់ទាំងពីរនេះភ្ជាប់គ្នានិងផ្តល់ឱ្យការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងការងារសម្រាប់ខ្លួននិងព្រួយរបស់វា។ ស្រទាប់ទាំងពីរមានកោសិកាសំខាន់ៗប្រភេទ។ ប្រភេទនីមួយៗមានទម្រង់ពិសេសនិងមុខងារអនុវត្តន៍ដំណើរជីវិត។


- ទម្រង់អក្សរ ្កកោសិកា epitheliomuscula បិទយ៉ាងជិតដើម្បីបង្កើតខ្លួន។ នៅបាតក្រោមមានសរសៃល្អិតៗកន្ត្រាក់ដែលភ្ជាប់តាមបណ្តោយរហូតMesoglea។ សរសៃល្អិតៗកន្ត្រាក់ទាំងនេះមានសកម្មភាពតាមសាច់ដុំទ្រវែង ដែលបង្រួញឱ្យខ្លួនខ្លី និងបង្រួញព្រួយរបស់វា។ ទម្រង់ស្រដៀងគ្នានោះដែរកោសិកា Epitheliodi gestive បង្កើតជាសំខាន់ៗក្រពះនិងជួយក្នុងការរំលាយចំណីអាហារ។ សរសៃល្អិតៗភ្ជាប់ផ្នែកទីងរបស់ Mesoglea និងធ្វើឱ្យសាច់ដុំមូលជួយបន្ថយអង្កត់ផ្ចិតហើយវាបន្លាយតាមបណ្តោយដងខ្លួន។ មានកោសិកាដ៏ច្រើននៅក្នុង Gastrodermis ដែលបង្កើតជាកន្ទុយមួយឬពីរ។
- កោសិកាក្រពេញរាងទ្រវែងគ្របលើជើង និងបញ្ចេញជាតិអិលដោយហែដ្រាដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុផ្សេងៗ។
- កោសិកាក្រពេញដ៏ធំកើនឡើងនឹងមាត់និងអ្វីផ្សេងក្នុងgastrodermisបន្ទាប់មកបញ្ចេញអង់ស៊ីមរំលាយអាហារ។
- កោសិកា interstitial រាងមូលតូចៗចន្លោះបាតកោសិកាepidermalធ្វើឱ្យមាន nematocysts ពន្លកកោសិកាភេទនិងកោសិកាផ្សេងទៀត។
- កោសិកាវិញ្ញាណស្តើងភ្ជាប់នឹងបណ្តាញរបស់កោសិកាប្រសាទ ដែលភ្ជាប់នឹង mesoglea ។ កោសិកាប្រសាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងសរសៃល្អិតៗនៅក្នុង
- កោសិកា epitheliomuscular។ ដូចនោះវាបង្កើតបានជា sensorymotor mechanism កោសិកាវិញ្ញាណទទួលការដាស់កោសិកាប្រសាទដឹកនាំជុំវិញ និងសរសៃល្អិតៗប្រតិកម្មពេលបន្ទាប់។

លើកលែងតែ neuromotor organelles នៅក្នុងប្រូតូសូអ៊ែរខ្លះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលយន្តការប្រសាទនៅក្នុងសត្វដោយផ្តល់សម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើចលនាខ្លួននិងព្រួយ។ ពួកវាគ្មានកូនកណ្តុរ (ganglion) កណ្តាលឬខួរក្បាលដូចសត្វមានផ្ទៃខ្នងថ្នាក់ខ្ពស់ទេ។

៣.២.២. ណេម៉ាតូស៊ីស (Nematocysts)

ណេម៉ាតូស៊ីសគឺជាកាបស៊ុលតូចដែលបំពេញដោយវត្ថុរាវនិងមានសរសៃបំពង់ (thread tube) ដែលពន្លាត់ចេញក្រៅអាចជួយក្នុងចាប់ចំណីឬការធ្វើចលនា។ សរសៃបំពង់នីមួយៗផ្លាស់ប្តូរកោសិកា interstitial ហៅថា Cnidoblast ដែលមានខាងក្រៅនៃ Cnidocil ។ ណេម៉ាតូស៊ីសកើតឡើងតែឯងនិងខ្លះទៀតជាក្រុមដូចអាកុយនៅក្នុងស្រទាប់កោសិកាធំមួយ។ តាមធម្មតាណេម៉ាតូស៊ីសស្ថិតនៅលើព្រួយប៉ុន្តែវាលេចឡើងនៅកន្លែងដទៃទៀតលើកលែងតែថាសគ្រឹះនិងមានជាច្រើនប្រភេទទៀត៖ ប្រដាប់ចាក់ទម្ងន់ (Penetrant) រាងមូលស្រួចជាមួយនឹងសរសៃបំពង់អាចទម្ងន់សត្វតូចៗបាន និងបាញ់សារធាតុរាវឱ្យខ្លិនចំណី Cnidocil តែឯងមិនមានសកម្មភាពដូចជាគន្លឹះដើម្បីដាស់តាមរបៀបមេកានិចទេ។

ណេម៉ាតូស៊ីសបានបញ្ចេញនូវវត្ថុរាវនេះជាលទ្ធផលនៃការផ្គុំគ្នានៃការដាស់តាមរបៀបមេកានិចនិងការដាស់តាមបែបគីមីចេញពីចំណី។



រូបភាពទី១៧ វដ្តជីវិតនៃ ណេម៉ាតូស៊ីស (Nematocysts)

៣.២.៣. ប្រវត្តិ

ហៃដ្រាវរស់នៅដោយភ្ជាប់នឹងវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែវាអាចរមួលនិងបង្វិលទៅក្រោយដើម្បីចាប់ចំណី។វាអាចផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដោយធ្វើចលនាជារង្វង់ដោយផ្តាច់នឹងប្រើប្រាស់ព្រុយដូចជើងដោយរំកិលជាមួយជើងឬបណ្តែតខ្លួនតាមឧស្ម័នពុះខ្យល់ដែលបញ្ចេញដោយជើង។នៅពេលត្រូវការចំណីវាបញ្ចេញព្រុយ។នៅពេលចាប់សិប្បិសត្វតូចៗកូនសត្វល្អិតឬសត្វណែម៉ាតូស៊ីសបញ្ចេញហើយធ្វើចលនាព្រុយបន្ទាប់មកវានាំយកចំណីចូលទៅក្នុងមាត់ក្នុងក្រពះហើយបញ្ចេញអង់ស៊ីមសម្រាប់រំលាយអាហារ។ការធ្វើចលនាភ្ជាប់ខ្លួននិងកន្ទុយសម្រាប់ចាប់អាហារ។ ការរំលាយអាហារខ្លះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អនៅក្នុងប្រហោងក្រពះនេះជាការរំលាយអាហារក្រៅកោសិកាដូចមាននៅក្នុងសត្វពហុកោសិកាកាតច្រើនដែរ។អាហារមួយចំនួនត្រូវបាននាំយកទៅវាកុយអូលក្នុងកោសិកានៃ gastrodermis ដែលជាកន្លែងរំលាយអាហារក្រៅកោសិកាដែលកើតឡើងដូចនៅក្នុងប្រូតូសូអ៊ែរនិងស្បៀងជាដើម។ ដូចនេះហៃដ្រារួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយនៃសត្វថ្នាក់ទាបនិងសត្វថ្នាក់ខ្ពស់។វាបញ្ចេញចោលកាកសំណល់តាមមាត់ដូចនេះវាប្រើមាត់ដូចជាវច្ឆមៈដែរ។

អាហាររំលាយត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកោសិកាហើយចាប់ផ្តើមប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងទឹកនៃឆ្អឹងមានសកម្មភាពមេតាប៉ូលីសដើម្បីបង្កើតពន្លកឬសរីរាង្គភេទ។អុកស៊ីសែនកាបូនឌីអុកស៊ីតបណ្តុះជំណកដង្ហើមនិងការបញ្ចេញចោលដោយការបំបាយមកតាមរយៈស្បែក។

ហៃដ្រាមានប្រតិកម្មតបនឹងបរិស្ថានតាមរយៈសភាពសរីរៈប្តូរទឹកនៃឆ្អឹង ការធ្វើចលនាព្រុយនៅពេលវារកអាហារ។ប្រសិនបើមានការរំខានវាបង្ហូរខ្លួននិងព្រុយរបស់វាសម្រាក។ ប្រសិនបើប៉ះពន្លឺផ្នែកជុំវិញនឹងលែងធ្វើការ។ ទោះបីមានការរំខានពីទឹកប៉ុន្តែការជុំវិញកាន់តែខ្លាំងទៅៗវានឹងបានទទួលលទ្ធផលមួយរំពេចដោយសារបំព្រួញរបស់ផ្នែកទាំងអស់ដ៏ពេញលេញ។ ប្រភេទនីមួយៗមានអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺប្រសើរបំផុត។ជាទូទៅហៃដ្រាវរស់នៅទឹកថ្លាហើយត្រជាក់ឬទឹកក្តៅខ្ពស់ៗ។ វាវរស់នៅក្នុងទឹកបឹងដែលមានជំរៅ៥៥ម៉ែ។

៣.២.៤. បន្តពូជ


កូនថ្មីវានឹងកើតដោយពន្លកភេទដែលបង្ករូបរាងជាថង់ (outpocketing) នៅលើផ្ទៃខ្លួនដែលមានepidermis mesogleas trodermis នឹងផ្នែករបស់ថង់ក្រពះ។ពន្លកបន្លាយព្រុយនិងមាត់ដុះជាលំដាប់បន្ទាប់មកបង្រួមខាងក្រោមនិងបង្កើតកូនហៃដ្រា។ ជានិច្ចជាកាលបង្កើតបានមេចានិងអាចផលិតបានជាក្រុមពន្លកដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុមហៃដ្រា។ប្រសិនបើហៃដ្រាកាត់ជាពីរប្រើចំណែកនោះផ្នែកនីមួយៗអាចបង្កើតឡើងវិញដោយពេញលេញបានប៉ុន្តែជាហៃដ្រាតូចៗ។ផ្នែកទាំងឡាយនៃរបស់ហៃដ្រាអាចបង្កាត់គ្នាបានផងដែរ។

ប្រភេទភាគច្រើនរបស់ហៃដ្រាគឺ dioecious hydra មួយអាចផលិតតែកោសិកាភេទឈ្មោល ឬញីហើយមាន២-៣ប្រភេទទៀតគឺជា monoecious ពោលគឺខ្លួនតែមួយមានភេទពីរ។ តាមធម្មតាការ

បង្កើតក្រពេញភេទកើតឡើងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។ ប៉ុន្តែនៅរដូវផ្សេងទៀតអាចមកពីសីតុណ្ហភាពទឹក ទាប។ ក្រពេញភេទ (អូវីផេលីតស៊ីតនិងពងស្វាសផេលីតស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត) សុទ្ធតែជាសរីរាង្គភេទ។ សរីរាង្គ ទាំង២កើតឡើងពីកោសិកាស្រទាប់ស្បែក(interstitial pidermal cells) ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត ពេញវ័យបានមកពីពងស្វាសរបស់ហែដ្រាមួយអាចធ្វើបង្កកំណើតនឹងស៊ីត នៃហែដ្រាផ្សេងទៀត។ Blastula ដុះលូតលាស់បង្កើតឲ្យមានសំបកប្រកំពកនៅជុំវិញវាហើយធ្លាក់មកក្រៅទៅក្នុងទឹករួចបន្តលូត លាស់មិនយូរប៉ុន្មានកូនហែដ្រាក្លាយហែដ្រាថ្មី។

៣.២.៥. ហែដ្រូអ៊ីត

វាស់ជាក្រុមមិនដូចហែដ្រាកាតច្រើនជាសមាជិករបស់ថ្នាក់ Hydrozoa នៅសមុទ្រទេដែល វាស់ជាក្រុមហើយវាភ្ជាប់មួយកន្លែងដូចរុក្ខជាតិ។ ផ្ដើមពីប្រសិបកមែកដើមលូតលាស់លេចឡើងរាប់ ពាន់ប៉ូលីប។ តាមធម្មតាវាមាន Gastrozooids (Polyps: ប៉ូលីបចិញ្ចឹម) និង Gonozooids (ប៉ូលីបបន្តពូជ)។ ជានិច្ចជាកាលក្រុមមានប៉ូលីបការពារឬ Dactylozooids ។ ចំណីអាហារចាប់ដោយប៉ូ លីបចិញ្ចឹមនិងរំលាយហើយចូលទៅពោះវៀន។ ផ្ដើមពីប៉ូលីបបន្តពូជ Medusae កូនតូចៗដែលមាន លក្ខណៈហាក់ដូចជាខ្លួនសមុទ្រត្រូវបានផលិតឡើងដែលអាចជួយ Gonozooid ឬរំដោះចេញទៅក្នុងទឹក ពួកវាលូតលាស់ហើយបន្ទាប់មកវាបង្កើតសរីរាង្គភេទដើម្បីផលិតស៊ីតនិងស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត។ ស៊ីតបង្ក កំណើតក្លាយជាដុះរោមដែលគេហៅថាកូន Planula ។ ពួកកូន Planula តាំងលំនៅដើម្បីផ្ដើមក្រុមថ្មីដោយ ពន្លកអភេទទាំងនោះ។



រូបភាពទី១៨ វដ្តជីវិតនៃ ហែដ្រូអ៊ីត

ក្នុងក្រុមដូចជា Obelia ចង់ក្រពះ (gastrozoid) អនុវត្តគ្រប់មុខងារលើកលែងតែបន្តពូជ។ Gonozoid មានតួនាទីបន្តពូជតែម្នាក់ឯងហើយបង្កើត Medusa បែកខ្ញែក។ Hydroidផ្សេងទៀត (Hydractinia រស់នៅលើសំបកក្តាម) រកចំណីដាច់តែឯងបន្តពូជហើយផលិតប៉ូលីបចុងក្រោយចាប់ផ្តើមពាក្យមានមាត់និងមាន Nematocysts ជាច្រើន។



៣.៣. ថ្នាក់ Scyphozoa (ខ្មែសមុទ្រ)

៣.៣.១. បេសាសម្ព័ន្ធនិម្មិតប្រមាណមួយជាតិ

នៅក្នុងថ្នាក់នេះ (Gr.skyphos, ពែង+zoon, សត្វ) Medusaមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែងពី២ស.មទៅ ៧០ស.មភាគច្រើននៃខ្មែសមុទ្រមានលក្ខណៈអន្លិលៗដូចMesoglea។ ប៉ូលីបមានតិចឬគ្មានតែម្តង។ ខ្មែសមុទ្រមានទម្រង់ខ្លួនស្រដៀងនឹងធ្មត្រ។ ជាយប់សំរាប់មានព្រុយនិងរាងដោយ lappets ចំនួន០៨ គូ។ នៅជុំវិញមាត់មានដៃ០៤ដែលមានលក្ខណៈជាចង្កូរ (ដៃមាត់:oral arms) ហើយនៅតែមនោះមាន nematocystsជាច្រើន។ ក្រៅពីប្រហោងក្រពះវាមានដៃ០៤ដែលផ្ទុកដោយក្រពេញភេទ ហើយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងចែកចាយកាត់ខ្លួនវាហើយទៅដល់ ring canal។ ចន្លោះគូនីមួយៗនៃ Leppet គឺជាសរីរាង្គវិញ្ញាណខាងពន្លឺហៅថាeyespot។ វាមានhollow statocyst ព្រមទាំងកំបោរគ្រាប់តូចៗសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានលំនឹងហើយមានរន្ធវិញ្ញាណចំនួន២ជាជំនួយក្នុងការស្គាល់អាហារ។

សាច់ដុំរាងវង់មូលបង្រួញខ្លួនជាចង្កាក់ដើម្បីបង្ខំទឹកនាំទៅក្នុងកន្លីផតនេះ ជាហេតុនាំឱ្យសត្វមានភាពទន់ខ្សោយ។ ចំណីអាហារសំខាន់របស់វាគឺពួកសត្វមានផ្លឹងកងថ្នាក់ទាបនិងត្រីដែលចាប់ដោយnematocystsនៅលើដៃមាត់ហើយបញ្ជូនទៅក្នុងមាត់។ អាហារដែលរំលាយត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈចង្កូរក្នុងខ្លួនវា។ ការដកដង្ហើមនិងការបញ្ចេញចោលប្រព្រឹត្តទៅដោយការបំភាយពីផ្ទៃនៃខ្លួន។ ប្រព័ន្ធប្រសាទធ្វើការសម្របសម្រួលបង្រួញជួងនិងធ្វើចលនាដៃមាត់។

ភេទមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែវាជាចំពឹងគ្នា។ ស្ត្រីម៉ាតូសូអ៊ីតសត្វឈ្មោលផ្តល់ទៅសត្វញីតាមរយៈទឹកហើយស៊ុតបង្កកំណើតស្ថិតនៅក្នុងអូវែ។ ស៊ុតតពីងអាស្រ័យលើដៃមាត់របស់វាទីនេះហើយជាកន្លែងដែលស៊ុតលូតលាស់និងក្លាយជាកូន Planulaមានរោម។ កូនទាំងនោះហែលបន្ទាប់មកវាបោះទីតាំងនៅបាតក្រោមហើយក៏ក្លាយជាប៉ូលីបល្អិតៗ (Scyphistoma) ដែលផលិតពន្លកសង្វាង។



រូបភាពទី១៩ វដ្តជីវិតខ្លួនសមុទ្រ

៣.៤. ខ្លាត់ Anthozoa (sea anemones, corals, etc.)

Anthozoa គឺជាប៉ូលីបសមុទ្រដែលមានលក្ខណៈដូចផ្កា (Gr.anthos, ផ្កា+ zoon, សត្វ) មានទំហំពីតូចទៅធំ។ ក្រៅពីសមុទ្រ anemones និងផ្កាថ្មក្រុមរួមមានសភាពទន់រាងដូចស្នែងផ្កាថ្មពណ៌ខ្មៅ និងផ្សេងទៀត។ ទាំងនោះខ្វះដំណាក់ medusa ។ វាមានច្រើននៅស្រទាប់ទឹកក្តៅល្មមខ្លះនៅសមុទ្រប៉ូលខ្លះរស់នៅជំរៅ ៦,៤គ.ម។

៣.៤.១. រចនាសម្ព័ន្ធ

Anemone (Metridium) មានខ្លួនជាស៊ីឡាំងខ្លីផ្នែកខាងលើមាត់ (oral disc) រាបស្មើខ្លីៗព្រួយរាងចង្កូរៗនៅជុំវិញមាត់បាតក្រោម (pedal disc) សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុផ្សេងៗ។ បំពង់អាហារ (Stomodaeum) គឺបំពង់សំប៉ែតភ្ជាប់ទៅនឹងមាត់ និងចង់ក្រពះ និងមានរោមនៅម្ខាង ឬសងខាង (Piphenoglyph) សម្រាប់ទឹកហូរទៅក្នុងនិងបញ្ចេញមកខាងក្រៅ។ នៅខាងក្នុងមាន septa ពេញលេញ ០៦ គូឬក្លាសពោះរៀនចែកប្រហោងខាងក្នុងជាថតៗនិងផ្សេងទៀត Septa មិនពេញលេញជាប់ទៅនឹងក្លាសខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនភ្ជាប់និងបំពង់អាហារទេ។ នៅ Ostia នៅក្នុង septa ពេញលេញសម្រាប់ឱ្យទឹកធ្វើចលនាចន្លោះថតទាំងនោះ។ Acontia លយចេញតាមន្ទក្នុងក្លាសខ្លួនឬតាមមាត់។ ក្រពេញភេទបង្កបង្កើតតាមបណ្តោយនៃតែម Septa ។

នៅលើផ្ទៃខាងក្រៅមានស្បែករោមលើមាត់ព្រួយនិងបំពង់អាហារ។ ប្រហោងខាងក្នុងជាថតក្រពះ។ មានតែថតក្រពះទេដែលមានសាច់ដុំសរសៃ។ សាច់ដុំសរសៃរាងមូលនៅក្នុងបង្គោលនិងតាមបណ្តោយ Septa ។ Mesoglea ជាភាសិកាភ្ជាប់ទៅនឹងជាលិកា។ មានបណ្តាញប្រសាទនៅក្នុងស្បែកនិងប្រសាទលេចឡើងមាននៅក្នុង Septa ។

វដ្តជីវិតរបស់ខ្លួនសមុទ្រ Aurelia ក្នុងថ្នាក់ Scyphozoa។ នៅពេលពេញវ័យមានភេទដាច់ពីគ្នាដែលផលិតស៊ុតនិងស្ពែមតូសូអ៊ីតនិងបង្កជាស៊ុតវិវត្តន៍នៅលើដៃមាត់របស់សត្វញី។ កូនPlanula មានរោមហែលបន្ទាប់មកតោងភ្ជាប់ដើម្បីក្លាយជា Scyphistomaតូចៗ។ ដោយប្រេះត្រឡប់ (Strobilation) នឹងទទួលបានEphyraeជាច្រើនដែលលូតលាស់ទៅជាខ្លួនសមុទ្រពេញវ័យ។ Medusae បន្ថយនិងខ្លះទៀតរីកធំ (Agassizនិង Wolcott ជីវវិទ្យាសត្វ McGraw-Hill Boik co.)។


៣.៤.២. ប្រមាញ់មេត្រីដាតិ

Anemone (metridium) រស់នៅភ្ជាប់ទៅនឹងថ្ម ឬវត្ថុរឹងផ្សេងទៀតខ្លះអាចលូតយ៉ាងយឺតនៅបាតក្រោម។ នៅពេលនោះវាដេរវាគ្របដណ្តប់ដោយទឹកនិងគ្មានអ្វីខាននោះខ្លួននិងព្រុយរបស់វាបន្តយឺតយ៉ាវ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការរំខានវាប្រសិនបើនៅកន្លែងទឹកជោរជោរខ្លួនវានឹងបង្រួញបិទនិងខ្លួនវានឹងបត់ចូលក្នុង។ រោមញីនិងថាសគ្រឹះវាយប្រហារដើម្បីចៀសចេញកំទេចផ្សេងៗ។ ចរន្តទឹកថេរសម្រាប់ការដកដង្ហើមនិងជួយជំរុញចុះទៅSiphonoglyph បញ្ជូនទៅក្នុងប្រហោងក្រពះនិងមកបំពង់អាហារ។ Anemoneស៊ីសិប្បិសត្វ(សន្តានខ្នងត្រី) ពពួកសត្វវន្តជាតិ(បង្កងកម្រិតសក្តានុពល)និងសត្វឥតមានឆ្អឹងកងផ្សេងទៀតនិងត្រី។ ចំណីនីមួយៗត្រូវខ្លិនដោយ Nematocysts និងនាំយកទៅដោយព្រុយបញ្ជូនទៅតាមមាត់ប៉ុន្តែវត្តខ្លះខាំដោយមាត់ផ្ទាល់និងបំពង់អាហារ។ ទាំងមាត់ទាំងបំពង់អាហារដែលត្រូវបើកចំហឱ្យធំៗក្នុងប្រហោងក្រពះអង់ស៊ីមបញ្ចេញដោយហ្វ្រូម៉ង់ឆ្មារៗ។ រំលាយអាហារនេះដែលត្រូវបានស្រូបដោយក្រពះ។ ចំណីដែលមិនរលាយត្រូវបានបញ្ចេញចោលមកក្រៅតាមមាត់។

វាមានភេទដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ក្រពេញភេទលេចឡើងនៅលើហ្វ្រូម៉ង់Septa។ ស៊ុតនិងស្ពែមតូសូអ៊ីតបានមកពីក្រពេញភេទផុសចេញពីមាត់ហើយបង្កកំណើតនៅក្នុងទឹក។ ស៊ុតលូតលាស់នៅតាមបណ្តោយ gastrulaហើយSeptaលូតលាស់នៅប្រហោងខាងក្នុងបង្កស្ពែមនិងប្លាស្តូពីក្លាយជាមាត់។ កូនដង្កូវតូចៗហែលហើយវាភ្ជាប់នៅបាតសមុទ្រលូតលាស់Anemoneតូចៗ។ ប្រភេទខ្លះរបស់Anemones បង្កកំណើតដោយអភេទដោយការធ្វើចំណែកឬការបែងចែកជាភាគរបស់ថាសគ្រឹះ។

៣.៤.៣. ផ្កាថ្ម

វាមានពីរក្រុមនៃពួកanthozansដែលគេដឹងថាផ្កាថ្មទន់ (Alcyonarean) និងផ្កាថ្មរឹង (Madreporarian) ។ ផ្កាថ្មទន់មានគ្រោងឆ្អឹងពាសពេញដូចស្លឹកឈើខាងក្នុងSpiculesនិងព្រុយ។ ផ្កាថ្មរឹងមានគ្រោងឆ្អឹងខាងក្រៅជាកំបោរ(កាល់ស្យូមកាបូណាត)។ កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ប៉ូលីបបង្កបង្កើតជាផ្កាថ្មនៅក្នុងសមុទ្រតំបន់ត្រូពិច (ខ្សែរយៈទទឹង២០°Nទៅ២០°S)ដែលមានសីតុណ្ហភាព២០ អង្សាសេឬក្តៅល្មម។



រូបភាពទី២០ វដ្តជីវិតផ្កាថ្ម

សំណួរ

- ១.ស្ប៉ុងក្លាប់នឹងកន្លែង (Sessile) និងមានទម្រង់ជារុក្ខជាតិហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកវានៅក្នុងថ្នាក់សត្វ ?
- ២.តើស្ប៉ុងខុសពីសត្វពហុកោសិកាដូចម្តេចខ្លះ (Metazoa) ?
- ៣.សំគាល់រវាងមុខងារនិងគ្លីនាទី Choanocyte និង Amoebocyte
- ៤.តើអ្វីជាចំណីរបស់ស្ប៉ុង ? តើវាស៊ីចំណីដូចម្តេច ? តើវារំលាយអាហារកន្លែងណានិងវារំលាយអាហារដូចម្តេច ?
- ៥.ពិពណ៌នាពីប្រភេទនៃបង្កកំណើតរបស់ស្ប៉ុង ?
- ៦.តើមុខងារនៅក្នុង cnidaria វាប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងណានិងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចចំពោះការរំលាយដំណកដង្ហើមការធ្វើចលនាខ្លួននិងការបញ្ចេញចោល ?
- ៧.ឈ្មោះ Cnidarian មានដំណាក់កាលពីគឺ Polyp និង Medusa. គូសវដ្តជីវិតរបស់វា ?
- ៨.អ្នកហែលទឹកនៅតំបន់ត្រូពិចដៃប៉ះខ្លួនសមុទ្រដ៏ធំមានការឈឺចាប់។ តើទម្រង់របស់ខ្លួនសមុទ្រវាតបវិញដូចម្តេច ? តើមុខងាររបស់វាដូចម្តេចដែរ ?
- ៩.ឱ្យនិយមន័យ Polymorphism, Mesoglea និង Radial symmetry ហើយលើកឧទាហរណ៍នីមួយៗ ?
- ១០.តើ sea anemone ចាប់និងរំលាយត្រីដូចម្តេច ?
- ១១.អ្វីជាផ្កាថ្ម ? តើវាមានទម្រង់ដូចម្តេច ? តើវាមាននៅឯណា ?

ជំពូកទី៤

សាខាជង្គុវខ្លួនសំប៉ែត (Phylum Platyhelminthes)

៤.១. លក្ខណៈទូទៅ

សាខាជង្គុវខ្លួនសំប៉ែតខ្លះរាងសំប៉ែត ខ្លះវែង ខ្លះខ្លី ទៅតាមប្រភេទ។ បំពង់រំលាយអាហារមានរន្ធតែមួយ។ មាននាទីជាមាត់ផងនិងជាទ្វារធំផងជាញឹកញាប់បែកមែកសាខានិងមិនសូវលូតលាស់ចំពោះសត្វបរាសិតមួយចំនួន។

ពួកវាគ្មានប្រព័ន្ធរត់ឈាមនិងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមទេ។ ប្រដាប់បញ្ចេញចោលមានទម្រង់ជាអណ្តាតភ្លើងដែលហៅថាProtonephridia។ ប្រដាប់បន្តពូជរបស់វាមានសភាពសាំញ៉ាំ។ វាជាសត្វរួមភេទវាបន្តពូជដោយពាក់គ្នាបញ្ជ្រាសគឺPenisរបស់ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធរបស់សត្វមួយទៀតនិងបញ្ជ្រាសមកវិញ។ ក្រៅពីនេះមានការបន្តពូជយ៉ាងសកម្ម ដូចជាការបញ្ចេញពន្លក និងចំណែកជាក់ង់។

Platyhelminthes ចែកជា៤ថ្នាក់ដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

- Trematoda : រស់នៅជាបរាសិត
- Cestoda : រស់នៅជាបរាសិត
- Turbellaria : រស់នៅដោយសេរី
- Monogenea : រស់នៅជាបរាសិត

៤.២. សិក្សាពីថ្នាក់ Trematoda

- បរាសិតសត្វផ្អែងកងក្នុងពេលពេញវ័យ
- ខ្លួនរបស់វា គ្មានបន្ទះខ្នងទេ
- រាងស្លឹកឈើហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសរីរាង្គដែលជាបរាសិតដោយសារឈ្នាប់
- ចំពោះកូនទើបញ្ជាស់ មានរោមញ័រ ហើយជ្រុះបាត់នៅពេលពេញវ័យ
- បរាសិតគោ ក្របី ចៀម ពពែ ជ្រូកព្រមទាំងមនុស្សផងដែរ
- នៅកម្ពុជាមាន Fasciola ២ប្រភេទដែលជួបប្រទះឃើញជាញឹកញាប់៖
 - + ហ្វាស៊ូឡា ហេប៉ាទីកា:Fasciola hepatica
 - + ហ្វាស៊ូឡា គីកង់ទីកា:Fasciola gigantica

ហ្វាស៊ូឡាហេប៉ាទីកាជាបរាសិតក្នុងបំពង់ និងចង់ប្រមាត់បញ្ចេញស៊ុតយ៉ាងច្រើនហើយស៊ុតទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចេញមកមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាមួយនឹងលាមក។ កំរិតនៃការលូតលាស់ និងការញាស់របស់ស៊ុតអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសខាងក្រៅក្នុងកំរិតសីតុណ្ហភាព ២០-២៦°C។ ស៊ុតនឹងញាស់ក្នុងរយៈពេល១០-១២ថ្ងៃដោយបង្កើតបានជាកូនព្រូនមីរ៉ាស៊ីឌីយ៉ូម (Miracidium)។ ក្នុងករណីសីតុណ្ហភាពលើសពី៤០°Cស៊ុតនឹងងាប់។ ចំណែកក្នុងភាពងងឹតស៊ុតមានការលូតលាស់យ៉ាងល្អប្រសើរ ប៉ុន្តែមិនញាស់ចេញជាមីរ៉ាស៊ីឌីយ៉ូមទេ។

មីវ៉ាស៊ីឌីយ៉ូមដែលទើបនឹងកើតមានប្រវែងប្រមាណ ០,១៥មម ដែលនៅផ្នែកខាងក្បាលមាន កោសិកាក្រពេញស្រួចដែលជាជំនួយនៃការជ្រៀតចូលទៅក្នុងសរីរាង្គរបស់ខ្យងនិងនៅជុំវិញមានរោម ញ័រដែលជាជំនួយក្នុងការហែលក្នុងទឹក។ មីវ៉ាស៊ីឌីយ៉ូមអាចរស់បាន ២-៣ម៉ោងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ប៉ុន្តែក្រោយពីការជ្រៀតចូលក្នុងខ្យងវានឹងបោះបង់ចោលរោមញ័រ ហើយផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយទៅជា Sporocyst និងRedia ហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតវាក្លាយជាCercaria។ ទម្រង់នេះវាស្ថិតនៅក្នុងខ្យង មានទម្រង់ជា Cercaria មានរយៈពេល៤-៧សប្តាហ៍។ Cercaria ទើបចេញពីខ្យងមានប្រវែង ០,២៥- ០,៣៥មម ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមក ឬយ៉ាងយូរ២ម៉ោង វាទៅតោងនឹងស្មៅ ឬរុក្ខជាតិដែលលិចទឹក។ បន្ទាប់ មកវាក៏ផ្តាច់កន្ទុយនិងបង្កើតទៅជាទ្រង់ទ្រាយថ្មីដែលមានរាងដូចគឺស។ វាបន្តលូតលាស់រាងកាយមាន ទំហំប្រមាណ ០,២ម.ម ហៅថា Metacercaria ដែលនឹងត្រូវលេបចូលដោយម្ចាស់បញ្ចប់តាមរយៈការផឹក ឬស៊ីស្មៅ។ គេកត់សម្គាល់ឃើញថាហ្វូសូឡា អេប៉ាទីកាអាចឆ្លងទៅកូនក្នុងផ្ទៃម្តាយតាមរយៈសុក។

ការវិវត្តក្នុងសរីរាង្គម្ចាស់បញ្ចប់

១. នៅពេលវាឆ្លងចូលក្នុងខ្យងតាមរយៈមាត់រួចមកវាចូលទៅក្នុង ភ្នាសពោះវៀន និងចូលទៅ ស្រទាប់ពោះវៀនឆ្លងចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមរួចភ្ជាប់ទៅ Capsule រួចក៏ចូលទៅក្នុងថ្លើមហើយវាធ្វើ ចលនាចូលទៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ ឬមួយទៀតវាចូល៖

២. តាមភ្នាសពោះវៀនរួចចូលទៅប្រដាប់របត់ឈាមបន្ទាប់មកចូលក្នុងថ្លើមនិងចុងក្រោយចូល ទៅថង់ប្រប់ពង់ទឹកប្រមាត់ ហើយក៏ស្ទុះចរន្តទឹកប្រមាត់ធ្វើឱ្យការរំលាយអាហារមិនល្អ។

បង្កបញ្ហាដល់ម្ចាស់ដែលមានបរាសិទ្ធភាពខាងក្រោម៖


- បញ្ហាទី១ ធ្វើឱ្យរលាកភ្នាសពោះវៀន
- ធ្វើឱ្យអាករអួលដល់ចលនាឈាមរត់
- អាចធ្វើឱ្យរលាកក្នុងថ្លើម និងបណ្តាលឱ្យបួសថ្លើម
- ពពួកបរាសិទ្ធភាពស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីសរីរាង្គក្នុងខណៈដែលវាជាបរាសិទ្ធភាព
- មូលហេតុធ្វើឱ្យស្តុមស្តាំង ចុះខ្សោយ (កង្វះប្រូតេអ៊ីន លីពីត វី និងវីតាមីន)។

វិធានការការពារ


- ទី១. កំចាត់ភ្នាក់ងារកណ្តាល បន្ទាប់មកទៀតលាមកត្រូវកប់ចោលក្នុងរណ្តៅឱ្យជ្រៅ។
- ទី២. ព្យាបាល Carbon Tetracycline, Nilzan, Oxyclozanide ។




Fasciola spp.



រូបភាពទី២១ វដ្តជីវិត Fasciola spp.



រូបភាពទី២២ ការវិវត្តក្នុង Fasciola hepatica



រូបភាពទី២៣ ការវិវត្តក្នុង *Fasciola gigantica*

៤.៣. សិក្សាពីថ្នាក់ Cestoda (Tapeworm)

Thecestodes (tapeworms) ថ្នាក់ Cestoda ហើយពួកវាជាប្រភេទព្រូនសំប៉ែត។ មាន cestodes ២យ៉ាងគឺ *Taenia saginata* (ក្នុងសាច់គោ) និង *Taenia solium* (ក្នុងសាច់ជ្រូក)។ *T.saginata* មានប្រវែង៩ម៉ែត្ររីង *T.solium* មានប្រវែង៦ម។ *Taeniasis* កើតឡើងខណៈពេលមនុស្សបរិភោគសាច់នៅ ឬបំអិនមិនបានល្អឬមិនបានបង្កកសាច់នោះត្រឹមត្រូវ (*T.saginata* ឬ *T.solium*)។ ប្រភេទព្រូនសំប៉ែតទាំង០២មានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- ដង្កូវខ្លួនសំប៉ែត ដងខ្លួនវាជាបន្ទះវែង
- បង្កឡើងដោយកំណាត់ជាកងៗ បន្តគ្នាជាច្រើន
- កងនីមួយៗមានសរីរាង្គបន្តពូជដូចគ្នា
- ប្រព័ន្ធប្រសាទ និងប្រដាប់បញ្ចេញចោលរួមគ្នាជាខ្សែ
- វាគ្មានបំពង់រំលាយអាហារទេ
- វាជាបរាសិតក្នុងបំពង់រំលាយអាហារសត្វមានឆ្អឹងកង
- ក្នុងវដ្តជីវិតរបស់វា ត្រូវការម្ចាស់កណ្តាលសម្រាប់បំបែក។

៤.៣.១. ឧទាហរណ៍ករណី Taenia Saginata

- ជាបរាសិតដង្កូវខ្លួនសំប៉ែត ដែលរស់ក្នុងពោះវៀនមនុស្ស
- ខ្លួន Taenia Saginata រាងជាបន្ទះវែង និងពណ៌ សដូចទឹកដោះគោ
- កូនព្រូនដែលនៅជាគីសហៅថា Cysticercus bovis។ វាមានរាងជាពងក្រពើដែលមានប្រវែង ៥-១៥មមនិងទទឹង ៣-៨មម។ Taenia Saginata ធំពេញវ័យមានបណ្តោយប្រវែងរហូតដល់១០ម៉ែត្រ ជួនកាលមានរហូតដល់២៥ម៉ែត្រ (ទទឹង១២-១៤មម) ហើយអាចរស់បាន ១០ឆ្នាំ។


សរីរាង្គរបស់Taeniaផ្សំឡើងដោយក្បាលកំប៉ោងហៅថាScolex។កស្ទួចហើយវែងមានកំណត់ជាកងៗហៅថា Strobila។

- Scolex មានរាងដូចស៊ុតនៅខាងចុងមានក្រហូងនិងនៅចំហៀងមានឈ្នាប់៤រាងជារង្វង់មូលទ្រវែង។ឈ្នាប់នេះវាក្លាប់ខ្លួនទៅនឹងផ្ទៃនៃពោះវៀន
- ក ស្តើង រលីង រាងធ្មាវ មាននាទីបង្កើតកង់នៃខ្លួនរបស់វា ហើយកង់មុនគេបង្អស់ ក្លាយជាកង់ដែលចាស់ជាងគេ។
- Strobila រាងជាបន្ទះវែងដែលមានពី ៨០០-៩០០កង់ កង់ដែលតូចជាងគេនៅជាប់នឹងកដែលមានរាងជាចតុកោណញាយ ប្រមាណជា ១០០កង់បន្ទាប់រហូត៤០០កង់គឺជាកង់ដែលមានរាងកាវ ហើយកង់ដ៏ទៃទៀតមានរាងជាចតុកោណកែង។ ប្រមាណជា១០០កង់ដំបូងគឺជាអភេទ។ ២០០-៣០០ កង់បន្ទាប់ជាកង់ភេទឈ្មោលហើយ ២០០-៣០០កង់បន្ទាប់ទើបមានការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រដាប់បន្តពូជភេទញី។ ដូចនេះកង់ទាំងនោះគឺជាកង់រួមភេទ។ ប្រមាណជា២០០កង់បន្ទាប់មកទៀតជាកង់ភេទញី ដោយសារតែក្រោយពីបន្តពូជរួច ប្រព័ន្ធប្រដាប់បន្តពូជឈ្មោល រលាយបាត់ និងកង់ដែលនៅសល់ជាកង់ដែលផ្ទុកទៅដោយស៊ុតរបស់ Taenia ហើយជាកង់អភេទ។ដោយសារប្រព័ន្ធប្រដាប់បន្តពូជញីក៏ចាប់ផ្តើមរលាយបាត់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ។

វដ្តជីវិតរបស់Taenia Saginata

កង់Taeniaដែលនៅក្រោយគេបង្អស់ផ្ទុកដោយស៊ុតដាច់ចេញពីStrobilaមកមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាមួយ និងលាមក ដោយសារចលនាកន្ត្រាក់នៃពោះវៀន។ ស៊ុតទាំងនោះក៏វាយប៉ាយលើដីចូលលើស្មៅ ឬទឹក ដែលបន្ទាប់មកត្រូវលេបចូលដោយម្ចាស់កណ្តាល។ ស៊ុតទាំងនោះក៏ញាស់ក្នុងពោះវៀនជាអំប្រើយ៉ុងដែលមានទំពក់ចំនួន៦។ដោយសារទំពក់ទាំងនោះវាចោះរំលាយក្លាសពោះវៀន ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបត់ឈាម។ នៅតាមប្រព័ន្ធរបត់នោះត្រូវបានរត់ចូលក្នុងសាច់ដុំ។ ៣សប្តាហ៍ក្រោយមកទំពក់ទាំងនោះក៏ជ្រុះអស់ដោយអំប្រើយ៉ុងឡើងប៉ោងជាដុំស៊ុតដែលមានអង្កត់ធ្នឹតជាមធ្យមប្រមាណ៥ម.ម ដែលគេហៅថា Cysticercus bovis (ចុងអង្ករ ឬគីស)។ កាលណាមនុស្សបរិភោគសាច់គោជ្រូកដែលមានចុងអង្ករ ហើយចំអិនមិនឆ្អិនល្អ ចុងអង្ករទាំងនោះក៏ចូល ទៅក្នុងពោះវៀនមនុស្ស

ហើយក៏លូតលាស់ជាកូនTenia វិញដែលចាប់ផ្តើមពីការពន្លតក្បាលមុនគេ ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃពោះរៀន បន្ទាប់មកក៏បង្កើតក ហើយក៏បង្កើតបានកង់ៗជាច្រើន ។



រូបភាពទី ២៤ វដ្តជីវិតរបស់Taenia saginata

៤.៣.២. ឧទាហរណ៍ ករណី Taenia Solium (Pork Tapeworm)

តេនីញ៉ានៅក្នុងសាច់ជ្រូក គឺតេនីញ៉ាសូដូម ភាគច្រើនផ្តល់ទុកទោសទៅដល់មនុស្ស។ ជម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយតេនីញ៉ាសូដូមបណ្តាលមកពីលាមកមនុស្សដែលផ្ទុកទៅដោយស៊ីតរបស់តេនីញ៉ាសូដូមឬបណ្តាលមកពីការចម្អិនសាច់ជ្រូកមិនបានឆ្អិនល្អដែលមានផ្ទុកទៅដោយគីសដែលផ្ទុកកូនតេនីញ៉ា។ បើសិនជាកូនដង្កូវ ត្រូវបានលេបចូលទៅក្នុងពោះរៀនតូច វាបានក្លាយទៅជាព្រូនជំទង់ នៅទីនោះ។

ប្រភេទជម្ងឺនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាTeaniasisហើយជារឿយៗវាមិនបញ្ចេញរោគសញ្ញានោះទេ។ បើសិនស៊ីតជាច្រើនត្រូវលេបចូលវាជាហតុដែលបង្កើតឲ្យមានជម្ងឺម្យ៉ាងគឺ cysticercosis។ វាត្រូវមានឈ្មោះដូចនេះដោយសារមកពីកូនដង្កូវTaeniaSulium ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា cysticercus។ ជាធម្មតាជម្ងឺទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុង តំបន់អាហ្វ្រិច អាស៊ីអាមេរិចខាងត្បូង និងអឺរ៉ុបខាងត្បូង។ Teaniasisកម្រកើតនៅប្រទេសដែលកាន់សាសនា ម៉ូស្លីមណាស់ដោយសារពួកគេភាគច្រើនមិនបរិភោគសាច់ជ្រូកនោះទេ។

ក. Taeniasis

Solium បានយកសត្វជ្រូកធ្វើជាម្ចាស់កណ្តាល សម្រាប់ជាដំណាក់កូនដង្កូវតូចៗរបស់វា។ ជ្រូកមួយក្បាលនោះមានជម្ងឺcysticercosis។ បើសិនជាមនុស្សបរិភោគសាច់ជ្រូកដោយគ្មានការចម្អិនកូន

ដង្កូវដែលផ្ទុកនៅក្នុងគីសនោះចេញមកនៅក្នុងពោះវៀន។ កូនដង្កូវបានវិវត្តន៍ខ្លួនទៅជាតេនីញ៉ាពេញវ័យដែលអាចស្រូបយកអាហារដែលបានបរិភោគចូល។

វាមានរាងសំប៉ែតនៅពេលដែលវាពេញវ័យដោយភាគច្រើនផ្ទុកជាកង់ៗហៅថា Proglottids។ តេនីញ៉ាបានទៅភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងពោះវៀនតូចដោយក្បាលរបស់វាដែលហៅថាScolex។ ក្បាលរបស់វាមានមាត់៤ (Suckers) និងទំពក់ (Hooks) ពីរជួរ។ ករបស់វាអាចផលិតកង់និងអាចលូតលាស់បានធំបន្ទាប់មកវាធ្លាក់ចូលទៅខាងចុងពោះវៀនធំ។ ពួកវាបានស្រូបយកអាហារ។ កង់នីមួយៗអាចមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីតជាច្រើនទម្រាំកង់នោះបានធ្លាក់ចេញមកក្រៅតាមរយៈលាមក។ កង់នីមួយៗអាចមានប្រវែង ១ស.ម និង ១.១ ២ ស.ម និងមានផ្ទុកពងលើសពី៥០.០០០ ស៊ីត។ Teania Solium អាចលូតលាស់ប្រវែងរហូតដល់៧ម៉ែត្រ។ តេនីញ៉ាពេញវ័យជ្រូកអាចមាន១.០០០កង់និងជម្រុះកង់៦ដែលមានស៊ីតក្នុងមួយថ្ងៃ (shed six gravid proglottids)។ កង់នីមួយៗអាចដាច់ចេញពីកន្ទុយចុងក្រោយ។ កង់តេនីញ៉ាអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលវាចេញមកដល់បរិស្ថានខណៈដែលត្រូវបានស៊ីដោយសត្វជ្រូក ឬ មនុស្ស។

២. Cysticercosis

ស៊ីតដែលបានលេបចូល ដោយមនុស្សឬជ្រូកបណ្តាលមកពី ភាពកង្វះខាតនូវអនាម័យ។ ដង្កូវស្តើងឲ្យឈ្មោះថា oncospheres វាបានញាស់នៅក្នុងពោះវៀនតូច។ ពេលនោះវាបានទម្លុះជញ្ជាំងកោសិកាដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងសរសៃឈាម។ ពួកវាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ សាច់ដុំនិង ជាលិកាផ្សេងទៀតដូចជា ថ្លើម ឬ ខួរក្បាល។ ជាចុងបញ្ចប់ oncospheres បានប្រែក្លាយទៅជា cysticerci and encyst។ Cysticerci តូចបំផុតមានប្រវែង ០.៥-១.៥ស.ម ហើយប្រវែងដែលវែងបំផុតមានរហូតទៅដល់២០ ស.ម។ អ្នកជម្ងឺមានប្រមាណជា៦០%ដែលកើតជម្ងឺ cysticercosis មាន cysticerci នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទដែលគេឲ្យឈ្មោះថា neurocysticercosis។

Cysticerci ធ្វើជម្រុះរោមនិងក្លាយទៅជាដំទង់បានតែនៅក្នុងពោះវៀនតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមិនអាចទទួលស្គាល់ទៅលើគីសបាននោះទេ។ វាអាចរស់នៅក្នុងកោសិកាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនបញ្ចេញរោគសញ្ញា។ ដោយហេតុនេះពេលដែលវាចាស់ហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃសំបកចាប់ផ្តើមធ្លាយចេញ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការរលាក។ ជាធម្មតា រោគសញ្ញាត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំង ការឈឺសាច់ដុំវិលមុខឈឺក្បាល។ Cysticerci ធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ភ្លាមៗបាន។ នៅពេលដែល cysticerci ត្រូវបានដាច់តំបន់បង្ករោគ (ស្លាកស្នាម) មានលក្ខណៈរួមតូច។ ការហើមត្រូវបានស្រកចុះហើយរោគសញ្ញាចាប់ផ្តើមបាត់បង់បន្តិចម្តងៗ។


កោសិកានៅតំបន់នោះបានទទួលនូវភាពក្រិន (fibrosis)។ មុខងាររបស់សរីរាង្គជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់។ នៅពេលដែល oncospheres ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នែក ការវិវត្តន៍នៃ oncospheres អាចអវណ្តតនៅក្នុងភ្នែក ដែលវាអាចបណ្តាលឲ្យមានការរំខាន ឬ ព្រិលភ្នែក។ ចម្លងរោគនៅក្នុងភ្នែកអាច

បណ្តាលឱ្យហើម និងដាច់រលត់ប្រស្រីភ្នែក។ ម្ចាស់បញ្ចប់ជាមនុស្សអាចទទួលនូវជំងឺបណ្តាលមកពី តេនីញ៉ាប្រភេទដដែល។ ស្វ័យបង្ករោគនេះ អាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលវែង។ នៅក្នុងករណីដោយកម្រខ្លះ កំណត់ទុំនីមួយៗរលាយយ៉ាងឆាប់ដើម្បីទម្លាក់ស៊ីតទាំងនោះ។ វាអាចកើតឡើងបើសិនជានៅក្នុង ពោះវៀនធំមិនអាចធ្វើការបានល្អនោះ។ ចលនាកន្ត្រាក់ត្រឡប់ពោះវៀនធ្វើឱ្យមានបញ្ហាសំលាមក និងកង់មានស៊ីត (gravid proglottids) ត្រឡប់ទៅក្នុងក្រពះវិញ។ កូនដង្កូវបានញាស់នេះជាមូល ហេតុនាំឱ្យមាន cysticercosis ។

ចំពោះមធ្យោបាយមួយទៀតដោយស្វ័យបង្ករោគដោយផ្ទាល់ជាមួយ cysticerci គឺបានធ្វើការប៉ះលើ ទ្វារធំ ហើយបន្ទាប់មកយកដៃទៅដាក់នៅក្នុងមាត់។

ដូចនេះតម្រូវឱ្យដឹងផងដែរថាស៊ីតតេនីញ៉ាតូចៗត្រូវបានដោះចេញទើបកង់តេនីញ៉ាមុនពេលវា មានក្នុងខ្លួនមនុស្ស។ ជាធម្មតាកង់តេនីញ៉ាទាំងអស់រស់នៅក្នុងពោះវៀន (colon) ។

រោគវិនិច្ឆ័យលើ Cysticercosis អាចប្រើ Magnetic Resonance Imaging Scans ឬ X-rays ។ គឺសរសេរវាមានសភាពដូចទៅនឹងដុំពក។ ដូចនេះចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះមិនអាចឆ្លើយ បាននោះទេ។ ជាទូទៅ Cysticercosis ត្រូវបានព្យាបាលជាមួយ albendazole ដោយផ្សំជាមួយនឹងឱស ថប្រឆាំងការរលាក។ ថ្នាំព្យាបាលមិនមានការចាំបាច់នោះទេបើសិនជា cysticerci ងាប់អស់ហើយ។ ការវះកាត់យកគឺសេចក្តីអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងដឹងច្បាស់ពីតំបន់របស់គឺស។ គ្រប់ករណីនៃ cysticercosis មិនត្រូវបានព្យាបាលនោះទេ។ ទោះបីជាការវិនិច្ឆ័យឬក៏ មិនមានការព្យាបាលនៃ neuro-cysticercosis ដោយត្រូវបានពឹងផ្អែកទៅលើរោគសញ្ញានិងចំនួន cysticerci ដែលរកឃើញ នៅក្នុងខួរក្បាល។ បើសិនជាគេរកឃើញត្រឹមតែមួយ នោះមិនត្រូវទទួលបានការព្យាបាលនោះទេ។



រូបភាពទី២៥ តេនីញ៉ា Taenia Solium (Pork Tapeworm)

ជំពូកទី៥

សាខាព្រូនខ្លួនមូល (Phylum Nematelminthes)

៥.១. លក្ខណៈទូទៅ

សាខាព្រូនខ្លួនមូលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- ជា Metazoa ដែលមានស៊ីមេទ្រីសង្ខ្រាង
- ខ្លួនវារាងជាស៊ីឡាំង ឬរាងជាខ្សែ
- គ្មានខណ្ឌជាកង់ៗទេ
- ខ្លះធំ ខ្លះតូច មានរាងដូចសរសៃអំបោះ
- គ្របដណ្តប់ដោយស្បែកក្រាស់ (Cutine) ជាជាតិ Chitine (The structural carbohydrate secreted in the exoskeleton on arthropods and some other animals) និងគ្មានរោមញ័រទេ។
- វាគ្មានសរីរាង្គបំលាស់ទី គ្មានសរីរាង្គវិញ្ញាណ និងគ្មានប្រដាប់បេត់ឈាមរត់ទេ
- បំពង់អាហារវិវត្តន៍ធម្មតា
- ភេទញី និងឈ្មោលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
- ការម៉ែតឈ្មោលគ្មានកន្ទុយទេ
- វដ្តជីវិតអាចដោយផ្ទាល់ ឬមានការចូលរួមពីសំណាក់ម្ចាស់កណ្តាល។

Nematelminthes មាន២ថ្នាក់សំខាន់ៗគឺ:




១.Nematodes (Nematoda)

២.Gordien

(ជាពពួកដែលរស់នៅជាបរាស៊ីត)

(ជាពពួកដែលរស់នៅដោយសេរី)



រូបភាពទី២៦ កាយវិភាគនៃណេម៉ាតូត

៥.២. សិក្សាពី Ascaris lumbricoides

ជាប្រភេទព្រូនដែលរស់នៅក្នុងពោះវៀនមនុស្ស។ ទម្រង់ និងរូបរាងរបស់វាមានដូចខាងក្រោម៖

- ដងខ្លួនរាងស៊ីឡាំងវែងស្អួចក្បាលស្អួចកន្ទុយ
- ពំណាសដូចទឹកដោះគោ
- ព្រូនឈ្មោលមានប្រវែង ១៥សម (ខ្លីជាងព្រូនញី)
- ព្រូនញីមានប្រវែង ២០សម
- ផ្ទៃខាងក្រៅនៃដងខ្លួនរឹងមាំមានឆ្នុតឆ្នាវកងៗដែលជាលក្ខណពិសេស
- បង្ហាញខ្សែបណ្តោយច្បាស់៖ ខាងខ្នងមួយ ខាងពោះមួយនិងចំហៀង២
- ផ្នែកខាងចុងនៃក្បាលមាន មាត់ និងមានបបូរមាត់៣
- ផ្នែកខាងចុងនៃកន្ទុយ ខាងពោះ មានរន្ធទ្វារធំ
- រន្ធបន្តពូជឈ្មោល អាចច្រឡំ និងរន្ធទ្វារធំ
- រន្ធបន្តពូជនេះ បង្កើតរន្ធកូអាក់មួយ ដែលមានជន្លូញទំពក់២
- ខាងក្រោយ រន្ធទ្វារធំ មានកន្ទុយកោង
- ព្រូនញីមានកន្ទុយធំ ជាងព្រូនឈ្មោល និងមានរន្ធបន្តពូជនៅខាងពោះប្រមាណ ១/៤ពីក្បាល។

៥.២.១. ប្រជាប្រិយភាព

វាមានមាត់បំពង់អាហារនិងពោះវៀនដែលបន្តពីបំពង់អាហារមកដល់កូអាក់។ ចំពោះប្រភេទណាម៉ាតូដមានឆ្មេញ មានលក្ខណៈជាបន្ទះសំប៉ែតសម្រាប់ខាំ ឬចាប់ចំណីអាហារ។

៥.២.២. ប្រជាប្រិយភាពក្នុង

វាមានអូវុល ២ ស្បូន២ ដែលភ្ជាប់ដោយបំពង់អូវុល រួចបន្តទៅផ្លូវយោនី ហើយនិងទៅយោនី។

៥.២.៣. ប្រជាប្រិយភាពឈ្មោល

Ascaris lumbricoidesមានពងស្វាសមួយ បំពង់បង្ហូរទឹកកាមដែលរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង ហើយបន្តដោយបំពង់យ៉ងដែលចូលទៅដល់កូអាក់។ ពួកណាម៉ាតូដភាគច្រើនមានលិង្គ (Spicule) ១ ឬ២ ដែលស្ថិតនៅក្នុងកូអាក់ ហើយវាមានតួនាទី សម្រាប់តោងភ្ជាប់ពេលបន្តពូជ ។


៥.២.៤. វដ្តជីវិតរបស់ Ascaris lumbricoides

នៅក្នុងពេលបន្តពូជស្នេម៉ាតូសូអ៊ីតរបស់ព្រូនឈ្មោល ធ្វើដំណើររហូតដល់ក្នុងបំពង់អូវុលដែលនៅទីនោះ វាក៏ធ្វើបង្កកំណើតជាមួយនឹងអូវុល។ បន្ទាប់មកវាក៏រុំព័ទ្ធដោយសំបកពីរជាន់យ៉ាងក្រាស់ ហើយរឹងមាំ ដែលកូនព្រូនលូតលាស់ និងវិវត្តយ៉ាងធំនៅក្នុងសំបកនោះ ។

ស៊ីតត្រូវបញ្ចេញមកមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅតាមលាមក។ ស៊ីតទាំងនោះត្រូវលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស តាមរយៈចំណីអាហារ និងទឹកដែលបន្ទាប់មកវាមានការញាស់ នៅក្នុងបំពង់អាហាររបស់មនុស្ស។ កូនព្រូនដែលទើបនឹងញាស់ទាំងនោះបន្តការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅជាបន្តបន្ទាប់ដោយទម្លុះ

ផ្ទៃនៃពោះវៀន រួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹករងៃ និងឈាមហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅថ្លើម។ នៅទីនោះវាវស់នៅ រយៈពេល៣-៤ថ្ងៃ។


តាមរយៈប្រព័ន្ធរបត់ឈាមវាក៏បន្តដំណើររហូតដល់ស្នូត។ នៅទីនោះវាវស់នៅប្រមាណ៧-៨ថ្ងៃ បន្ទាប់មកវាក៏ ឡើងតាមបំពង់ខ្យល់តាមដើមកនិងបំពង់រំលាយអាហារហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពោះ វៀនវិញខណៈពេលដែលយើងលេបទឹកមាត់ឬចំណីអាហារ។ វាបន្តជីវិតបរាសិតក្នុងពោះវៀនដោយចោះ ទម្ងុះក្នុងនៃពោះវៀនដើម្បីជញ្ជក់ឈាមដែលអាចបណ្តាលឱ្យមនុស្សកើតជំងឺខ្វះឈាមនិងមានការក កើតជាដំបៅនៅក្នុងពោះវៀនផង។



រូបភាពទី២៧ ភាពខុសគ្នារវាងណេម៉ាតូតញី និងឈ្មោល

៥.២.៥.វដ្តជីវិតរបស់ Nematode Trichuris trichiura (human whipworm)

វាជាព្រូនមូល(អៀន)កើតនៅលើមនុស្ស។ព្រូនញីពេញវ័យមានប្រវែងពី៣៥ទៅ៥០ម.មរីង ព្រូនឈ្មោលមានប្រវែងពី៣០ទៅ៤៥ម.ម។



រូបភាពទី២៨ វដ្តជីវិត Nematode Trichuris trichiura (human whipworm)

៥.៣. សិក្សាពីព្រូនទំពាក់ (Hookworms)


ព្រូនទំពាក់មាន នៅតំបន់ត្រូពិចសើមនិងតំបន់ក្បែរត្រូពិចព្រូនទំពាក់ បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្ស។ ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំរិតជីវភាពទាបខ្លះចំណីអាហារខ្វះបង្កនូវអនាម័យប្រើប្រាស់មានការឆ្លងពី៥០ទៅ៩៥%ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភាគនិរតីទទួលរងជំងឺដែលបង្កដោយព្រូនទំពាក់។ ទាំង *Ancylostoma duodenale* និង *Necator americanus* ទាំងពីរគឺមានក្នុងមនុស្ស។

ព្រូនពេញវ័យ (ប្រវែងពី៨-១៣ម.ម) ដែលមានធ្មេញក្នុងមាត់។ វាក្លាប់ទៅនឹងផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនតូចនិងភ្នាសអិលស្តើងៗគឺវាជញ្ជក់ទៅក្នុងខ្លួនព្រូនដោយសកម្មភាពការបូមពីដើមកហើយវាអាចរស់ក្នុងឈាមនិងទឹករងៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់វាត្រូវបានបង្កការងាយស្រួលដោយបញ្ចេញនូវអ៊ីនីនីងការពារកុំឱ្យឈាមរបស់ម្ចាស់បញ្ជើរកក។ ព្រូនវាបូមឈាមច្រើនជាងវាវំលាយជអាហារនិងបង្កឱ្យមានឈាមចេញហួសកំរិតនោះបណ្តាលឱ្យមានការខ្វះឈាម។

ព្រូនទំពាក់វាពាក់គ្នាក្នុងខណៈវានៅក្នុងពោះវៀនម្ចាស់បញ្ជើរហើយដង្កូវក្រើនីមួយៗ ផលិតបានស៊ុតបានពីបីទៅបួនពាន់រៀងរាល់ថ្ងៃ។ វាបញ្ចេញតាមរយៈលាមកនៅកន្លែងក្តៅល្មមសើមដ៏តហើយញាស់រយៈពេល២៤ទៅ៤៨ម៉ោង។ កូនវារស់នៅលើលាមកឬក៏កំទេចសរីរាង្គផ្សេងៗទៀត។ នៅពេលវាបានប្រវែង០,៥ម.មវាឆ្លងទៅមនុស្ស។ ជារឿយៗនៅលើផ្នែកលើស្បែកបាតជើងនិងបណ្តាលឱ្យមាស់បាតជើង។ កូនវាធ្វើចលនាទៅក្នុងឈាមបំពង់ទឹករងៃតាមរយៈបេះដូងហើយទៅស្ថិតពីសរសៃឈាមធ្មេញ។

ទៅប្រហោងខ្យល់បន្ទាប់ទៅបំពង់ខ្យល់រួចទៅបំពង់អាហារបន្ទាប់មកចុះទៅពោះវៀន។ ពួកវាវាស់នៅធំ ធ្លាក់ពីរបីខែប្រាប់ឆ្នាំ។ វាបន្តឆ្លងទៅម្ចាស់បញ្ជើដែលរក្សាទុកដង្កូវនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។

ក្នុងដែលមានព្រូនទំពាក់ពី១០០ទៅច្រើនជាងនេះគឺបណ្តាលឲ្យមានការធំធេងយឺតហើយអ្នកខ្លះបណ្តាលឱ្យខ្វះឈាមក្រហមខ្លះការចងចាំហើយបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺជាច្រើនទៀត។ មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលចំពោះមនុស្សមានបរាសិតនេះ។ ការពាក់ស្បែកជើងពេលទៅបន្ទោរបង់អាចការពារមិនឱ្យឆ្លងបរាសិតនេះបាន។ ប្រភេទដង្កូវទំពាក់ផ្សេងទៀតគេរកឃើញមាននៅសត្វពាហនៈនិងសត្វព្រៃផងដែរ។



រូបភាពទី២៩ វដ្តជីវិតព្រូនទំពាក់ Hookworm

៥.៤ សិក្សាពីណេម៉ាតូដផ្សេងទៀត

បរាសិតខ្លះមានធ្មេញឬទំពាក់ក្នុងមាត់សម្រាប់ភ្ជាប់និងបិតអាហារ និងរស់នៅលើឬសរុក្ខជាតិ មានទម្រង់ស្រួចប្រហោងក្នុងសម្រាប់ចាក់ទម្លុះកោសិកានិងសាច់ដុំបំពង់អាហារដើម្បីដកទឹកដមកោសិកា។ ពួកវាវាស់នៅដោយសេរីមានស្បែកនៅលើខ្លួនដូចជាប្រេងបន្លាឬស្រកាដែលជួយក្នុងការលូតលាស់ក្នុងដី។ ពួកណេម៉ាតូដមានមាត់ធំនិងធ្មេញ។

ម្ចាស់បញ្ជើរបស់ណេម៉ាតូដរស់ដោយសេរីនៅក្នុងដីសើមដីខ្សាច់ឆ្នេរមហាសមុទ្រនៅទឹកសាប ទឹកមិនហូរទឹកប្រៃនៅមាត់បឹងឬសមុទ្រនិងបាតបឹងនិងទន្លេនៅលើតម្រងទឹកម៉ាស៊ីននៅសមុទ្រ អង្គុយគោលនិងទឹកកក។ កម្រាស់ខាងលើប្រមាណ៧.៦ស.ម លើផ្ទៃដី០.៤០៥ហិកតានៃដីល្អប្រុង មាន ណេម៉ាតូដប្រមាណ៣លាន។ ប្រភេទដីខ្លះជាកន្លែងរស់របស់ណេម៉ាតូដដែលវាបំផ្លាញដំណាំខ្លះរស់នៅដីមានលក្ខណៈណីតខ្លះជាចំណីរបស់ណេម៉ាតូដផ្សេងទៀត។ ខ្លះរស់នៅលើផ្នែកខ្លះរបស់រុក្ខជាតិរួមមានឫសគ្រាប់ផ្លែឈើដ៏រស្មីកស្នាមប្រះសំបកឈើ។ល។

៥.៤.១. នាក់ទទទៅនឹងមនុស្ស

ប្រភេទខ្លះជាបរាសិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសត្វពាហនៈនិងដំណាំ។ ខ្លះទៀតបណ្តាលឲ្យខូចខាត តិចខ្លះមិនបណ្តាលឲ្យខូចខាតតែបណ្តាលឲ្យខូចប្រសិទ្ធភាព និងបណ្តាលឲ្យឈឺឬងាប់ម្ចាស់បញ្ជី។ ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាស្រ័យលើប្រភេទចំនួននិងកត្តាផ្សេងទៀត។ ចំនួនច្រើនជាង៥០ប្រភេទជាបរាសិតចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។ មានខ្លះរស់នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនិងប្រភេទសត្វព្រៃដែលមានផ្ទឹមកង និងសត្វតិចផ្ទឹមកងផ្សេងទៀត។ សរីរាង្គភាគច្រើននៃប្រភេទសត្វមានផ្ទឹមកងខ្លះត្រូវបានលុកលុយ ដោយណេម៉ាតូដនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនធំនិងពោះវៀនតូចស្នូតផ្តោកនោមសាច់ដុំឈាម។ល។ តាមធម្មតា ប្រភេទនីមួយៗបង្កប់នឹងម្ចាស់បញ្ជីពីមួយទៅពីរជួនកាលវាលុកលុយសរីរាង្គផ្សេងទៀត។ ពួកណេម៉ាតូដ ភាគច្រើនមានស៊ុតរស់ដោយសេរីឬដំណាក់កូនវារស់នៅក្នុងដីឬទឹក។ ពេលខ្លះម្ចាស់បញ្ជីមានណេម៉ាតូដ ច្រើន។

ឧទាហរណ៍៖ ដង្កូវនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានរហូតដល់៤០.០០០ដង្កូវ។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដ៏ ដង្កូវក្នុងពោះវៀនគឺពិនិត្យពងដង្កូវនៅក្នុងលាមកដោយមីក្រូទស្សន៍ដែលអាចឱ្យយើងដឹងពីចរិតលក្ខណៈ ទំហំទម្រង់និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា។ ការព្យាបាលដោយសម្លាប់ដង្កូវគឺត្រូវប្រើថ្នាំដែលមិនមានជាតិពុល នៅម្ចាស់បញ្ជីរបណ្តាលឱ្យដង្កូវបាត់បង់ជីវិតនិងអាចចេញមកក្រៅតាមលាមក។

៥.៤.២. ណេម៉ាតូដនៅឫសដំណាំ (Root Nematodes)

នៅតាមស្ថានច្បារ(Heterodera radicolaនិងmarioni)ត្រូវបានរកឃើញនៅលើរុក្ខជាតិ១,០០០ ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ពួកវាចម្លងច្បារនិងដំណាំឈើហូបផ្លែម្តប់ឈើគុម្ភឈើនិងស្មៅ។ ស៊ុតរបស់ដង្កូវនេះ គឺមាននៅឫសឈើឬដីនិងញាស់នៅលើឫសឈើហើយជ្រៀតចូល ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយនឹងជាលិកា របស់រុក្ខជាតិ។ ឫសទាំងឡាយមានប្រតិកម្មតបដោយបង្កជាទម្រង់ដូចជំងឺទឹកប្រមាត់តូចៗនៃស្នាមជា- លិកាឬក៏កំពកឬសពីដង្កូវទាំងនោះ។ ដង្កូវឈ្មោលពេញវ័យមានរាងស្មើ(១.២-១.៥ម.ម)ប៉ុន្តែដង្កូវញី មានខ្លួនរីកធំ(០.៨-០.៥ម.ម) វាផលិតបានស៊ុតពី៥០០ទៅ១,០០០គ្រាប់។ បង្កកំណើតអាចកើត ឡើងប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ទេ។ នៅក្នុងដីវដ្តជីវិតរបស់វាត្រូវការរយៈពេលជិត៣ខែនៅសីតុណ្ហភាព១៤,៤ អង្សាសេប៉ុន្តែរយៈពេលតិចជាងមួយខែ នៅសីតុណ្ហភាព២៧,២អង្សាសេ។ កូននៅក្នុងដីដូចទឹកប្រមាត់ អាទប់ទល់នឹងភាពក្តៅ និងអាចរស់នៅស្ថានអង្សាសេប៉ុន្តែជាប់នៅសីតុណ្ហភាពទាប។កំពកឫសទាំង នោះបណ្តាលឲ្យដំណាំខ្សោយឬងាប់។ជាទូទៅដីមានពួកបរាសិតធ្វើឲ្យដីខូច និងមិនបានទទួលបាន ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។ អ្នកផលិតដំណាំត្រូវជ្រើសរើសពូជល្អហើយជារុក្ខជាតិមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយ មានភាពធន់នឹងណេម៉ាតូដផង។

៥.៤.៣. ដង្កូវកូនសាច់ជ្រូក (Trichinella Spiralis)

កូនរស់រយៈពេលខ្លីជាតិស្កក្នុងសាច់ដុំឆ្នុតរបស់ជ្រូកកណ្តុរនៅតាមផ្ទះនិងមនុស្ស។ វាមាននៅ ក្នុងសត្វឆ្ការនិងឆ្កែ។ប្រសិនបើយើងស៊ីសាច់ដែលមានកូនដង្កូវនេះគឺស្កនឹងរលាយដោយរសវលាយ ហើយកូនព្រូនត្រូវបានរំដោះខ្លួនចូលក្នុងពោះវៀនម្ចាស់បញ្ជីថ្មី។ប្រហែលជាពីរថ្ងៃបន្ទាប់មកពួកវា

ពេញវ័យខាងផ្លូវភេទហើយវាចាប់ផ្តើមរួមភេទ។ ដង្កូវឈ្មោលមានប្រវែងប្រហែល ១,៥ម.ម និងដង្កូវញីពី ៣ទៅ ៤ម.ម។ ដង្កូវញីទម្លុះជញ្ជាំងពោះរៀនសំរាប់រស់នៅរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយវាផលិតបានកូនលើសពី ១,៥០០ ដែលកូននីមួយៗមានប្រវែង ០,១ម.ម។ ពួកវាចូលទៅក្នុងទឹករងៃហើយទៅឈាមហើយ ទម្លុះសាច់ដុំ។ វាលូតលាស់ប្រហែល ១,០ម.ម បន្ទាប់មកវាដូចផ្លែពស់ហើយក៏បិទនៅក្នុងថង់គីស្ត បន្ទាប់មកក្លាយជារឹងដូចកំបោរ។

កូនញាស់ពេញវ័យហើយឆ្លងទៅមនុស្សដែលស៊ីដោយវាហើយវារស់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស។ ការ ឆ្លងតិចតួចគឺមិនមានចេញរោគសញ្ញាទេ។ ប្រហែលជា ១៦% នៃប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិចមានជំងឺដង្កូវ នេះ។ ការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ Trichinosis ឱ្យយើងឈឺនិងបណ្តាលឱ្យស្លាប់។ ជំងឺនេះ មិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់ទេ។ ជ្រូកនិងកណ្តុរឆ្លងតាមរយៈការស៊ីសំណល់ផ្ទះបាយកាកសំណល់ឬ សាកសពសត្វដែលមានថង់គីស្តកូនដង្កូវ។ មនុស្សទទួលរងការឆ្លងដោយការស៊ីសាច់ (តិចតួច) ដែល មានកូនថង់គីស្តដង្កូវតូចៗ។ ការប្រឆាំងការពារនូវការឆ្លងនេះគឺត្រូវចម្អិនសាច់ឱ្យឆ្អិនល្អដោយកំដៅតិច បំផុត ៥៨°C ។ កម្រិតត្រជាក់នៅ ២៣ អង្សាសេរយៈពេលបីថ្ងៃនឹងអាចសម្លាប់កូនដង្កូវទាំងអស់។

ជំពូកទី ៦

សាខាអ៊ីស៊ីណូដេម៉ាតា (PHYLUM ECHINODERMATA)

(ផ្កាយសមុទ្រនិងអ្វីៗដែលទាក់ទង)

សេចក្តីផ្តើម

អ៊ីស៊ីណូដេម៉ាតា៖ Echinoderms (Gr.echinos, សត្វកាំប្រម៉ាdermaស្បែក) រស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញតាមឆ្នេរសមុទ្រ។ វាងាយស្រួលចំណាំដោយចរិតលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់វា។ ផ្កាយសមុទ្រមានដៃពី ០៥ ទៅប្រហែល ៥០ សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងថាសកណ្តាល។ Brittlestars មានដៃ ០៥ អាចបត់បាននិងភ្ជាប់នឹងថាសកណ្តាលដ៏តូច។ Seurchins មានរាងជាអឌ្ឍគោល (hemisphere) ព្រមទាំងសំបករឹង។ ព្រលិតសមុទ្រ (Sealilies) មានរាងដូចផ្កាដងខ្លួនដូចពែងភ្ជាប់ដោយដៃ ០៥។ ត្រសក់សមុទ្រ Seacucumbers ខ្លួនវាមានទម្រង់ដូចសាច់ក្រកហើយទន់។ សមាជិកភាគច្រើនរបស់សាខានេះមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រី។ ពពួកវាជាប្រភេទរស់នៅដោយសេរីប៉ុន្តែជាសត្វធ្វើចលនាយឺតៗប្រភេទខ្លះសប្បុរសប៉ុន្តែវាមិនចូលរួមជាក្រុមទេ។ ពួកវាទាំងអស់រស់នៅទៅតាមខ្សែទឹកសមុទ្រដែលមានជំរៅទឹកច្រើនជាង ៩,០០០ ម៉ែត្រ។

៦.១. បរិវារក្នុងសាខា:

- មានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីជាទូទៅមានប្រាំផ្នែកឬមានពីរ ចំណែកគ្មានក្បាលឬជាកំណាត់ៗភាគច្រើនមានជើងរាងជាបំពង់សម្រាប់បំលាស់ទីចាប់ចំណីនិងដកដង្ហើម
- ខ្លួនគ្របដោយស្បែកទន់ (epidermis) នៅលើគ្រោងផ្ទៃយ៉ាងរឹង (meso-dermmal) ដែលអាចកម្រើកបានឬ ភ្ជាប់ទៅនឹងកន្លែងរាបស្មើ
- ប្រដាប់រំលាយអាហារងាយ (brittle stars ខ្លះទ្វារធំ) ប្រហោងខ្លួន (coelom) មានរោមជំទូលាយនិងបំពេញដោយសារធាតុរាវដែលមានកោសិកាសេរី (Amoebocytes) ដកដង្ហើមដោយស្រកីតូចៗ (Papula) ដែលលយចេញពីប្រហោងខ្លួនឬដោយជើងបំពង់ (ត្រសក់សមុទ្រ)
- មានភេទដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅដូចគ្នាក្រពេញភេទធំបំពង់ភេទងាយមានពងច្រើនជាទូទៅវាបង្កកំណើតនៅសមុទ្រ។ កូនស៊ីមេទ្រីសង្វាងហើយវាមានខ្នាតតូចមានរោមនិងហែលដោយសេរី។

គ្រាមួយអ៊ីស៊ីណូដេម៉ាតាទាក់ទងទៅនឹង Cnidarians ដូចជាពួក Radiata ពីព្រោះវាមានស៊ីមេទ្រី។ ពួកវាស្របតាមពួកសត្វមានផ្ទៃក្នុង។ តាមពិតពួកខ្លះមានលក្ខណៈពិសេសដូចជា៖ (១) ទម្រង់គ្រោងផ្ទៃនៅខាងក្នុងហើយមិនមាននៅខាងក្រៅដូចសត្វឥតផ្ទៃក្នុងផ្សេងទៀតទេ (២) ស្រទាប់កណ្តាល (mesoderm) ដែលបង្កបង្កើតក្នុងអំប្រើយ៉ូងបានមកជាពោះវៀនដើម (៣) ទ្វារធំបង្កបង្កើតពីរន្ទប្លាស្តូពីរ (៤) មាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីស្រទាប់ក្រៅ (ectoderm) ។

អ៊ីស៊ីណូដេម៉ាតា៖ មានការថយចុះពីប្រភេទមួយដែលគាប់ជួនមានការរីកដុះដាលច្រើននិងសកម្មចាប់តាំងពីកូនតូចៗមានស៊ីមេទ្រីសង្វាងនិងធ្វើចលនាដោយសេរីដោយហេតុតែអេស៊ីណូដេម៉ាតាពេញវ័យមានរាងជាកាំនិងស្ថិតនៅនឹង។ ស៊ីមេទ្រីជាកាំគ្រប់ទិសទីទាំងអស់។ ក្រុមអេស៊ីណូដេម៉ាតាគឺជាក្រុមដែល

មានមុនគេ។ អេស៊ីណូដេមតូចបំផុតមានអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង៣០ស.ម។ ផ្កាយសមុទ្រធំ (sycnopia) មានប្រវែង៨១ស.ម។

៦.២. ថ្នាក់Asteroidea (ផ្កាយសមុទ្រ)

៦.២.១. រចនាសម្ព័ន្ធ

ខ្លួនរបស់ផ្កាយសមុទ្រ (Asterias) ផ្សំឡើង ដោយដៃសំប៉ែតចំនួនប្រាំចូលរួមសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹង ថាសកណ្តាល។ ផ្ទៃខាងលើមានបន្ទាត់រឹងលយចេញពីគ្រោងផ្ចិតខាងក្នុងហើយមានស្រកីទន់ៗ (dermalbranchia) ចេញពីប្រហោងខ្លួន។ នៅជុំវិញបន្ទាត់ទាំងនោះនិងកន្លែងផ្សេងទៀតមានដង្កៀបតូចៗ (Pedicellariae) ហើយដង្កៀបនីមួយៗមានចង្កូម២ដែលបន្លឺសូរគ្រឹបៗខណៈពេលវាចាប់អ្វីមួយ។ វាធ្វើ អំពើដើម្បីរក្សាទុកខ្លួនរបស់វាពីការប៉ះពាល់ពីកំទេចកំទីផ្សេងៗនិងជួយចាប់ចំណី។ វចូមៈតូចនៅជិត កណ្តាលនៃផ្ទៃខាងមុខហើយនៅជិតៗមានថាសមូលថ្នាំធ្ងន់ហៅថា madreporite។ នៅត្រង់ចំណុច កណ្តាលមានមាត់។ ពីមាត់នៅតាមបណ្តោយដៃនីមួយៗដែលមើលឃើញច្បាស់គឺ Ambulacral groove។ តាមដាយដែលមានបន្ទាត់ៗមានជើងបំពង់ច្រើន (បួនឬពីរជួរ) ។ នៅចុងដៃនីមួយៗមានព្រុយទន់និង មានភ្នែក។

ខ្លួនទាំងមូលគឺគ្របដោយស្បែកមានរោមទន់ៗ។ នៅខាងក្រោយមានគ្រោងផ្ចិតក្របនៃបន្ទះតូ ចៗថ្នាំធ្ងន់ហៅថា Ossicles និងមានទម្រង់និងបែបបទមិនទៀងទាត់ដែលភ្ជាប់ដោយជាលិកាសន្ទាន និងភ្ជាប់ដោយសរសៃសាច់ដុំ។ នៅខាងក្រៅគ្រោងផ្ចិតមានប្រហោងខ្លួនធំជាជួរដោយស្រទាប់រោម ញ័រហើយបំពេញដោយសារធាតុរាវដែលមានកោសិកាស៊ីរីហៅថាAmoebocyte។ ពង្រីករបស់ប្រហោង នៅក្នុងស្រកីនាំឱ្យបិទទឹកសមុទ្រនៅជុំវិញដែលព្រែកដាច់ពីគ្នាដោយជួរប្រហោងស្តើងនិងស្បែក។ នេះ ជាការផ្លាស់ប្តូរការដកដង្ហើម និងAmoebocyteបញ្ចេញកាកសំណល់ពីក្នុងខ្លួនរបស់វា។

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកគឺបង្ហូររឹងបំពេញដោយទឹកសមុទ្រដែលប្រព្រឹត្តតាមរយៈ madreporite និងភ្ជាប់ ទៅបំពង់ជើង។ បំពង់ជើងនីមួយៗមានរាងស៊ីឡាំងបិទដែលមានក្លាសសាច់ដុំ វាមានប្រដាប់បឺត (sucker) នៅចុងខាងក្រៅនិងមានដប (ampulla) នៅខាងក្នុង។ នៅពេលវាបង្រួមខ្លួនសារធាតុរាវត្រូវ បានជួយជំរុញបំពង់ជើងនាំឱ្យមានចលនា។ ខណៈពេលប៉ះនូវវត្ថុផ្សេងៗសាច់ដុំកន្ត្រាក់និងបញ្ជូនទឹក ទៅដបដូច្នោះជើងវាក៏រួញខ្លី។ ការយកចេញនូវសារធាតុរាវរួមជាមួយសកម្មភាពនៃសាច់ដុំពិសេសដែល ទាញទៅចំណុចកណ្តាលនៃប្រដាប់បឺតធ្វើឱ្យអន់ថយសម្ពាធខាងក្នុងទៅខាងចុងហើយបណ្តាលឱ្យវា ជាប់ទៅនឹងវត្ថុផ្សេង ពីព្រោះដោយសារសម្ពាធដ៏ខ្លាំងនៃទឹកសមុទ្រឬអាត់ម៉ូស្ទែរនៅខាងក្រៅ។ ជើង បំពង់មានសកម្មភាពដាច់ពីគ្នាឬនៅក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នា។ ជើងសម្រាប់ជួយទ្រផ្កាយសមុទ្រទៅនឹងថ្ម ដើម្បីផ្លាស់ទីហើយនឹងចាប់ចំណី។

ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចែកចេញជា(១)មាត់(២)ក្រពះមានពីរផ្នែក៖ផ្នែកធំ(cardiac)ស្តើងភ្នា សសាច់ដុំបិតនិងផ្នែកតូច(pyloric)ភ្ជាប់ដោយបំពង់ប្រាំគូរបស់ក្រពេញរំលាយអាហារ(Hepatic ceca) នៅក្នុងដៃ(៣)ពោះរៀនខ្លីៗនិង(៤)ទ្វាលាមក។ ប្រព័ន្ធលាមរត់និងប្រសាទតូចៗហើយពិបាកមើល ភេទទាំងពីរនៅដាច់ពីគ្នា។ ដៃនីមួយៗមានក្រពេញភេទពីរដែលមានបំពង់ចំហតូចៗបើកនៅចំកណ្តាល។

៦.២.២. ប្រភេទសត្វស្រទាប់

ក្រចាប់សមុទ្រ(starfish)រស់ដោយសារការភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុរឹង។ ខ្លួនវារឹងនិងអាចធ្វើឲ្យត្រូវទៅ តាមស្នាមប្រេះថ្មហើយខ្លួនវារោងយ៉ាងយឺតនៅពេលវាធ្វើចលនា។ ផ្ទៃខ្លះលើខ្លួនវារោងជាប់ដោយជើង បំពង់។ ក្នុងការធ្វើចលនាដៃវាជាអ្នកតម្រង់ទិសហើយជើងបំពង់នៅខាងក្រោមលាតសន្ធឹងប្រហែល ២.៥ស.មហើយបន្ទាប់មកវាក្រឡាផ្ទៃខ្លួនហើយទាញខ្លួនវាដើម្បីធ្វើចលនាទៅមុខ។ ក្រចាប់សមុទ្រ អាចប្តូរទៅតាមទិសណាមួយដោយមានការចូលរួមពីដៃនិងជើងបំពង់។ ប្រសិនបើវាត្រឡប់ក្រោយវិញ ដៃវាមូលរហូតដល់ជើងបំពង់ខ្លះៗរបស់វាបន្ទាប់មកខ្លួនវាទាំងមូលបត់បានរហូតដល់ផ្ទៃមាត់ដោយត្រ ឡប់ចុះក្រោម។

ក្រចាប់សមុទ្រស៊ីពពួកសិប្បិសត្វ (បង្កងបង្កា...) ពពួកខ្យងខ្មៅងារនិងសត្វតតឆ្អឹងកងផ្សេង ទៀត។ នៅពេលវាស៊ីខ្យងធំៗខ្លួនវាគ្របនៅលើចំណីដូច្នោះបំពង់ជើងវាអាចចាប់ពួកសិប្បិសត្វ។ បន្ទាប់ មកវាយកចំណីជាក់ក្នុងក្រពះដ៏ស្តើង ខណៈនោះអង់ស៊ីមត្រូវបានបញ្ចេញពីក្រពេញរំលាយអាហារហើយ ចំណីត្រូវបានរំលាយ។ នៅពេលខ្លះនៅក្នុងដំណើររំលាយអាហារសំបកវាបើកចំហធំជាលទ្ធផលគឺជាការ ខ្សោយអង់ស៊ីមសាច់ដុំរបស់វា។ លៀសសមុទ្រតូចៗត្រូវបានវាស៊ីទាំងអស់។ ក្រចាប់សមុទ្រស៊ីកូន លៀសសមុទ្រច្រើនជាង៥០នៅក្នុងរយៈពេលតែ៦ថ្ងៃ។ ក្រចាប់សមុទ្រអាចរស់នៅនិងធ្វើចលនាបានវែង ឆ្ងាយដោយគ្មានចំណីអាហារ។



រូបភាពទី៣០ រូបផ្កាយសមុទ្រ

៦.២.៣. មន្ទីរកំណើត

ចំនួនដ៏ច្រើននៃស៊ុត និងស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីតត្រូវបានពង្រាយនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលជាកន្លែងបង្កកំណើតហើយវាលូតលាស់យ៉ាងរហ័ស។ នៅដំណាក់កាលស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីត (gastrula) រន្ធច្បាស្តូព័រក្លាយជារន្ធទ្វាធំប្រហោងបែកខ្លែងក្លាយទៅជាពោះរៀនដើមហើយបន្ទាប់មកមាត់បង្កបង្កើតជាចង់នៅភ្នាសខាងក្រៅ (ectoderm)។ ទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចការលូតលាស់អំប្រើយ៉ូនពពួកមានឆ្អឹងកង (Chordates)។ កូនមានរោមហែលដោយសេរីដែលបានមកពីកំពកណតូ (ដំណាក់ bipinnaria) ដែលបន្ទាប់មកវាលូតប្រវែង (ដំណាក់ brachiolaria) ពី២ទៅ៣មម។ បន្ទាប់ពី៦ទៅ៧សប្តាហ៍កូនវាក៏ទៅរស់នៅបាតដែលមានការប្រែប្រួលសំបុកដើម្បីក្លាយជាក្រចាប់សមុទ្រតូច។ ក្រចាប់សមុទ្រឈាមញី (Henricia) ផលិតស៊ុតលឿងធំនៅក្រោយខ្លួនរបស់វា។ ដំណាក់កូនតូចគឺខ្លីហើយកូនពេញវ័យលេចឡើងក្រចាប់សមុទ្រដុះដៃយ៉ាងរហ័ស។

៦.៣. អ៊ីស៊ីណូដេមផ្សេងៗទៀត Other Echinoderms

៦.៣.១. ភ្នាក់ Ophiuroidea (brittle stars)

អ៊ីស៊ីណូដេមនេះមាន ថាសកណ្តាលហើយមានដៃវែងស្មើចំនួនប្រាំហើយបត់បែនបាននិងស្រួល។ ដៃនីមួយៗចែកចេញជាច្រើនកំណាត់។ ដើមបំពង់គ្មានខ្លែងទេ។ សរីរាង្គរំលាយអាហារនិងបន្តពូជទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងថាសហើយគ្មានរន្ធបញ្ជាញចោលទេ។

Ophiurans លាក់ខ្លួនពេលថ្ងៃនៅក្រោមថ្មឬស្មៅសមុទ្រឬកប់តាមបណ្តោយនៅក្នុងខ្សាច់ឬក្នុងកក់ប៉ុន្តែ វាមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅពេលយប់។ វាធ្វើចលនាយ៉ាងរហ័សដោយរបៀបចលនាពោះនិងអាបជាប់ទៅនឹងវត្ថុផ្សេងៗដោយដៃមួយឬច្រើននិងរុញទៅដៃផ្សេងទៀតដើម្បីប្រានខ្លួនវាឱ្យបានវែង។ វាអាចហែលបានដោយប្រើដៃដូចមនុស្សតាមដែលអាចធ្វើបាន។ វាស៊ីពពួកមានសំបកតូចៗដូចជាខ្យងខ្មៅលៀស...និងសត្វល្អិតៗ។ ជាទូទៅវាមានភេទដាច់ពីគ្នា។ វាបញ្ចេញស៊ុតនិងស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីតរបស់វាទៅក្នុងទឹកសមុទ្របន្ទាប់មកជាលទ្ធផលកូន (pluteus) មានដៃវែង។ បន្ទាប់មកទៀតវាបម្រែបម្រួលដូចក្រចាប់សមុទ្រដែរ។ ដែររបស់ brittle stars បែកឬអាចបាក់ចេញយ៉ាងស្រួលហើយប្រភេទខ្លះអាចបាក់ថាសហើយផ្នែកខ្លះអាចកើតវិញបាន។

៦.៣.២. ភ្នាក់ Echinoidea (Sea urchins, sand dollars and heart urchins)

សមាជិកថ្នាក់នេះមានខ្លួនមូលបិទជិតដោយសំបកស្តើង។ វាគ្មានដៃសេរីទេ។ ប៉ុន្តែវាគ្របដណ្តប់ដោយបន្ទាអាចនាំឱ្យធ្វើចលនាបាន។ Sea urchins មានរាងពាក់កណ្តាលដុំមូល (Hemispherical), heart urchins មានរាងជាស៊ុតហើយ Sand dollars មានរាងដូចថាស។ នៅខាងក្រៅដែលមានប្រហោងប្រាំគូនៃបន្ទះៗខាងក្រៅត្រូវបានខ្លងសម្រាប់ជាសេរីមួយនៃដើមបំពង់ស្តើងដែលអាចបន្លាយក្នុងចំណោមបន្ទាទាំងនោះ។ បន្ទានីមួយៗមានបាតទម្រង់ដូចពងដែលតភ្ជាប់នឹងកំពកមូលៗ (rounded tubercle)

នៅលើសំបកហើយអាចធ្វើចលនាដោយសរសៃសាច់ដុំ។នៅចន្លោះបន្ទាមានទងតូចៗឥតបានការនៅលើទងវែងៗ។

ផ្លូវរំលាយអាហារដ៏វែងមានសណ្ឋានដូចផ្ទៃពស់។ផ្ដើមពីមាត់ទៅមានបំពង់អាហារដ៏ស្លើងមួយបានភ្ជាប់នឹងក្រពះ(ថង់តូច)។ ពោះវៀនតូចភ្ជាប់ដោយចុងពោះវៀនធំទៅទ្វារធំ។ បំពង់ផ្ទៃស្លើងភ្ជាប់ដោយរោមញ័រចាប់ពីបំពង់អាហារទៅពោះវៀន។ វានាំយកទឹកដោយផ្ទាល់ទៅជួយរំលាយអាហារ។ មានស្រកីចំនួន១០ដែលលយចេញនៅជុំវិញមាត់ហើយMadreporiteដែលនៅឆ្ងាយពីមាត់។ បន្តពូជមានទាក់ទិននឹងកូនpluteus។ Echinoids មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែមានតិចតួចក្នុងការជួសជុលផ្នែកដែលបាត់បង់។ Urchins រស់នៅនឹងថ្មបូកក់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដោយប្រើបន្ទាវែងៗនិងជើងបំពង់ក្នុងការធ្វើចលនាហើយមានប្រភេទខ្លះដឹកផ្នែកខាងលើសម្រាប់ជាកន្លែងពួកវារស់នៅ។ Sanddollars មានជំរកនៅខ្សាច់ធ្វើចលនានៅលើខ្សាច់ឬឆ្នងកាត់ខ្សាច់ដោយបន្ទានិងជើងបំពង់។ Echinoidsខ្លះចំណីដែលសំខាន់របស់វាគឺជាស្មៅសមុទ្រប៉ុន្តែប្រភេទផ្សេងទៀតស៊ីសត្វងាប់ឬវាយកទុកក្នុងខ្សាច់ឬកក់ដើម្បីទាញយកសារធាតុសរីរាង្គ។ ត្រីផ្កាយសមុទ្រនិងពពួកសត្វសមុទ្រស៊ីសាច់ជាអាហារជាសត្រូវរបស់វា។ ក្រពេញភេទរបស់ Urchins ត្រូវបានស៊ីដោយមនុស្សដែលរស់នៅតំបន់ខ្លះ។



រូបភាពទី ៣១ Sea Urchin

៦.៣.៣. ថ្នាក់ Holothuroidea (sea cucumbers: ត្រសក់សមុទ្រ)

ពួកនេះជាប្រភេទសត្វមានខ្លួនទន់មានស្បែកដូចរោមសត្វដែលមានសុទ្ធតែបន្ទះកំបោរសំប៉ែតតូចៗ។ ទម្រង់ខ្លួនដូចសាច់ក្រក។ នៅពីមុខមាត់ត្រូវបានព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រុយកន្ត្រាក់ពី ១០ ទៅ ៣០ ប្រៀបដូច echinoderm ផ្សេងទៀត។ តាមធម្មតាមានជើងបំពង់ប្រាំជាសេរីតៗគ្នានៅតាមបណ្តោយខ្លួន។ ពីរសេរីនៅខាងខ្នងមានមុខងារវិញ្ញាណនិងដកដង្ហើម។ មានបីសេរីនៅខាងពោះប្រើសម្រាប់បំលាស់ទី។ ស្បែកខ្លួនចែកចេញជាស្បែក cuticle ស្បែក epidermis និងមានផ្តុំសាច់ដុំដីរឹងមាំនៅតាមបណ្តោយខ្លួន។ សកម្មភាពរបស់សាច់ដុំឆ្លងសារធាតុរាវក្នុងខ្លួនវានោះអាចឱ្យវិកប្រវែងបង្រួញឬធ្វើចលនាបាន។



រូបភាពទី ៣២ Sea cucumbers

ផ្លូវរំលាយអាហារស្តើងរាងជារង្វង់ត្រូវបានទ្រនៅក្នុង Coelom ដោយក្លាសពោះរៀន។ ទ្វារធំខាងក្រោយហើយនៅពីមុខទ្វារធំមានសាច់ដុំ Cloaca ភ្ជាប់នឹងបំពង់សម្រាប់ដកដង្ហើមដែលបែកចេញជាពីរ។ ទឹកបញ្ចេញនិងបញ្ចូលរបស់បំពង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការដកដង្ហើម និងបញ្ចេញចោលដោយសកម្មភាពរបស់ Cloaca។ ប្រព័ន្ធទឹករួមមាន ring canal នៅជុំវិញបំពង់អាហារនិងចង្កូរទាំងឡាយភ្ជាប់នឹងជើងបំពង់និង Madreporite ខាងក្នុង។ វាមានភេទដាច់ពីគ្នាហើយក្រពេញភេទភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់ចំហមួយនៅចំកណ្តាលខ្នងពីខាងក្រោយព្រុយ។

Holothurians ទម្រេតនៅបាតសមុទ្រភ្ជាប់នឹងថ្ម ឬនៅរុងក្នុងកក់ឬខ្សាច់ប៉ុន្តែវាមានប្រតិកម្មប្រសិនបើមានការរំខាន។ ចំណីរបស់វាជារូបធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងកក់ឬសព័ក្តកាយតូចៗដែលត្រូវបាន

ចាប់ដោយព្រួយ។ ពួកវាធ្វើចលនាដោយប្រើជើងបំពង់ឬដោយសារសាច់ដុំខ្លួនរបស់វា។ ពេលដែលមានការរំខានពីប្រភេទខ្លះវាបញ្ចេញបំពង់ស្អិត (សរីរាង្គ Cuvierian organs) ពីក្លូអាក់ទៅប្រឆាំងនឹងសត្រូវរបស់វា។

៦.៣.៤. ថ្នាក់ Crinoidea (ព្រលិតសមុទ្រទិចផ្កាយរោម)

ពួក Echinoderms ទាំងនេះមានទម្រង់ដូចផ្កាមានរាងដូចតែងនៅចំកណ្តាលហៅថា Calyx ហើយមានដៃប្រាំក្លាប់នឹងតែម Calyx ដើម្បីបង្កើតខ្នងពី ១០ ឬលើសពីនេះ។ Calyx ទ្រដោយ Cirri សម្រាប់ភ្ជាប់បណ្តោះអាសន្នទៅនឹង Substrate ក្នុងការរស់នៅដោយសេរីឬជួយទ្រដើមដីវែងព្រមទាំងមានឫសជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រោមសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅបាតសមុទ្រ។ ទាំងមាត់និងទ្វារស្ថិតនៅផ្ទៃលើបំផុតនៃ Calyx។ សព្វកាយតូចៗនិងកាកសំណល់ប្រើប្រាស់ជាអាហារដែលត្រូវបានចាប់ដោយជើងបំពង់នៅផ្នែកខាងលើរបស់ដៃ និងប្តូរបញ្ចូលទៅក្នុងមាត់។

ជំពូកទី៧

សាខាដង្កូវខ្លួនកង់ (PHYLUM ANNELIDA)

៧.១. លំដាប់ដើម

ដង្កូវខ្លួនកង់ស្ថិតនៅក្នុងសាខា (Phylum Annelida) ដែលមានដង្កូវខ្លួនផ្សំដោយកំណាត់កង់ ដូចគ្នាជាច្រើន ឬ Somites (កង់ជាប់គ្នា) ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ ជន្លេនដី (Class Oligochaeta) រស់នៅតាមដីសើម ជន្លេនសមុទ្រ (Class Polychaeta) ភាគច្រើនរស់នៅក្នុងដែនជម្រកទឹក និង ឈើង (Class Hirudinea) រស់នៅក្នុងទឹកសាបឬក្រាំងក្នុងដីសើម។

ពពួកដង្កូវខ្លួនកង់ជាច្រើនរស់នៅដោយសេរីតែមានខ្លះរស់ក្នុងបំពង់ប្រូងនិងប្រភេទខ្លះរស់នៅ លើសត្វក្នុងទឹកនិងមួយចំនួនតូចជាបរាសិត។ ជាទូទៅជន្លេនដីមានរូបរាងតូចនិងមានប្រវែងតែប៉ុន្មាន សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។ នៅអូស្ត្រាលីនិងអេក្វាទ័រមានពូជធំ (ប្រវែង២ម៉ែត្រនិងមានទំហំ២.៥ស.ម)។

៧.២. លក្ខណៈទូទៅ

- ដង្កូវខ្លួនវាស៊ីមេទ្រីសង្វាងវែងនិងមានកំណាត់កង់ៗទាំងក្នុងនិងក្រៅ
- ភ្ជាប់គ្នាដោយពកខ្លែងសង្វាងនិងមានរោមក្នុងកង់នីមួយៗ។
- ដង្កូវខ្លួនមានអិលសើមៗនិងពុំទ្រដោយអេពីតេលូមសម្រាប់បញ្ជា។-ផ្ទៃដង្កូវនិងប្រព័ន្ធរំលាយ អាហារមានស្រទាប់សាច់ដុំវែង។ ដង្កូវខ្លួនមានការលូតលាស់ល្អលើកលែងតែពពួកឈើងចេញ។
- បំពង់រំលាយអាហារស្ថិតតាមបណ្តោយដងខ្លួន
- វាដកដង្ហើមតាមស្បែកឬស្រកីចំពោះប្រភេទខ្លះ។
- ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលមានលក្ខណៈពិសេសមួយគូតាមកង់នីមួយៗ។
- ប្រព័ន្ធប្រសាទភ្ជាប់ទៅនឹងសរសៃប្រសាទផ្នែកពោះដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងខ្លួនសម្រាប់ ស្ទាបដឹងរស់ជាតិនិងពន្លឺ។
- វាជាសត្វរួមភេទហើយលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់ឬភេទនៅដាច់ពីគ្នាតាមដំណាក់កូនទើបកើត (larva) ។វាបន្តពូជតាមពន្លក (bud) ចំពោះប្រភេទខ្លះ។

៧.៣. សិក្សាពីជន្លេនដី (Class Ologochaeta:Earthworms)

៧.៣.១ លក្ខណៈខាងក្រៅ

វាងជាស៊ីឡាំងមានប្រវែងរហូតដល់៣០ស.មនិងទំហំប្រហែល១ស.មព្រមទាំងជ្រួញៗខាងចុង កង់នីមួយៗ។ផ្ទៃខាងពោះមានលក្ខណៈសំប៉ែត្រអិលនិងពណ៌ស្លេក។វាមិនមានក្បាលច្បាស់លាស់ ទេ។ មាត់ស្រួចនៅខាងក្បាល និងតូចនៅខាងចុង (ស្រួចដូចគ្នា)។ នៅលើកង់ទី ៣២ ដល់កង់ទី ៣៧ វាងប៉ោង (Clitellum) សម្រាប់ជាសំបុកដាក់ពង។ ក្នុងកង់នីមួយៗ (លើកលែងក្បាលនិងចុង កន្ទុយ)

មានប្រែងដូចរោមចំនួន៤គូ (setae) ហើយsetaeនីមួយៗអាចពន្លតបង្រួមឬបង្ហាស់ទីបានយ៉ាងស្រួលដោយសាច់ដុំខាងក្នុង។

៧.៣.២ លក្ខណៈខាងក្នុង

ខ្លួនរបស់ជន្លនមានបំពង់ នៅចំកណ្តាលសំខាន់ពីរ គឺស្រទាប់រាងកាយខាងក្រៅនិងប្រដាប់រំលាយអាហារនៅខាងក្នុង។ ចន្លោះក្នុងខ្លួនចែកជាកងៗដោយចំណែកចំហៀងដែលតំរៀបគ្នាស្ទើងៗ (Septa) រវាងសូមីតទាំងឡាយ។ ប្រហោងខ្លួននិងសរីរាង្គខាង ក្នុងទាំងអស់តភ្ជាប់គ្នាជាមួយអេពីតេលីយ៉ូម (Epithelium) ស្ទើងរលើង (ក្លាសពោះ: peritoneum) ។

៧.៣.៣ ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

វាផ្សំឡើងដោយ (១) មាត់ចំហនិងក្រអូមមាត់ (២) បំពង់កខ្លីមួយ (កងទី៤-ទី៥) ដែលរុំព័ទ្ធដោយសាច់ដុំស្រាញនិងក្រពេញ (៣) បំពង់អាហារស្ទើងស្រួច (កងទី៦-១៤) (៤) តែស្ទើង (Crop) កងទី១៥/១៦ (៥) កោះ (gizzard) កងទី១៧និង១៨និង (៦) ពោះរៀនវែងដែលបន្តភ្ជាប់រហូតដល់ (៧) វច្ឆមៈ។

អាហារ (ស្លឹកបន្លែ) ធ្វើមដោយទឹកក្រពេញបំពង់ក (Pharynx) និងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ដោយសារការកម្រិតសាច់ដុំ។ វារក្សាជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងតែ និងបន្ទាប់មកហ៊ុំព័ទ្ធដោយសាច់ដុំរបស់កោះជាទឹកនៃដែលមានគ្រាប់ខ្សាច់ជួយក្នុងដំណើរការ។ អង់ស៊ីមបានបញ្ចេញដោយក្លាសពោះរៀនដើម្បីរំលាយចំណីដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងពោះរៀន។ កាកសំណល់បញ្ចេញមកក្រៅតាមវច្ឆមៈ។

៧.៣.៤ ប្រព័ន្ធឈាមរត់ និងជកជង្គឹម

ជន្លនមិនមានប្រព័ន្ធដកដង្ហើមទេ។ ឈាមទទួលO₂និងបញ្ចេញCO₂ទៅក្នុងCapillariesនៅជិតខាងក្រោមក្លាសសើម (moist cuticle) ខ្លួន។ អ៊ុកស៊ីសែនបញ្ចូលជាមួយកោសិកាឈាមក្រហមនិងយកទៅចិញ្ចឹមជាលិកានានា។ ឈាមហូរទៅក្នុងសរសៃឆ្អឹងខ្នង និងហូរត្រឡប់មកសរសៃវែនវិញ។

៧.៣.៥ ប្រព័ន្ធបន្តពូជ

វាមានប្រដាប់បន្តពូជព្រីឈ្មោលរួមគ្នា។ ប្រដាប់ភេទឈ្មោលមាន៖ (១) ពងស្វាស២គូ (២) បំពង់ពូជ១ដែលភ្ជាប់ទៅនឹង (៣) បំពង់បញ្ចេញខ្លី១។ បំពង់សង្វាងទាំងពីរភ្ជាប់ទៅនឹង (៤) បំពង់យ៉ងដែលឆ្ពោះទៅរន្ធភេទឈ្មោល (កងទី១៥)។ ពងស្វាសនិង Funnel មាន (៦) ថង់ធំ២គូសម្រាប់បញ្ចេញស្នែម៉ាតូសូអ៊ីតខណៈពេលវាបន្តពូជ។

ប្រដាប់បន្តពូជព្រីមាន (១) អូវែ២សម្រាប់បញ្ចេញអូវែទៅក្នុងដងខ្លួនដែលចាប់យកដោយ Funnel ហើយឆ្ពោះទៅរក (៣) បំពង់អូវែ (កងទី១៤)។ ប្រដាប់ភេទព្រីក៏មានអូវែ២ (១) ផងដែរសម្រាប់ផ្ទុកអូវែក្នុងប្រហោងខ្លួនដែលត្រូវទទួលដោយ (២) ដីឡាវ (funnel) បន្តរហូតដល់ (៣) បំពង់អូវែដែលបើកចំហនៅកងXIV។

៧.៤. លក្ខណៈធម្មជាតិនិងជីវប្រយោជន៍

ជន្លនកើតមានទូទៅលើពិភពលោកយើង ហើយវារីកលូតលាស់ ក្នុងលក្ខខណ្ឌដីសមស្រប មានមេរោគ និងមិនសើមខ្លាំង។ ពួកវាមានទម្លាប់រស់នៅក្នុងរូងសម្រាប់ការពារពីអាកាសធាតុ និងសត្វ ចង្រៃផ្សេងៗ និងអាចរូងជ្រៅទៅក្នុងដីជំរៅរហូតដល់២ម៉ែត្រដើម្បីជៀសពីកំដៅថ្ងៃ ត្រជាក់ខ្លាំងឬទឹក ជំនន់។ ក្នុងដីរឹង ជន្លនលុងដីដោយស៊ីតាមវិធីរបស់វាហើយបញ្ចេញតាមប្រដាប់រំលាយអាហារ និងពូន លើផ្ទៃដីហៅថាអាចមន៍ជន្លន។

ជន្លនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជានុយសម្រាប់ស្នូចត្រីហើយវាបានក្លាយជាវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ ទីផ្សារ។ ជន្លនមានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដូចជាពូនបំពេញផ្ទៃដីធ្វើឱ្យដីធូរជួយឱ្យខ្យល់និងទឹកជ្រាប ចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដីបានជ្រៅបង្កើតជាជីវចម្រុះដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើនដីជាតិដីសម្រាប់ ផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ បច្ចុប្បន្នជន្លនក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរ ជាប្រភពប្រូ តេអ៊ីនខ្ពស់(៥៥%)សម្រាប់បង្កើនដីជាតិចំណីក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមបក្សីខ្នាតតូច(មាន់ ទា)។



រូបភាពទី ៣៣ ជន្លនក្រហម

៧.៥. សិក្សាករណី ថ្នាក់ជន្លនសមុទ្រ (Class Polychaeta: Marine worm)

វាជាប្រភេទជន្លនដែលរស់នៅជាទូទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលពួកវាខ្លះរស់ដោយសេរីនិងខ្លះទៀត រស់នៅដោយជ្រកក្នុងខ្សាច់និងភក់។ វាមានដងខ្លួនវែងស្មើនិងខ្សែស្រងាត់ដែលផ្គុំឡើងដោយកង់ជា ច្រើនរាងមូលសំប៉ែតផ្នែកខាងពោះ។ វាមិនដូចជន្លនដីទេ ក្បាលវាមានប្រមោយទន់ជាច្រើនគូ ភ្នែក២ គូ និងមាត់ភ្ជាប់នឹងថ្នាម។ ដងខ្លួនតាមបណ្តោយពោះទាំងសង្វាងមានព្រុយមួយជួរ(Parapodium) សម្រាប់ទ្រដងខ្លួន និងបំលាស់ទី។

ដងខ្លួនវាគ្របដណ្តប់ដោយស្រទាប់ភ្នាសរឹង (Cuticle) និងផ្នែកក្រោមស្រទាប់មានស្រទាប់សាច់ដុំស្តើង។ សីឡូមតភ្ជាប់គ្នានឹងស្រទាប់ពោះ (Peritoneum) និងបំបែកជាចំណែកៗដោយ Septa។

ប្រដាប់រំលាយអាហារចែកចេញជា មាត់ ដើមក បំពង់អាហារ ក្រពះ និងពោះវៀន។ វាគ្មានត្រីបូកោះទេ។

ប្រព័ន្ធលាមរត់មានសរសៃឈាមទោលបំបែកខាងខ្នងនិងបំបែកខាងពោះដែលភ្ជាប់ទៅផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយប៉ុន្តែវាមិនមានបេះដូងទេ។ សមាសភាពឈាមមានកោសិកាឈាមក្រហម (Hemoglobin) ដែលហូរតាមបណ្តោយដងខ្លួន ដោយការកន្ត្រាក់របស់សរសៃឈាមខ្លួន។

ការដកដង្ហើមធ្វើឡើងតាមសរសៃឈាមធ្មាវៗនិងភ្នាសដងខ្លួននិង parapodia ហើយបញ្ចេញមកក្រៅតាមរន្ធនោមជាតូតូចៗ (Nephridia) ។

ប្រព័ន្ធប្រសាទមានខួរក្បាល១ភ្ជាប់ទៅនឹងក្បាលនិងព្រួយដែលបន្តទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទផ្តឹងខ្នងនិងសរសៃប្រសាទផ្សេងៗទៀតក្នុងកង់នីមួយៗ។

ភេទនៅដាច់ពីគ្នាហើយក្រពេញរបស់វាអាចមើលឃើញនៅរដូវបន្តពូជតែប៉ុណ្ណោះ។ ពងនិងស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតស្ថិតនៅលើភ្នាសពោះ (Peritoneum) ហើយពេលទុំត្រូវបញ្ចេញមកខាងក្រៅតាមរន្ធតូចៗនិងញាស់ក្នុងសមុទ្រ។

ការបង្កកំណើត ចាប់ផ្តើមប៉ុន្មាននាទីពេលមកដល់ក្នុងសមុទ្រ ញាស់ជាកូនជន្លេន និង ក្រោយមកវិវត្តន៍ជាជន្លេនពេញវ័យ។

ប្រភេទ Polychaetes ខ្លះរស់នៅក្នុងទឹកសាបប៉ុន្តែជាទូទៅរស់នៅក្នុងសមុទ្រចាប់ពីមាត់ឆ្នេររហូតដល់បាតសមុទ្រ។

៧.៦. សិក្សាករណីលឿង (Class Hirudinea: Leeches)

លឿងមានការយល់ដឹងជាសកលក្នុងចំណោមប្រជាជន កសិករ និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

៧.៦.១. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់លឿង

លក្ខណៈរូបរបស់វា គឺមានរាងទ្រវែង ទន់សំប៉ែតដែលអាចបង្រួម និងពង្រីកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាផ្តុំឡើងដោយ ៣៤កង់ ប៉ុន្តែភាគច្រើនមានស្នាមជ្រួញ និងភាពយឺត។ វាមានមាត់បីតទាំងសង្វាង ប៉ុន្តែគ្មានស្រកាគ្របលើដងខ្លួនទេ។ វាមានលក្ខណៈ ជាប្រព័ន្ធសាច់ដុំយឺតដ៏អស្ចារ្យដែលអំណោយផលក្នុងការបត់បែន (ពង្រីក បង្រួម និងផ្លាស់ទីកន្លែង)។

ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់វាមាន (១) មាត់ព័ទ្ធជុំវិញប្រដាប់បីតខាងមុខ (២) បំពង់ក (៣) បំពង់អាហារ (៤) កោះ (៥) ពោះវៀនតូចឆ្មារ (៦) ចុងពោះវៀនធំខ្លី (៧) រន្ធកូទចំហនៅពីមុខប្រដាប់បីតខាងក្រោយ។

ប្រព័ន្ធឈាមរត់គឺបិទជិតដំណើរឈាមរត់អាស្រ័យការកន្ត្រាក់របស់ជីពចរក្នុងសរសៃឈាមនិងសរសៃឈាមតូចៗដែលមានតួនាទីជាសរសៃរាងដកដង្ហើមផងដែរ។ ការបញ្ចេញចោលប្រព្រឹត្តឡើងដោយបំពង់នោមទាំងគូ (paired nephridia) ដែលមានតិចជាងពពួកជន្លេនដី។

ផ្នែកក្នុងខ្លួនរបស់ឈ្លើងមានអូវុវ័១គូ និងពងស្វាសជាច្រើន។ ប្រដាប់ភេទទាំងពីរមានលក្ខណៈសំគាល់រៀងៗខ្លួន (លិង្គនិងយោនី) ។ យោនីស្ថិតនៅពាក់កណ្តាលពោះរបស់វាដែលហៅថារន្ធបន្តពូជ។

៧.៦.២. លក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ឈ្លើង


ជាទូទៅឈ្លើងរស់នៅក្នុងទឹកសាប ឬដីសើម មានតែប្រភេទតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រ។ ប្រភេទខ្លះរកចំណីដោយខ្លួនឯងនិងខ្លះទៀតជាអ្នកចាប់សត្វជាអាហារ (predator) ។ ភាគច្រើនគេបានស្គាល់ គឺពួកជញ្ជក់ឈាមសត្វមានឆ្អឹងកងដូច ជាត្រីគោក្របីមនុស្ស។ល។ ពួកវាបីតឈាមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារមាត់បីតនិងការកន្ត្រាក់ស្បែករបស់វា។ ឈ្លើងមានច្រើននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនមានការគំរាមកំហែងដល់ពពួកសត្វឆ្អឹងកង និងមនុស្សផងដែរ។

ជំពូកទី៨

សាខាអាកត្រូប៉ូត (Phylum Arthropoda)

៨.១. លំដាប់ដើម

សាខាអាកត្រូប៉ូត (Arthropoda, Gr. arthro, jointed + podas, foot) ជាប្រភេទសត្វដើងច្រើននិងមានគ្រោងឆ្អឹងគ្របដណ្តប់រាងកាយពីខាងក្រៅ (សំបកឬស្នូក) មានប្រហែល ៩០% ប្រភេទសត្វរួមទាំងក្តាមបង្កងខ្យងគ្រុំព្រមទាំងថ្នាក់ Crustacea ផ្សេងទៀតនិងសត្វល្អិត (ថ្នាក់ Insecta) មានពីងពាងខ្សាជីវីក្តែប (ថ្នាក់ Arachnida) ម្រើមព្រះ (Subclass Chilopoda) ។



រូបភាពទី ៣៤ សាខាអាកត្រូប៉ូត (Arthropoda)

វាមានដងខ្លួនជាកង់ៗតាមលំដាប់ផ្សេងគ្នានិងមានខ្នងភ្ជាប់គ្នាដែលបំពេញតួនាទីពិសេសៗទៅតាមប្រភេទរបស់វាសម្រាប់ការរស់នៅ។ វាមានប្រព័ន្ធប្រសាទភ្នែក និងសរីរាង្គវិញ្ញាណដ៏ទៃទៀត។ ជាទូទៅមានការវិវឌ្ឍបានល្អនិងមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅ នឹងការដាស់ផ្សេងៗ (Stimuli) ។

ភាគច្រើនពួកវារស់នៅលើដីក្នុងជីវិត (មិនដក់ទឹក) ក្នុងខ្យល់ ឬក្នុងទឹកសាប/ភ្លាវនិងពួកសត្វល្អិតជាសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នងប៉ុន្តែមានស្ថាបសម្រាប់ហើរបាន។

ប្រភេទសត្វវិទ្យាជាតិមួយចំនួនសម្រាប់ជាអាហាររបស់មនុស្សប៉ុន្តែពួកខ្លះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដូច ជាក្តែបខ្លួយខ្សាជីវី និងសត្វល្អិតមួយចំនួនជាបរាសិតនិងបំផ្លាញដល់ដំណាំផ្សេងៗប៉ុន្តែ

មួយចំនួនក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរ ដូចជា ឃ្មុំ ឌីម៉ាល់ អណ្តើកមាសជាដើម។

៨.២. លក្ខណៈទូទៅ

- វាមានស៊ីមេទ្រីសង្ខាងដងខ្លួនកង់ៗ(somites)ដែលតភ្ជាប់ពីក្បាល ទ្រូង និងពោះ(ដាច់ពីគ្នា ឬ ជាប់គ្នា)។
- វាមានខ្នង១គូតាមកង់នីមួយៗជាជើង(ខ្លះមិនមាន)សម្រាប់បំលាស់ទី។
- វាមានគ្រោងឆ្អឹងគ្របពីក្រៅរឹង(សំបកឬស្នូក)ហើយជម្រុះចោល(សក) ក្នុងចន្លោះពេលណាមួយ។
- សាច់ដុំរបស់វាមានឆ្នុតសាញៗហើយធ្វើសកម្មភាពឆាប់រហ័ស។
- ប្រដាប់រំលាយអាហារមានមាត់ជាមួយថ្នាម និងបញ្ចប់ដោយរន្ធកូទ។
- ប្រព័ន្ធណាមមានបេះដូងជាមួយសរសៃអាទែរ (គ្មានសរសៃវែនទេ)។
- ការដកដង្ហើមផ្សេងៗគ្នាតាមស្រកី បំពង់ខ្យល់ ស្ថិតឬតាមដងខ្លួន។
- ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៃខួរក្បាលមុខតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធប្រសាទឆ្អឹងខ្នង(ជាតូ)និងកូនកណ្តុទឹក រឹង(ganglia)ជាមួយគ្នាកង់នីមួយៗ។វាមានសរីរាង្គវិញ្ញាណសម្រាប់មើលស្ទាបដឹងរស់ជាតិ និង ដឹងភ្លិន។
- ជាទូទៅប្រដាប់ភេទនៅដាច់ពីគ្នាការបង្កកំណើតភាគច្រើននៅខាងក្នុងវាមានល្បឿនស៊ុតវាបង្កជា កូនញាស់មួយតែម្តងឬច្រើនដំណាក់ការ។Parthenogenesisសម្រាប់ប្រភេទសត្វល្អិតនិង Crustsceaខ្លះ។

៨.៣. ចំណែកថ្នាក់

- សាខា Arthropoda ចែកចេញជា ៣ សាខារង រួមមាន៖ Trilobit (រស់ក្នុងទឹក) , Chelicerata (ជង្គៀប) និង Mandibulata(សត្វល្អិតថ្នាមប្រណាក)។
- ពពួក Trilobita គឺកើតមានឡើងជា Arthropoda ដំបូងបង្អស់ប៉ុន្តែបានរលាយបាត់ពូជទៅហើយ បច្ចុប្បន្ននេះ។
- ចំពោះ Chelicerata ខុសពី Mandibulata តាមវិធី២បែប(១)វាមិនមានអង់តែន និងខ្នងទី១របស់ វាដូចជាជង្គៀបទេ។
- Mandibulata ទាំងអស់មានអង់តែននិងចែកជា២ថ្នាក់បង្កងកំពិសក្តាមនិងសត្វល្អិត។ ពួកបង្កង កំពិសក្តាមខ្លះខុសពីសត្វល្អិតដោយវាមានអង់តែន២គូនៅលើក្បាលរីឯសត្វល្អិតវិញមានអង់តែ ន១គូតែប៉ុណ្ណោះ។

៨.៤. សិក្សាថ្នាក់ Crustacea

ជាពពួកមានសំបកស្រោបរួមមានបង្កងកំពិសក្តាមបង្ហាខ្យងងាវ។ ភាគច្រើនពួកវារស់នៅក្នុង ស មុទ្រតែមានខ្លះរស់នៅក្នុងទឹកសាបផងដែរ។ពួកវារស់នៅដោយសេរីនិងប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយប្រភេទខ្លះ រស់ជាបរាសិត។

៤.៤.១. លក្ខណៈទូទៅ

- ក្បាលវាផ្គុំឡើងដោយកង់ចំនួន៥ រួមគ្នា និងមានអង់តែន ២គូ មានផ្ចឹងថ្នាមក្រោម១គូ និងថ្នាមលើ ២គូ ព្រមទាំងដងខ្លួនគ្របដណ្តប់ដោយស្កុកតាំងពីក្បាលរហូត ដល់កន្ទុយហើយ ស្រកាទ្រូងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងៗខ្លួនបង្កផ្គុំឡើងដោយក្បាល(៥កង់) ទ្រូង(៨កង់)។
- វាដកដង្ហើមតាមស្រកី។
- ប្រដាប់បន្តពូជផ្តាច់ចេញពីគ្នាភាគច្រើនមានជាគូពងត្រូវរក្សាទុកដោយមេ។បន្តពូជដោយការរួម ភេទផ្ទាល់ក្នុងក្រុម Crustcea មួយចំនួន។

៤.៤.២. លក្ខណៈពិសេស

ដងខ្លួនបង្កមាន២ផ្នែកសំខាន់ Cephalothrox (ក្បាល និងទ្រូង) និង Jointed Abdomen(ខ្លួនភ្ជាប់ ពោះ)។ដងខ្លួនជាទូទៅគ្របដណ្តប់ដោយសំបក(Chitin) ស្មើង ទន់ ដែលអាចបត់បែនបាន។

ពោះ(៦កង់)និងកង់១ៗមានខ្លែងពោះ(១គូរ)។ ភ្នែកវាលៀនចេញនិងរុំព័ទ្ធដោយភ្នាសថ្នា ដូចជាគ្រាប់អង្កា។ មាត់ស្ថិតនៅផ្នែកពោះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយផ្នែកសំខាន់និងរន្ធកូទស្ថិតនៅផ្នែកខាង ចុងនៃពោះ។ស្រកីស្ថិតនៅខាងទ្រូងក្រោមស្កុក។ប្រដាប់ភេទបើកទាំងគូ។ប្រដាប់ភេទបង្កញ្ជីស្ថិតនៅ ចំជើងទី៣រីឯឈ្មោលស្ថិតនៅជើងទី៥។

លើកង់នីមួយៗផ្នែកខាងពោះមានខ្លែងជាប់គ្នាចំនួន១គូដែលប្រើជាដៃសម្រាប់ធ្វើការបម្លាស់ ទី។ ខ្លែងនីមួយៗមានសាច់ដុំខាងក្នុងសំបកសម្រាប់បត់បែន និងពន្លត់ផ្នែកមួយចំនួន។

ខ្លែងទី១៤ដល់១៨មាន នាទីសម្រាប់ហែលដែលជួយក្នុងការដកដង្ហើមនិងបង្កញ្ជីប្រើក្នុង ការរក្សាពង។ចំពោះបង្កឈ្មោលវិញសម្រាប់បញ្ជូនទឹកកាម។ផ្នែកចុងក្រោយ(គ្មានកង់)ជាកន្ទុយ សម្រាប់ធ្វើជាចង្កូត។

៤.៤.៣. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ

ចំណីចូលទៅក្នុងមាត់ដោយជើងទី២និងទី៣ហើយកាត់និងកំទិចជាចំណែកតូចៗដោយថ្នាម ក្រោម(Mandible)។ ក្រពះមានធ្មេញតូចៗ(Calcified)បង្កើតជាត្បាល់(GastricMill) សម្រាប់កិន រំលាយអាហារ។ នៅខាងក្រោយត្បាល់កិនមានសរសៃសក់ជាតម្រងសម្រាប់បោះចំណែកល្អិតៗនៃ ចំណីចូលទៅក្នុងបាតក្រពះ។ ថ្លើមបានបញ្ចេញអង់ស៊ីមរំលាយអាហារដែលនឹងជ្រាបចូលទៅពោះវៀន តូចរួចចូលទៅសរសៃឈាមដើម្បីទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គផ្សេងៗចំណែកដែលមិនរលាយត្រូវបញ្ចេញមកក្រៅ តាមរន្ធកូទ។

ប្រព័ន្ធឈាមមានបេះដូងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងខ្នងនៃទ្រូងព្យួរក្នុងថង់ជំងឺមួយដើម្បីប្រមូលយក ឈាមពីចន្លោះបើកនាវានៃដងខ្លួន។ ការកន្ត្រាក់របស់បេះដូងបានបញ្ជូនឈាមទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃ

រាងកាយតាមរយៈសរសៃអាទែរដែលមានសន្ទះបិទបើកឬត្រីស "valves" សម្រាប់ការពារឈាមកុំឱ្យហូរត្រឡប់មកវិញ។ ឈាមចេញពីសរសៃខាងក្នុងចូលទៅក្នុងសរសៃឈាម (Sinus) ហើយឆ្ពោះទៅកាន់ស្រកី។ នៅទីនោះ O₂ និង CO₂ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគ្នានិងបន្ទាប់មកឈាមក៏ហូរត្រឡប់មកកាន់សរសៃឈាមនាំយកទៅចិញ្ចឹមជាលិកាផ្សេងៗជាទូទៅសាខា Arthropod មិនមានសរសៃឈាមវែនទេ។

ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម ជាដំណើរការដកដង្ហើមតាមស្រកីដែលនាំយក O₂ ក្នុងទឹកដោយចលនារបស់ខ្លួនផ្នែកខាងពោះទាំងឡាយ។ កោសិកាឈាមក្រហមក៏ជួយបញ្ជូន O₂ ដូចជាដំណើរការបង្កើតកោសិកាឈាមក្រហមរបស់សត្វមានឆ្អឹងកងដែរ។

ប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ពួកវា គឺមានប្រដាប់ភេទដោយឡែកពីគ្នា។ បង្កងឈ្មោលមានលិង២ ទន់ពណ៌សនៅជាប់ក្បែររូបបេះដូង។ សត្វញីមានកន្សោមពោះធំទូលាយជាងសត្វឈ្មោល។ វាមានស្បូន២ សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅ នឹងប្រដាប់ភេទឈ្មោលនៅពេលរួមភេទហើយពង នឹងត្រូវបញ្ចេញចោលតាមបំពង់អូវុល (Oviduct) ដែលបើកចំហស្ថិតនៅផ្នែកនៃជើងទី៣។

ក្នុងពេលរួមភេទបង្កង ឈ្មោលបញ្ចេញទឹកកាមដាក់ចូលក្នុងប្រដាប់ភេទញីបន្ទាប់មកសត្វក៏រលាចេញពីគ្នា។ ក្រោយមកបង្កងញីទម្លាក់ពងរាងស្រួចៗ ប្រហែលពី ២០០ ទៅ ៤០០ ពងពីដៃស្បូនហើយបង្កកំណើតជាមួយស្តេម៉ាតូសូអ៊ីតនៅក្នុងប្រដាប់ភេទ។ ស៊ុតទាំងនោះអណ្តែតលើទឹកប្រហែល ៥ សប្តាហ៍ក្រោយមកញាស់ជាកូនបង្កងនិងវាស់នៅដោយឯករាជ្យ។ ពួកវាចាប់ផ្តើមសក់៦ឬច្រើនជាងក្នុងរយៈពេល២ខែដំបូង និងអាចរស់នៅបានជាច្រើនឆ្នាំ។

៤.៤.៤. លក្ខណៈធម្មជាតិ និង វប្បធម៌

ជាលក្ខណៈធម្មជាតិបង្កងច្រើនរស់នៅប្រមូលផ្តុំគ្នានៅបាតទឹកហើយលាក់ខ្លួននៅពេលថ្ងៃក្រោមឬក្រវែងថ្មដោយស្ងៀមស្ងាត់។ អង្គតែនរបស់វាកម្រើកតិចៗនិងកន្ទុយធ្វើចលនាដកដង្ហើម។ វាចាប់ចំណីដែលហែលកាត់យ៉ាងប្រញាប់ហើយត្រឡប់ចូលកន្លែងដើមសម្ងៀមវិញ។ បង្កងអាចដើរទៅមុខចំហៀងឬថយក្រោយយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើជើងទាំង៤ គូរបស់វា។ ពួកវាកាត់ចេញរកចំណីយ៉ាងសកម្មនៅរដូវរំហើយនិងដើមរដូវក្តៅប៉ុន្តែនៅរដូវរងារវិញពួកវាសម្ងាត់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងក្រវែងថ្មក្រោមទឹក។

ជាទូទៅបង្កងជាចំណីដ៏មានរសជាតិសម្រាប់មនុស្ស។ Crustaceans តូចៗរស់ក្នុងទឹកសាបនិងប្រៃ។ វាមានទាក់ទងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវដ្តចំណីសម្រាប់ត្រីជាច្រើននិងវារីវប្បកម្មផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាង Crustaceans ខ្លះក៏ជាជម្រកបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ពួកបរាស៊ីតដែលបង្កផលវិបាកដល់មនុស្សនិងសត្វមានឆ្អឹងកងដ៏ទៃទៀតផងដែរ។ ឯខ្លះទៀតដែលនៅឆ្នេរសមុទ្របំផ្លាញដំណាំនិងផលកសិកម្មរបស់កសិករ។

៨.៥. សិក្សាថ្នាក់ Arachnida

ពពួកនេះរួមមានពីរពាន់ ខ្លួនខ្យងរឹចសត្វល្អិត។ ពួកវាជាប្រភេទសត្វតូចៗរស់ដោយសេរីលើដីដែលភាគច្រើនចូលចិត្តរស់ ក្នុងតំបន់ក្តៅពួកវាខ្លះបញ្ចេញក្រពេញមានជាតិពិសសម្លាប់សត្វល្អិតដ៏ទៃទៀតធ្វើជាអាហាររបស់វា។ ពឹងពាងមានក្រពេញពិសសបង្កើតជាសំណាញ់សូត្រសម្រាប់ចាប់ចំណី ធ្វើជាជំរកនិងសំបុកដាក់ពងភាគច្រើននៃពពួកនេះមិនមានបង្កទុក្ខទោសប៉ុន្តែមានខ្លួននិងខ្យងរឹចអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែរ។

ចៃនិងសត្វល្អិតខ្លះបំផ្លាញដំណាំនិងជាបរាស៊ីតសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វហើយចៃមួយចំនួនក៏ជាជម្រកបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ពពួក Protozoas និងវីរុសដែលបង្កជាជម្ងឺផ្សេងៗ។

៨.៥.១. លក្ខណៈទូទៅ

វាមានក្បាល និងពោះច្បាស់ភ្ជាប់ជាមួយខ្នង៦គូ មិនមានអង់តែន និងថ្គាមទេ។ ផ្នែកក្បាលនិងបំពង់អាហារងាយស្រួល សម្រាប់បឺតជញ្ជក់ហើយខ្លះមានក្រពេញពិសផងដែរ។ ការដកដង្ហើមតាមស្នូត បំពង់ខ្យល់ ឬស្រកី។

ប្រព័ន្ធប្រសាទមានក្រពេញខ្លួនក្បាល និងសរសៃខ្លួនផ្នែកពោះ១គូ មានភ្នែក១គូ និងរោមលើដងខ្លួន។ ពួកវាមានភេទចែកដាច់ពីគ្នា និងបើកចំហ ជាទូទៅបង្កកំណើតក្នុងពោះមានការអភិវឌ្ឍន៍នៅខាងក្រៅដោយផ្ទាល់តែប្រភេទខ្លះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដង្កូវ(ដុកឌី)។ វារស់នៅដោយសេរីជាបរាស៊ីតនិងជាប្រេដាទ័រ(សត្វរំពេ)។

៨.៥.២. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ

ប្រជាប្រិយវាយអាហារមាន(១)មាត់(២)បំពង់អាហារ(៣) ក្រពះបឺតដំណើរការដោយចលនាកន្ត្រាក់សាច់ដុំ(៤)ក្រពះធំដែលមានថង់៥គូ(៥)ពោះរៀនក្នុងពោះដែលមានបំពង់ទទួល(៦)ទឹកក្រពេញវិលាយអាហារពីថ្លើម និងនាំទៅ (៧)ចុងពោះរៀន មុននឹងដល់(៨)រន្ធកូទ។

ប្រព័ន្ធលាមរត់គឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងសត្វល្អិតដ៏ទៃទៀតដែរ។ បេះដូងធំរាងជាបំពង់នៅខាងខ្នង រុំព័ទ្ធដោយថង់ដែលប្រមូលឈាមផ្ទុកO₂ពីសរសៃឈាមដែលនាំមកពីស្នូត។ ការកន្ត្រាក់បេះដូងរុញឈាមឆ្លងកាត់សរសៃអាទ័រទៅកាន់ក្រពះដើងភ្នែកនិងក្រពេញពិស។ ពឹងពាងដកដង្ហើមតាមស្នូតដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរO₂និង CO₂។

ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ។ ចាប់ផ្តើមពីក្រពេញកូនកណ្តុរលើបំពង់អាហារក្រាសទាំងពីរភ្ជាប់ទៅនឹងកូនកណ្តុរមួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកពោះរួចបន្តទៅសរីរាង្គទាំងអស់។

ប្រជាប្រិយភេទចែកដាច់ពីគ្នា និងមិនដូចគ្នាទេ។ ពឹងពាងឈ្មោលមានលើង២ដែលភ្ជាប់ដោយបំពង់រមួរៗ ទៅនឹងប្លោកនោម។ ឯសត្វញីមានស្បូន២ភ្ជាប់ដោយដៃស្បូនទៅនឹងយោនី។

៤.៥.៣. លក្ខណៈធម្មជាតិ

សត្វពីងពាងរស់នៅដោយសេរី និងដាច់ដោយឡែកពីគេដែលជាទូទៅចំណីរបស់ពួកវាគឺសត្វល្អិត។ វាប្រមាញ់ចំណីតាមវិធីផ្សេងៗ។សត្វល្អិតត្រូវបានសម្លាប់ដោយចង្កូមពិសប៉ុន្តែចំពោះសត្វធំត្រូវសម្លាប់ដោយរុំព័ទ្ធនឹងសំណាញ់សូត្ររបស់វា។ ភាគច្រើនពីងពាងរស់បានប្រហែលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែពីងពាងមានពិសធំៗ អាចរស់រហូតដល់២០ឆ្នាំ។ សត្វពីងពាង ជាក្រពេញទឹកមាត់រមួរជាអំបោះហើរទៅក្នុងខ្យល់។ វាមានទម្រង់ផ្សេងៗ ប្រើសម្រាប់ជាអន្ទាក់ចាប់ចំណី ជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងកាត់ និងធ្វើដំណើរ ជាជំរក និងសំបុកពង។

នៅពេលដែលពីងពាងឈ្មោលពេញវ័យវាបញ្ចេញដំណក់ទឹកកាមដាក់ក្នុងសំណាញ់និងទុកជាប់ក្នុងចុងជើងទី២។ ពីងពាងញឹកអាចសម្លាប់និងស៊ីអាណ្ណូលបន្ទាប់ពីរួមភេទរួច។ក្រោយមកវាបញ្ចេញពងដាក់ក្នុងសំបុកដែលជាប់នៅលើសំណាញ់ឬតោងជាប់នឹងពោះរបស់វារហូតដល់កូនវាញាស់។

ពីងពាងញឹកប្រភេទខ្លះរក្សាកូនតូចៗរបស់វាអស់រយៈពេលពី២ទៅ៣ថ្ងៃបន្ទាប់ពីញាស់។ពីងពាងរីកលូតលាស់ និងប្រែប្រួលរូបរាងព្រមទាំងពណ៌សំបុរដោយការ សក។ មុនពេញវ័យ កូនពីងពាងឈ្មោលសក ប្រហែល៥ដង រីងសត្វញឹក សក ពី ៧ ទៅ៨ដង។


ជំពូកទី៩

សាខា ខរដេត (Phylum chordates)

៩.១. លំនាំដើមសាខាខរដេត

សាខាខរដេត (ភាសាក្រិកchorda=ខ្សែ)រួមមានជួនីខេត (tunicates) ឡុងសេឡេត (lancelets)និងសត្វផ្អែងកងដូចជាត្រីlampreyត្រីឆ្ការត្រីផ្អែង (bonyfish)បណ្តុកសត្វ (amphibian) ល្អួន បក្សី និងថនិកសត្វ។

ពពួកខរដេតថ្នាក់ទាប (lower chordates) ភាគច្រើនជាសត្វតូចៗរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រ ដែលមានត្រីជួនីខេតភាគច្រើនមិនអាចបំលាស់ទីបានទេ។ ពពួកសត្វផ្អែងកងរួមមានពពួកសត្វដែល មានទំហំចាប់ពីមធ្យមទៅធំដោយរួមបញ្ចូលត្រីឆ្ការនិងត្រីបាឡែនធំៗ។សត្វផ្អែងកងមានរស់នៅគ្រប់ទី កន្លែង ក្នុងទឹកសាប ទឹកសមុទ្រ និងលើដី។



រូបភាពទី៣២ រចនាសម្ព័ន្ធសាខាខរដេត

៩.២. ចរិតលក្ខណៈទូទៅរបស់ខរដេត

ខរដេតមានរូបរាងស៊ីមេទ្រីសង្វាងមាន៣ស្រទាប់និងមានដងខ្លួនជាផ្នែកៗ។មានបំពង់រំលាយ អាហារពេញលក្ខណៈ និងមានប្រហោងខ្លួនស៊ីលីម (coelom) អភិវឌ្ឍន៍បានល្អ។ វាមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាងដែលខុសពីសត្វផ្សេងទៀតគឺ៖

- ពួរខ្នង (notochord)
- ពួរប្រសាទខ្នងរាងដូចបំពង់ (tubular nerve cord)
- និងរង្វះស្រកី (gill slit) ដែលតភ្ជាប់មកដើមក

លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះកើតមាននៅដំណាក់ដំបូងនៃអំប្រើយ៉ុងរបស់ខរដេតខ្លះនៅមានបន្តខ្លះទៀតត្រូវបានកែប្រែឬបាត់បង់ខណៈពេលពេញវ័យ។

៩.២.១. ពួរឆ្អឹងខ្នង (Notochord)


វាជាវចនាសម្ព័ន្ធជំនួយនៃរាងកាយរបស់ខរដេត។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃអំប្រើយ៉ុងវាបានកកើតនៅពីលើដើមកំណើតនៃពោះរៀនដើម (primitive gut) ដែលមានរាងដូចជំបង់ទ្រវែងនៃកោសិកាផ្ទុកទៅដោយធាតុអន្ទិលៗនិងនៅក្នុងស្រោមនៃជាលិកាឃ្នាប់ដែលមានជាតិសរសៃ។ នៅក្នុងសត្វសមុទ្រយុគដំបូង (tunicate) ពួរឆ្អឹងខ្នងមាននៅកន្ទុយតែនៅក្នុងពេលដំណាក់កាលជាកូនញាស់។

ចំពោះ lancelet និងសត្វមានទម្រង់ខ្ពស់ជាងឆ្អឹងខ្នងបានបន្តស្ទើរពេញប្រវែងនៃដងខ្លួនរបស់វា។ វាមានគ្រប់ដំណាក់កាលនៃជីវិត ដូចជាទម្រង់អ័ក្សដ៏សំខាន់ចំពោះសត្វ lancelet និងអន្ទង់ម្យ៉ាង (lamprey) ។ ប៉ុន្តែសត្វមានឆ្អឹងខ្នងមានពួរឆ្អឹងខ្នងរាងមូលឬក្លាយជាឆ្អឹងកងខ្នងទៅវិញ។

៩.២.២. ពួរប្រសាទ (nerve chord)

ពួរប្រសាទកកើតនៅលើផ្ទៃនៃអំប្រើយ៉ុងដំណាក់ដំបូងក្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណាក់ហ្គាស្ត្រូឡា (gastrulastage) ។ ការបត់ចូលនៃស្រទាប់អ៊ិកតូរិម (ectoderm) បង្កើតឱ្យមានបំពង់ប្រហោងក្នុងសរសៃពួរថង់ខ្លួរក្បាលៈបង្កើតនៃផ្នែកខាងមុខបានរីកធំ នៅខាងចុង ដែលស្ថិតនៅពីលើពួរឆ្អឹងខ្នង។ ដ៏សាមញ្ញ

ថង់ខ្លួរក្បាលដ៏ងាយ (simple cerebral vesicle) នៅក្នុងដំណាក់កូនញាស់នៃតួនីខេត (tunicate larvae) និង ឡង់ស៊ីលេត (lancelet) ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សត្វឆ្អឹងកងទាំងអស់ វាបានឡើងក្រាស់ និងក្លាយជាខ្លួរក្បាល។




រូបភាពទី៣៥ ទម្រង់ទូទៅរបស់សាខាខរដេត

ភាពខុសគ្នារវាង៖

(a)សត្វមិនមែនខរដេ (សត្វល្អិត) និង

(b)សត្វខរដេ(Salamander)ស្ថិតនៅត្រង់ទីតាំងនៃប្រព័ន្ធប្រសាទ បំពង់វិលាយអាហារ និង បេះដូង របស់សត្វទាំងនោះ។



រូបភាពទី៣៦ ភាពខុសគ្នារវាងសត្វមិនមែនខរដេត និងសត្វខរដេត

៩.២.៣. ថង់ស្រកីជាគូ (Paired gill pouches)

ថង់ស្រកីមួយគូបានកកើតនៅសង្វាងនៃបំពង់របស់អំប្រើយ៉ុង។ថង់ស្រកីនីមួយៗបានកកើត ដោយការផុតចេញនៃស្រទាប់ក្រោមស្បែក(endoderm)ក្នុងដើមកនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការលយចេញ នៃអិកតូខែមនៃរាងកាយ។

ទឹកដែលមានឧស្ម័នអុកស៊ីសែនរលាយបានឆ្លងកាត់មាត់និងដើមក និងចេញមកក្រៅតាម សរសៃឆ្មារៗ(filament)ក្នុងពេលនោះឈាមបានបញ្ចេញចោលCO₂និងទាញយកO₂វិញដូច្នោះស្រកី មានតួនាទីដកដង្ហើមខាងក្រៅ។

គ្រប់សត្វខរដេតដែលរស់ក្នុងទឹកចាប់ពីធូនីខេតដល់បណ្តុកសត្វ(amphibian)ដកដង្ហើមតាម រយៈស្រកី។ ចំពោះបណ្តុកសត្វដែលបានបម្រែបម្រួលពីកូនញាស់នៅក្នុងទឹកទៅជាសត្វពេញវ័យដែលដក ដង្ហើមតាមខ្យល់(air-breathing adults)។ ចំណែកស្រកីត្រូវបានបាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលបម្រែបម្រួល (metamorphosis)។

សត្វល្អិតបក្សីនិងថ្មីសត្វក្នុងដំណាក់កាលនៅជាអំប្រើយ៉ុងបានបង្កើតឱ្យមានស្រកីជាច្រើន គូ។ប៉ុន្តែវាមិនមានមុខងារនិងភ្លាមៗត្រូវបានបិទ។ ក្រោយមកសត្វទាំងអស់នេះទទួលបានស្លូត សម្រាប់ដកដង្ហើមនៅក្នុងខ្យល់ នៅពេលវាញាស់ឡើង។

៩.៣. ចំណែកថ្នាក់សាខាខ្លះ

សាខាខ្លះតែចែកចេញជា០៣សាខាដូចខាងក្រោម៖

ក-Urochordataមានពួកឆ្អឹងខ្នងពួកប្រសាទតែនៅក្នុងដំណាក់កាលកូនញាស់។ ចំពោះសត្វពេញវ័យមានបញ្ចេញស្រទាប់ស្នូត(tunic)។

ខ-Cephalochordataមានពួកឆ្អឹងខ្នង និងពួកប្រសាទពេញបណ្តោយដងខ្លួន និងបន្ទានជាមួយរង្វះស្រកី។

គ-Vertebrataមានឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាល (cranium) ធ្នូអាភារៈក្នុង(visceral arches) ឆ្អឹងកង និងខ្នុរក្បាល ។

ជំពូកទី១០

សត្វខរជេតថ្នាក់ទាប (Lower Chordates)

១០.១. ចំណែកថ្នាក់សាខាខរជេត


សាខាខរជេតចែកចេញជា០៣សាខាដូចខាងក្រោម៖

-Urochordataមានពួរឆ្អឹងខ្នង ពួរប្រសាទ តែនៅក្នុងដំណាក់កាលកូនញាស់។ សត្វពេញវ័យមានបញ្ចេញស្រទាប់ស្នួត(tunic)

-Cephalochordata មានពួរឆ្អឹងខ្នង និងពួរប្រសាទពេញបណ្តោយដងខ្លួន និងបន្តមានជាមួយរង្វះស្រកី។

-Vertebrataមានឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាល (cranium) ធ្នូអាការក្នុង (visceral arches)ឆ្អឹងកង និងខ្នុរក្បាល។

ខរជេតថ្នាក់ទាបមានសាខា០២គឺ៖សាខា Urochordata(Tunicates) និងសាខា Cephalochordata (Lancelets)។




រូបភាពទី៣៧ ភាពខុសគ្នារវាងសត្វខរជេតថ្នាក់ទាប

១០.២. សាខាខ ឃ្មុំខរជេត (Subphylum Urochordata - Tunicate)

ត្រី tunicate រស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រចាប់ពីសមុទ្រប៉ូលដល់តំបន់ត្រូពិចព្រមទាំងឆ្នេររាក់និងជ្រៅ រហូតដល់ជម្រៅ៤.៨ ខ្លះរស់នៅដោយសេរី ខ្លះមិនអាចបំលាស់ទីបាន គម។ខ្លះនៅម្នាក់ឯង ខ្លះរស់នៅ ជាក្រុម(colony)។ ទំហំវាចាប់ពីមីក្រូម៉ែត្ររហូតដល់៣០សមនិងមានប្រមាណ៣០០០ប្រភេទ

ដែលគេស្គាល់។ ការបន្តពូជខុសៗគ្នា ខ្លះដោយភេទ និងខ្លះអភេទ។ ធូនីខេតដែលស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺ កំប្រុកសមុទ្រ (sea squirt) ឬ អាស៊ីឡេន (ascidian) ។ នៅពេលគេប៉ះវា វាបញ្ចេញទឹកពីក្នុងខ្លួនវា។

សាខារង Urochordata: a tunicate



រូបភាពទី៣៨ ទម្រង់ទូទៅរបស់សាខារង យូរ៉ូខរដេ

ករណីសិក្សា

* អាស៊ីឡេនកូនញាស់ (Larval ascidian)


ស៊ីតតូចៗដែលបង្កកំណើតបានញាស់ក្លាយជាកូនញាស់តូចៗហែលទឹកដោយសេរីរវាងវាប្រហាក់ប្រហែលកូនក្អក (tadpole) របស់កង្កែប។ កន្ទុយរបស់វាមានពួរព្រូសាទសរសៃព្រូសាទនៃផ្ចឹងខ្នងរាងដូចបំពង់ និងសាច់ដុំកង់ៗមួយគូនៅសង្វាង។ បំពង់រំលាយអាហារពេញលក្ខណៈដែលមានមាត់ រង្វះស្រក់អិនដូស្តីល (endostyle) ពោះវៀន និងរន្ធបញ្ចេញចោល។ មានប្រព័ន្ធលាមរត់និងសរសៃឈាម និងស៊ីឡិម (coelom)។ មានប្រព័ន្ធព្រូសាទនិងរចនាសម្ព័ន្ធវិញ្ញាណរួមមាន (១) ខួរក្បាល (២) (trunk ganglion) (៣) ភ្នែកនិង (៤) ត្រចៀក។ ចង្កូរមានរោមញ័រតាមបណ្តោយដើមករបស់ធូនីខេតមានតួនាទីសម្រាប់ទទួលយកអាហារនិងអាចប្រៀបបានទៅនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៃសត្វថ្នាក់ខ្ពស់។ ប្រហោងសព៌ាងកាយមានសារធាតុរាវ និងព័ទ្ធជុំវិញដោយស្រទាប់មេសូទែម។

បម្រែបម្រួល (metamorphosis)

បន្ទាប់ពីកើតបាន២២ម៉ោងឬ២-៣ថ្ងៃនៃជីវិតសេរីកូនញាស់តូចៗបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងដុំថ្មក្នុង

ខ្សែរយរ ដោយក្រពេញស្តិត(adhesive gland)។ ការបំផ្លែងខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានកើតមានឡើង ដែលចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្លួនត្រូវបានរលាយបាត់។ កន្ទុយមួយផ្នែកត្រូវបានរុញបាត់ពួរប្រសាទ សរសៃប្រសាទ និងសាច់ដុំត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងរាងកាយ និងស្រូបយក។

- កូនញាស់ភ្ជាប់ជាមួយវត្ថុរឹងដោយឈ្នាប់
- កន្ទុយត្រូវបានស្រូបចូល ពួរប្រសាទ និងសរសៃប្រសាទរួមខ្លី
- ពួរប្រសាទរលាយបាត់ សរីរាង្គក្នុងចាប់ផ្តើម វិលធ្លាស់គ្នា
- បម្រែបម្រួលត្រូវបានបញ្ចប់។




រូបភាពទី៣៩ អាស៊ីឡេនកូនញាស់(Larval ascidian)

* អាស៊ីឡេនពេញវ័យ(Adult ascidian) (កម្រឃើញក្នុងសត្វ)

អាស៊ីឡេនសាមញ្ញ(Ciona, Molgula)មានរាងជាបំពង់ ឬដុំស្វែរ ភ្ជាប់ដោយបាតឬដើម។ វាពុំទទួលបានស្រទាប់យឺតហើយរឹង (test or tunic) បង្កើតពីសារធាតុដូចសរសៃសែលុយឡូស(កម្រឃើញក្នុងសត្វ)មានប្រហោងពីរនៅខាងក្រៅ៖ (១)សីហ្គុងសម្រាប់ចូល incurrent siphon, (២) សីហ្គុងសម្រាប់ចេញincurrent siphon នៅម្ខាង។ ទឹកដែលបឺតចូលតាមសីហ្គុងចូលនាំមកនូវការរស់តូចៗដែលជាចំណីអាហារនិងសម្រាប់ទទួលអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដកដង្ហើម ចំណែកទឹកដែលហូរចេញតាមសីហ្គុងនាំចេញនូវកាកសំណល់និងកោសិកាកេទចេញ។

ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចាប់ផ្តើមជាមួយសីហ្គុងចូលបន្ត ដោយរង្វង់នៃព្រុយដែលទទួលវិញ្ញាណរាងដូចសក់ ដែលស្ថិតនៅផ្លូវចូលចង់ស្រកី។ សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតរួមមាន អង់ដូស្ទីល បំពង់អាហារក្រពះ និងពោះវៀន។ រន្ធបញ្ឆោញចោល តភ្ជាប់ពីពោះវៀន និងស្ថិតនៅពីក្រោមសីហ្គុងបញ្ឆោញ។




រូបភាពទី៤០ អាស៊ីរឿនពេញវ័យ (Adult ascidian)

១០.៣. សាខារង សេហ្វាល់ឡូខរដេត (cephalochordata -lancelets)

ករណីសិក្សាអំពីយ៉ូស៊ីស (Amphioxus)

វាជាសមាជិកនៃថ្នាក់ Leptocardii រួមមានប្រមាណ៣០ប្រភេទនៃសត្វដែលរាងដូចត្រី (Branchiostoma) ដែលឃើញមានរស់នៅឆ្នេរនៃតំបន់ត្រូពិចនិងតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់បង្អួរ។ វាចោះចូលនៅក្នុងដីខ្សាច់ស្អាតនៃតំបន់ឆ្នេរដែលមានទឹករាក់។ លក្ខណៈពិសេសរបស់វាមានរាងស្មើដូចទ្រវែង និងស្រួចចុងដើម មិនមានក្បាលច្បាស់លាស់ទេ។ ព្រួយខ្នងផ្នែកកណ្តាលមាននៅភាគច្រើននៃដងខ្លួន និងព្រួយនៃរន្ធបញ្ចេញចោលចាប់ពីរន្ធបញ្ចេញទឹក (atriopore) រហូតដល់រន្ធបញ្ចេញចោលត្រូវបានបង្កើតដោយបន្ទប់ដែលមានព្រួយខ្លីនៃជាលិកាសន្ធាន។ កន្ទុយមានព្រួយដែលកើតពីភ្នាសស្មើ (membranous fin) ។ មាត់មាននៅផ្នែកខាងមុខនៃពោះ។ ចំណែករន្ធបញ្ចេញចោលនៅផ្នែកខាងឆ្វេងក្បែរគុម្ពព្រួយកន្ទុយ និងរន្ធបញ្ចេញទឹកនៅផ្នែកពោះ។



រូបភាពទី៤១ ទម្រង់ទូទៅរបស់សាខារង សេហ្វាល់ឡូខរដេត (Cephalochordata)

បំពង់រំលាយអាហារ: រាងត្រង់ហើយសាមញ្ញ ចាប់ផ្តើមពីចង្កូរផ្នែកខាងមុខ (vestibule) ដែលរុំ ព័ទ្ធដោយរោមមាត់ប្រមាណ២២រោម។ មាត់របស់វារាងមូល។ នៅពីក្រោយមាត់មានដើម ក ដែលមាន រង្វះស្រកី និងពោះរៀនបញ្ចប់នៅរន្ធបញ្ចេញចោល។

ប្រព័ន្ធលាមរត់:វាមិនមានបេះដូងទេ។ ក្រៅពីសរសៃឈាមច្បាស់លាស់នៅមានលំហដែលឈាម មិនមានពណ៌រត់ចេញចូលទៅក្នុងជាលិកា។ ឈាមរត់ចេញពីផ្លូវរំលាយអាហារហូរកាត់ពីផ្នែកខាងមុខ ក្នុងសរសៃវ៉ែនតូចៗនៃពោះរៀន ទៅសរសៃរៀនធំនៃថ្លើមនិងចូលទៅក្នុងថ្លើម។


ការដកដង្ហើមជាលទ្ធផលនៃការហូរឆ្លងកាត់នៃទឹកដែលផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែនពីដើមកន្លងកាត់ រង្វះស្រកីដែលមានច្រើនជាង១០០នៅផ្នែកសង្វាង និងបានឆ្លងកាត់ របាស្រកី(gill bars) ដែលមាន សរសៃឈាម។ ចរន្តទឹកនេះ បង្កើតដោយមានការជំនួយនៃសកម្មភាពរោមញ័រ នៅលើរបាស្រកី។

ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទភ្ជាប់នៅលើពួរឆ្អឹងខ្នង(notochord)។ សរសៃប្រសាទផ្នែកខ្នងមួយ ជាមួយប្រឡាយផ្នែកកណ្តាលតូចមួយ។ នៅចុងនៃផ្នែកខាងមុខវារីកធំបន្តិចហើយបង្កើតបានជាចង្កូរ ក្បាលផ្នែកកណ្តាល (cerebral vesicle)។

កេទពួកវានៅជាប់ពីគ្នា។វាមានក្រពេញប្រមាណ២៥គូ(២ជួរ)។ ស៊ុតនិងស្ពៃម៉ាតូសូអ៊ីតបញ្ចេញ ទៅប្រហោងក្នុង(atrial cavity) ឆ្លងទៅរន្ធខាងក្រៅ(atriopore)។ហើយការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅ នៅខាងក្រៅខ្លួន។ ស៊ុតមានទំហំអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល០.១ម.ម និងមានស៊ុតលឿងតិចតួចហើយវាធ្វើ

ចំណែកកោសិកាបែបទាំងស្រុង។ កំឡុងបង្កាត់ពូជនៅពេលថ្ងៃរះ។ ពេលព្រឹកឡើងវាញាស់ជាកូនមាន រោមញ័រ ហើយចេះហែលទឹក។ វាលូតលាស់ធំពេញវ័យ វាក៏ជ្រៀតចូលក្នុងដីខ្សាច់។

ទម្រង់របស់ត្រី ឡុងសេលេត (អំហ្វិយូសូស)




រូបភាពទី៤២ ទម្រង់ទូទៅរបស់ត្រី ឡុងសេលេត

សំណួរ

- ១-តើចរិតលក្ខណៈពិសេសទាំង០៣របស់ខរដេតមានអ្វីខ្លះ ?
- ២-ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ឡង់សេឡេត ចូលក្នុងសត្វខរដេតថ្នាក់ទាប ?
- ៣-តើចរិតលក្ខណៈខរដេតអ្វីខ្លះដែលគេឃើញមាន នៅក្នុងសត្វធូនីខេត ? តើវាបង្ហាញនៅក្នុង ដំណាក់កាលណានៃជីវិតរបស់វា ?
- ៤-ប្រៀបធៀបវដ្តជីវិតរបស់ធូនីខេត និងឡង់សេឡេត ?

ជំពូកទី១១


សាខារងសត្វត្រីខកង (Subphylum Vertebrata or Craniata)



រូបភាពទី៤៣ ទម្រង់ទូទៅសាខាសត្វខកង

១១.១. ចរិតលក្ខណៈទូទៅ

វាមានខ្នងក្បាលធំដែលស្ថិត នៅក្នុងលលាដ៏ក្បាលឬប្រអប់ខ្នងនិងបំពង់ខ្នងឆ្អឹងខ្នងចែកជាកងៗ ដែលបង្កើតបានជាអ័ក្សបញ្ញត្តិគ្រប់ខ្លួន។ តាមធម្មតាដងខ្លួនចែកចេញជា ក្បាល ក ខ្លួន និងកន្ទុយ។ នៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់នេះ បង្ហាញការលូតលាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធសរីរាង្គ។ ក្រៅពី ចរិតលក្ខណៈរបស់ ពួរខ្នង (notochord) សរសៃប្រសាទ (nerve cord) និងរង្វះស្រកី (gill slit) ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូកមុនៗ។



រូបភាពទី៤៤ ចរិតលក្ខណៈទូទៅសត្វឆ្អឹងកង

ក. ជងខ្លួន

វាគ្របដណ្តប់ទៅដោយភ្នាសអេពីតេលរ្យូមគឺអេពីឌែមី (epidermis) និងឌែមីស (dermis) ដែលមានក្រពេញជាតិស្ពែស (mucous glands)។ នៅក្នុងប្រភេទសត្វរស់ក្នុងទឹកភាគច្រើនមានស្រកាការពាររាងកាយ (ត្រី) សម្រាប់។ ចំពោះសត្វរស់លើគោកវិញ ពួកល្អិតមានស្រកា បក្សីមានរោម មានស្លាបនិងថនិកសត្វមានរោមឬសក់សម្រាប់គ្របដណ្តប់រាងកាយ។

ខ. គ្រោងឆ្អឹង

គ្រោងឆ្អឹងខាងក្នុងនិងឆ្អឹងសន្លាក់គឺជាឆ្អឹងខ្លីចំពោះសត្វឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាប។ គ្រោងឆ្អឹងពួកសត្វថ្នាក់ខ្ពស់មានមុខងារសម្រាប់ទ្រនិងការពារសរីរាង្គផ្សេងៗ។ លលាដ៏ក្បាលសម្រាប់ផ្ទុកខ្លួនក្បាលនិងមានខាបស៊ូល (capsules) មួយគូដែលផ្ទុកសរីរាង្គវិញ្ញាណពិសេស ធុអាការៈក្នុង (visceral arches) សម្រាប់ទ្រតំបន់ស្រកី បំពង់ឆ្អឹងខ្នងលាតសន្ធឹងចាប់ពីលលាដ៏ក្បាលរហូតដល់ចុងកន្ទុយ និងមានធុប្រសាទ (neural arches)។ នៅផ្នែកខ្នងសម្រាប់ផ្ទុកសរសៃប្រសាទ (nerve cord)។ វាមានខ្នែង (appendages) ២គូ ភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់ឆ្អឹងខ្នងតាមរយៈក្រវ៉ាត់អវៈយវៈ (limb girdle)។

គ. សាច់ដុំ

នៅលើគ្រោងឆ្អឹងមានសាច់ដុំ ដែលធ្វើចលនាផ្នែករបស់វា និងសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ទី។

ឃ. បំពង់វិលាយអាហារ

បំពង់នេះមានរាងទ្រវែង ស្ថិតនៅផ្នែកពោះនៃបំពង់ឆ្អឹងខ្នង។ នៅក្នុងមាត់មានអណ្តាតនិងជាទូទៅមានធ្មេញ។ រន្ធបញ្ចេញចោលនៅផ្នែកខាងចុងនៃដងខ្លួន។ ថ្លើមនិងលំពែងជាក្រពេញធំៗ

សម្រាប់វិលាយអាហារដែលបញ្ចេញរសំលាយអាហារតាមបំពង់ដែលភ្ជាប់ជាមួយពោះវៀន។

ង. ប្រព័ន្ធលាមរត់

រួមមានបេះដូងដែលកើតពីសាច់ដុំដែលបានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងល្អ ហើយចែកចេញជា ២៣ឬ ៤ថ្ងៃ ត។ វាស្ថិតនៅផ្នែកពោះក្បែរបំពង់វិលាយអាហារ។ កម្លាំងកម្រិតរបស់វា បង្កើតឱ្យមានចរន្តឈាមក្នុង ប្រព័ន្ធបិទមួយនៃសរសៃអាទែរ(arteries) សរសៃឈាមប្តូរតូចៗ(capillaries)និងសរសៃវ៉ែន។ ចរន្ត ឈាម ហូរទៅមុខនៅផ្នែកពោះ និងឈាមហូរទៅក្រោយវិញនៅផ្នែកខ្នង។ មានប្រព័ន្ធនៃសរសៃទឹករង មានផ្លូវអាអិក (aortic arches) មួយគូដឹកជញ្ជូនឈាមចេញពីបេះដូងទៅកាន់ស្រកីចំពោះសត្វឆ្អឹង កងថ្នាក់ទាប។ មានការបែងចែករវាងការដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវរបត់ឈាមរត់ឆ្លងកាត់បេះដូងដែលដឹកនាំ សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពរាងកាយ នៅក្នុងសត្វឈាមក្តៅ(warm-blooded animals) នៃពួក បក្សីនិង ថ្មីសត្វ។

ច. ការដឹកជញ្ជូន

សត្វឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាបមានស្រកីជាគូ ឯសត្វឆ្អឹងកងរស់លើដីមានស្នូត។

ឆ. តម្រងនោម

ជាសរីរាង្គបញ្ចេញចោលតាមរយៈបំពង់បើកចំហក្បែរ ឬឆ្លងកាត់រូបបញ្ចេញចោល។ ចំពោះសត្វ ឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាប វាចែកជាកងៗនិងបញ្ចេញចោលសារធាតុកាកសំណល់ពីសីឡូមនិងឈាម។ ចំពោះ ថ្នាក់ខ្ពស់វាមិនចែកចេញជាកងៗទេហើយបញ្ចេញចោលតែពីឈាមនិងមានប្លោកនោមសម្រាប់ស្តុកទឹក នោមចំពោះសត្វភាគច្រើន។

ជ. ខួរក្បាល

វាក្លាយជាតំបន់ដែលធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារអឌ្ឍគោលខួរ (cerebral hemispheres) និងខួរក្បាលផ្នែកខាងមុខ (cere-brum) រីកធំជាពិសេសចំពោះសត្វថ្នាក់ខ្ពស់។ មានសរសៃប្រសាទ នៃលលាដ៏ក្បាលចំនួន១០-១២គូ។ ក្នុងក្បាលមានមុខងារសម្រាប់ធ្វើចលនា និងវិញ្ញាណ។ មានប្រព័ន្ធប្រសាទឆ្អឹងខ្នងមួយគូដែលភ្ជាប់សរសៃប្រសាទបម្រើមុខងារដើមនៃកងដង ខ្លួន(primitive bodysomite) ដែលជាប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិ(auto- matic nervous system) ត្រួតពិនិត្យមុខងារអចេតនា(involuntary function) នៃសរីរាង្គក្នុង។


ឈ . ក្រពេញអង់ដូត្រីន

វាជាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត(thyroid)និងកីធូរតារី(pituitary) សម្រាប់ផ្តល់ការបញ្ចេញខាងក្នុងនៃអ័រ ម៉ូន(hormone)ដែលដឹកជញ្ជូនតាមឈាម ហើយមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យដំណើរការនៃរាងកាយដូចជា ការលូតលាស់និងការបន្តពូជជា ដើម។

ញ.ភេទ

ជាធម្មតាភេទពួកវានៅដាច់ពីគ្នា។ ប្រព័ន្ធបន្តពូជនៃភេទនីមួយៗមានក្រពេញភេទមួយគូ ដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាភេទតាមបំពង់ដែលបើកចំហចូលក្នុង ឬក្បែរនូវបញ្ចេញចោល។

ជំពូកទី១២ អំពីគ្រឹ



រូបភាពទី៤៥ ភាពផ្សេងគ្នានៃ ខណ្ឌ



រូបភាពទី៤៦ ប្រភេទត្រីផ្សេងៗគ្នា



រូបភាពទី៤៧ ប្រភេទត្រីម្យ៉ាងរស់នៅបាតសមុទ្រ

១២.១. ចំណែកថ្នាក់សាខាខ្លាច (Classification of Phylum Chordate)

សាខាខ្លាចចែកចេញជា៣សាខាដូចខាងក្រោម៖

១២.១.១ Urochordata

មានពួកឆ្អឹងខ្នង ពួកប្រសាទ តែនៅក្នុងដំណាក់កាលកូនញាស់។ សត្វពេញវ័យមានបញ្ចេញស្រទាប់ស្នួត (tunic) ។

១២.១.២ Cephalochordata

មានពួកឆ្អឹងខ្នង និងពួកប្រសាទពេញបណ្តោយដងខ្លួន និងបន្តមានជាមួយរង្វះស្រកី (gill slit)

១២.១.៣ Vertebrata(សត្វឆ្អឹងកង)

មានឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាល (cranium) ធ្នូអាភារៈ (visceral arches) ឆ្អឹងកង និងខ្នុរក្បាល។ សាខាខ្លាចសត្វឆ្អឹងកងចែកចេញជា៥ថ្នាក់មានដូចខាងក្រោម៖

- ត្រី (Fishes)
- បណ្តុកសត្វ (Amphibians)
- សត្វល្អិត (Reptiles)
- បក្សី (Birds)
- ម៉ែនីកសត្វ (Mammals)

១២.២. ថ្នាក់ត្រី (Fishes)

ថ្នាក់ត្រីមាន០៣ប្រភេទដូចរៀបរាប់ខាងក្រោម៖



រូបភាពទី៤៨ ថ្នាក់ត្រីអត់ឆ្អឹងថ្នាម

១២.២.១ ថ្នាក់ត្រីអត់ឆ្អឹងថ្នាម (Class Agnatha: Jawless fishes)

ត្រី hagfishes and lampreys (ថ្នាក់Agnatha និងសាមញ្ញជាងគេ។) ជាសត្វត្រីថ្នាក់ទាប វាមានរូបរាងដូចអន្ទង់មិនមានខ្នងថ្នាមឬស្រកាទេមានពូជខ្នង (notochord) ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈ ជាសត្វឆ្អឹងកងពិតប្រាកដនោះទេ។ ឡាំប្រេរសនៅក្នុងទឹកសាបឬទឹកប្រៃ រីឯហេដហ្វីសរស់នៅក្នុង សមុទ្រ។

១២.២.២ ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្ចី (Class Chondrichthyes: Cartilaginous fishes)


ត្រីឆ្អាមនិងត្រីបែល(ក្នុងថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្ចី)ជាសត្វឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាប ដែលមានឆ្អឹងកងដាច់ដោយ ឡែក និងពេញលក្ខណៈ ខ្នងមួយគូ នៅលើស្បែកមានស្រកា ឆ្អឹងថ្នាមអាចកម្រើកបាន និងមានរង្វះ ស្រកីច្រើន។ ភាគច្រើនវារស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រ ។

១២.២.៣ ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹង (Class Osteichthyes: bony fishes)

ត្រីពិតប្រាកដ គឺជាត្រីឆ្អឹងដែល មានគ្រោងឆ្អឹង និងស្រកាច្រើនប្រភេទ រន្ធចេញមួយនៅសង្វាង ស្រកីនីមួយៗ។ វាមានរូបរាងច្រើនប្រភេទ ហើយរស់នៅក្នុងទឹកគ្រប់ប្រភេទដូច ជាទឹកសាប ទឹកប្រៃ ត្រជាក់ ឬក្តៅខ្ពស់ៗ។

១២.៣. ករណីសិក្សា

១២.៣.១ ថ្នាក់ត្រីអត់ឆ្អឹងថ្នាម (Agnatha) :Class Jawless Fishes



រូបភាពទី៤៩ ថ្នាក់ត្រីអត់ឆ្អឹងថ្នាម

ថ្នាក់អាកណាថា (ត្រីអត់មានថ្នាម)ជាឧទាហរណ៍ ត្រីឡាំប្រៃ និង ហេដហ្វីសមកសិក្សា។ (Class Agnatha Lampreys and hagfishes), Agnatha = a (អត់) + gnathos (ថ្នាម) = ត្រី អត់ឆ្អឹងថ្នាម។

• ចរិតលក្ខណៈ:

ត្រីឡាំប្រេនិងហេដហ្វីសជាសត្វថ្នាក់ទាបដែលមានចរិតលក្ខណៈជាសត្វឆ្អឹងកង។ ដងខ្លួនរាងស្មើមូលទ្រវែងដូចបំពង់ស៊ីឡាំងរឹងផ្នែកកណ្តាលសំប៉ែត។ ព្រុយផ្នែកកណ្តាលទ្រដោយឆ្អឹងព្រុយដែលកើតពីឆ្អឹងខ្លី។ ស្បែកវាទន់ហើយរលោង មានក្រពេញសើមជាច្រើន មិនមានស្រកា ថ្នាមឬព្រុយគូទេ។ មាត់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខនៃពោះ (ventro-anterior) ត្រីឡាំប្រេមានប្រដាប់បីត រីឯត្រីហេដហ្វីសខាំមានចង់ច្រមុះមួយស្ថិតនៅកណ្តាល។ លលាដ៏ក្បាលនិងធូរអាការៈក្នុង (visceral arches) ជាឆ្អឹងខ្លីនិងមានពួរប្រសាទ។ បេះដូងមាន២ថត១ថតក្រោមនិង១លើ។ មានធូរអាការៈជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ស្រកី។ វាមានស្រកីពី៥-១៦ក្នុងចង់សង្វាងដើមក។ វាមានតម្រងនោមចំនួន០២។

១២.៣.២ ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្លី Class Chondrichthyes (Cartilaginous fishes)

ជាសត្វឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាប រួមមាន ត្រីឆ្មាម (shark) ត្រីបំបែល (ray, chimaera)។ ក្នុងភាសាក្រិច chondros = ឆ្អឹងខ្លី ichthyes = ត្រី ។





រូបភាពទី៥០ ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹងខ្លី

• ចរិតលក្ខណៈ:

វាមានស្បែករឹង មានស្រកាផ្លាកូអ៊ីតតូចៗ (placoid scales) និងក្រពេញសើមជាច្រើនមានព្រុយនៅខ្សែកណ្តាល (median fins) និងព្រុយគូដែលមានឆ្អឹងព្រុយជួយ។ ចំពោះសត្វឈ្មោលមានព្រុយពោះដែលមានក្លាស៊ី (claspers)។ មាត់នៅផ្នែកពោះ និងមានកាបាធូញ (enamel-capped teeth) រន្ធច្រមុះ២ឬ១ ថ្នាមលើ និងថ្នាមក្រោម និងមានពោះរៀនដែលមានប្រិះរាងស្បៀរ។

គ្រោងឆ្អឹងពីឆ្អឹងខ្លី មិនមានឆ្អឹងពិតប្រាកដលលាដ៏ក្បាលភ្ជាប់ដោយប្រអប់ខាប់ស៊ុលវីញ្ញាណជាគូមានពួឆ្អឹងខ្ពង និងឆ្អឹងកងជាច្រើនពេញលក្ខណៈ និងដាច់ចេញពីគ្នា។ បេះដូងមាន២ថត ១ថតលើ (១ក្រោមដែលមានសរសៃស៊ីនុសវ៉ែន (sinus venosus) និងកូនអាករទែរាងកោណ (conus arteriosus) ជាច្រើនគូមានកោសិកាឈាមក្រហម។ ដកដង្ហើមតាមស្រកី៥ទៅ៧គូមិនមានចង់ខ្យល់ទេ (air bladder)។

សរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាលមាន១០គូ និងសរីរាង្គសោតវិញ្ញាណនីមួយៗមានប្រលាយរាង កន្លះរង្វង់ចំនួន០៣។ សីតុណ្ហភាពរាងកាយរបស់វាមានការប្រែប្រួល (poikilothermous) ។ វាមានភេទ ដាច់ពីគ្នា ជាទូទៅមានក្រពេញភេទជាគូ។



រូបភាពទី៥១ ថ្នាក់ត្រីផ្ទឹងខ្លី


១២.៣.៣ ថ្នាក់ត្រីផ្ទឹងខ្លី Class Osteichthyes (Bony fishes)

ជាទូទៅត្រីមានគ្រោងផ្ទឹងជាផ្ទឹងដែលមានស្រកាពុំទូនៅលើស្បែក។ វាហែលទឹកដោយប្រើ ព្រុយនិងដកដង្ហើមតាមស្រកី។ វាផ្តល់នូវប្រភេទសម្រាប់មនុស្សតាំងពីសម័យបុរាណហើយត្រីប្រភេទ ខ្លះសម្រាប់ជាកីឡាករស្មារតី។




រូបភាពទី៥២ ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹង

- ចរិតលក្ខណៈទូទៅនៃត្រីឆ្អឹង
 - វិស្វកមានក្រពេញវិលជាទូទៅបង្កប់នៅក្នុងស្រកាខ្លះមិនមានស្រកា។ មួយចំនួនតូចមានស្រកាគ្របដណ្តប់ដោយសារធាតុរឹង។ ទាំងព្រុយកណ្តាលនិងព្រុយគូ(លើកលែងខ្លះ) ទ្រទ្រង់ដោយព្រុយគ្មានអវៈយវៈទេ។
 - មាត់មានធ្មេញមានថ្នាំអភិវឌ្ឍន៍បានល្អ ភ្ជាប់ទៅនឹងលលាដ៏ក្បាល។
 - មានភ្នែក២ធំនិងមិនមានគ្របកភ្នែកទេ។ វាមានគ្រោងឆ្អឹង ពីឆ្អឹង ឬឆ្អឹងខ្លី។
 - បេះដូងមាន២ថត(១ថតក្រោម១ថតលើ) ហើយមានផ្ទុកតែឈាមរ៉ែនមានធូរអាអកចំនួន៤គូ មានកោសិកាឈាមក្រហម។
 - ដកដង្ហើមដោយសារស្រកីនិងមានប្លោកខ្យល់(airbladder) ជូនកាលមានបំពង់តភ្ជាប់ទៅដើមក និងស្ម័គ្រចំពោះត្រីមួយចំនួន។
 - មានសរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាលចំនួន១០គូ
 - សីតុណ្ហភាពរាងកាយមាន បម្រែបម្រួល។
 - ជាទូទៅវាមានក្រពេញភេទមួយគូ។ បង្កកំណើតរបស់វានៅក្រៅខ្លួន(លើកប្រភេទត្រីខ្លះ)។
- ចរិតលក្ខណៈពិសេសរបស់ត្រីឆ្អឹង
 - ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមៈប្រព័ន្ធរបត់ឈាមរបស់ត្រីឆ្អឹងមានបេះដូងឈាមនិងសរសៃឈាម។ បេះដូងមាន២ថត គឺថតលើមួយ និងថតក្រោមមួយ។ បេះដូងបានបូមឈាមទៅកាន់ស្រកីរួចវិលត្រឡប់មកបេះដូងវិញ។ ឈាមដែលបូមទៅកាន់ស្រកីផ្ទុកទៅដោយឧស្ម័នកាបូនិក។ វាក្លាយជាអុកស៊ីតកម្មដែលបានពីគ្រប់ផ្នែករាងកាយ។
 - រាងកាយបានប្រើប្រាស់អុកស៊ីសេនពីឈាម ជាហេតុធ្វើឱ្យឈាមផ្ទុកឧស្ម័នកាបូនិកម្តងទៀត រួចត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់បេះដូងវិញ។




The Vascular System of a Fish

Red = Veins - Blue = Arteries
A diagrammatic representation of the main veins and arteries.



រូបភាពទី៥៣ លក្ខណៈពិសេសរបស់ត្រីឆ្អឹង

- ការរំលាយអាហារៈត្រីឆ្អឹងប្រើឆ្អឹងថ្នាមនិង/ឬធ្មេញរបស់វាសម្រាប់ស៊ីអាហារ។ អាហារត្រូវបានធ្លាក់ចូលបំពង់អាហាររួចចូលដល់ក្រពះ។ រសក្រពះអង់ហ្ស៊ីមនិងទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះបានបំបែកអាហារក្រោយមកវាបានទៅកាន់ពោះវៀន។ ទីនេះហើយដែលកន្លែងស្រូបយកជីជាតិ។ ចំណីអាហារដែលមិនអាចបំបែកបានត្រូវបានបញ្ជូនតាមពោះវៀនទៅក្រៅតាមរន្ធបញ្ចេញចោល។



រូបភាពទី៥៤ កាយវិភាគរបស់ត្រីឆ្អឹង

- ការដកដង្ហើមរបស់ត្រី: ទឹកហូរចូលមាត់ពេលត្រីហែលទឹកហើយបើកមាត់។ ទឹកហូរក្នុងទិសដៅបញ្ជ្រាស់ពីចរន្តរបស់ឈាម។ អុកស៊ីសែនដែលមាន នៅក្នុងទឹកត្រូវបានសាយចូលក្នុងឈាមតាមរយៈស្រកី។ ស្រកីកើតឡើងពីសរសៃឈាមតូចៗរាប់ពាន់ស្រកីត្រូវបានគ្របដោយគម្របស្រកី។
- ការបន្តពូជ: ត្រីភាគច្រើនទម្លាក់ស៊ុតទៅក្រៅដែលត្រូវបានបង្កកំណើត (ក្នុងទឹក) នៅខាងក្រៅខ្លួនត្រីខ្លះមានកូនក្នុងពោះ។
- ប្រព័ន្ធខ្សែខាង (Lateral line system): ប្រើសម្រាប់លំញ័រ តម្រង់ទិសរបស់ត្រីក្នុងទឹក។ វាជាខ្សែនៃកោសិការត់ចុះក្រោមនៃត្រី។
- គម្របស្រកី (Operculum): ចលនារបស់គម្របស្រកី ជំរុញទឹកចូលក្នុងមាត់កាន់តែច្រើន ។
- ញោកខ្យល់ (Swim Bladder): ជាថង់ខ្យល់ដែលជួយរក្សាភាពអណ្តែតលើទឹក។ ត្រីធ្លាមមិនមានញោកខ្យល់ទេ។
- ព្រុយវាមាន: ព្រុយខ្នង ព្រុយកន្ទុយ ព្រុយទ្រូង ព្រុយពោះ ព្រុយគូថ។

សំណួរ


- ១. តើចរិកលក្ខណៈពិសេសរបស់ត្រីមានអ្វីខ្លះ? តើសត្វឆ្អឹងថ្នាក់ណាខ្លះដែលគេឱ្យឈ្មោះថាជាត្រីអ្វី?
- ២. ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ត្រីឡាំប្រ៉េ (lampreys) និងហេដហ្វីស (hagfishes) ជាសត្វឆ្អឹងថ្នាក់ទាបបំផុត?
- ៣. ដោយប្រៀបធៀបព្រុយនិងស្រកា តើសាយក្លូសូមខុសពីត្រីឆ្អឹងខ្លីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
- ៤. ចូរពិពណ៌នាពីវដ្តជីវិតរបស់បរាសិតឡាំប្រ៉េ?
- ៥. ចូរគូសតារាងប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នារវាង សាយក្លូសូម ត្រីឆ្អឹងខ្លីនិងត្រីឆ្អឹង?
- ៦. តើត្រីបែល (ray slime ell, chimaera) និងត្រីកើច (perch) ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ណាខ្លះ?

ជំពូកទី១៣

ថ្នាក់បណ្ឌិតសត្វ (Class Amphibians)

សេចក្តីផ្តើម

ពួកវាស់នៅក្នុងទឹកផងនិងលើគោកផង។ ភាគច្រើនវាមានកូនរាងដូចត្រីពេញវ័យវាស់លើដី និងស៊ីសាច់ជាអាហារ។ កូនវាដកដង្ហើមតាមស្រកី។ លុះសត្វពេញវ័យវាដកដង្ហើមតាមសួត។ បង្កកំណើតនៅខាងក្រៅ។ បេះដូងវាមាន៣ថត និងមានរបត់ឈាមបិទ។



រូបភាពទី៥៥ វដ្តជីវិតកង្កែប

១៣.១ បរិកលក្ខណៈទូទៅ

- ស្បែកពពួកទាំងនោះសើម មានក្រពេញ ប៉ុន្តែវាគ្មានស្រកាទេ។
- វាមានអវៈយវៈ២គូ សម្រាប់ដើរ ឬហែលទឹក។ វាមានម្រាមជើង ៤ទៅ៥ ឬតិចជាង (មិនមានអវៈយវៈចំពោះ caecilians, មិនមានជើងក្រោយចំពោះ Sirenidae ភើ) ។
- មានរន្ធច្រមុះ២ ភ្ជាប់ទៅប្រអប់មាត់ ហើយមានកន្លើត សម្រាប់ទប់ទឹកនិងជួយសួតក្នុងការដកដង្ហើម។ ភ្នែកមានត្របក ដែលអាចធ្វើចលនាបាន។ ក្នុងមាត់មានធ្មេញតូចៗ ហើយអណ្តាតអាចលយចេញបាន។
- គ្រោងឆ្អឹង ភាគច្រើនជាឆ្អឹង (skeleton of bone) លលាជីក្បាលមាន២ផ្នែក។ បើវាមានឆ្អឹងជំនី ក៏មិនភ្ជាប់នឹងឆ្អឹងប្រអប់ទ្រូងដែរ។
- បេះដូងចែកចេញជា៣ថតថតលើចំនួន២ថតនិងថតក្រោម១ថត។ កោសិកាឈាមក្រហមមានណឺយ៉ូ និងមានរាងពងក្រពើ។

- ការដកដង្ហើមតាមរយៈស្រកីស្បត់ស្បែកឬតាមមាត់(ដាច់ដោយឡែកឬទាំងអស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា)។ ស្រកីមាននៅក្នុងដំណាក់កាលខ្លះនៃវដ្តជីវិត
- ខួរក្បាលមានសសៃប្រសាទលលាជីក្បាលចំនួន១០គូ ។
- សីតុណ្ហភាពរាងកាយមានការប្រែប្រួល (poikilothermous) ។
- ការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឬក្រៅខ្លួន។ ស៊ុតមានលឿងស៊ុតខ្លះស្រោបដោយសារធាតុអន្លិលៗ(gelatin)។ ការចែកខណ្ឌទាំងស្រុងតែមិនស្មើគ្នាទេនិងមិនមានភ្នាសអំប្រើយ៉ុង។ ជាទូទៅដំណាក់កូនញាស់ (larva) រស់នៅក្នុងទឹកនិងមានបម្រែបម្រួលរហូតពេលពេញវ័យ។

១៣.២ ករណីសិក្សាអំពីសត្វដទៃ

១៣.២.១ លក្ខណៈរូបខាងក្រៅ

ក្បាលនិងដងខ្លួនភ្ជាប់គ្នានិងមានជើង២គូ។រាងកាយទាំងមូលរុំព័ទ្ធដោយស្បែករលោងហើយសើម។ក្បាលវាមានមាត់ធំកាត់ទទឹងសម្រាប់ចាប់ចំណី។វាមានរន្ធច្រមុះតូចៗ២នៅចុងច្រមុះមានភ្នែកមូលធំៗ២ ហើយនៅពីក្រោយភ្នែកនីមួយៗមានក្រដាសត្រចៀកស្តើង១សម្រាប់ទទួលរលកសម្លេង។នៅផ្នែកខាងក្រោយដងខ្លួនមានរន្ធកូអាក់សម្រាប់បញ្ចេញចោលកាកសំណល់ចំណីអាហារទឹកនោមពីតម្រងនោម និងកោសិកាកេទ ពីសរីរាង្គបន្តពូជ។

ជើងមុខ(ដៃ)ខ្លីមានដើមដៃកំកូនដៃប្រអប់ដៃបាតដៃ និងម្រាមចំនួន៤និងមានមេដៃមិនលូតលាស់(vestigial thumb) ។ ចំណែកជើងក្រោយមាន ភ្លៅ កំកូនជើង ភ្នែកគោល និងប្រអប់ជើងវែងនិងម្រាមជើងវែងតូចៗចំនួន៥ ។

មានស្បែកស្តើងនិងមានភាពយឺតរុំព័ទ្ធពាសពេញដងខ្លួនសម្រាប់ការពាររាងកាយ(លើកលែងមេរោគ)ដកដង្ហើមនិងសម្រាប់ស្រូបយកទឹកពីព្រោះសត្វកង្កែបមិនដឹកទឹកទេ។ ក្រពេញស្បែកផលិតសារធាតុបញ្ចេញដែលឆ្លងកាត់ស្រទាប់កោសិកាខាងក្រៅ(epidermis)តាមបំពង់តូចៗ។មានក្រពេញធាតុសើម (mucous) ជាច្រើន បញ្ចេញសារធាតុទឹកគ្មានពណ៌សម្រាប់ជួយធ្វើឱ្យស្បែកសើម ចាំងពន្លឺនិងស្ងួត។

១៣.២.២ ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង

ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹងគឺជាប្រព័ន្ធពិសេសនៃសត្វមានជើង៤ (tetrapods system)ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះសម្រាប់ធ្វើចលនា។ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃកូនញាស់របស់សត្វកង្កែបគ្រោងឆ្អឹងគឺជាឆ្អឹងខ្លីក្រោយមក ភាគច្រើនបានក្លាយជាឆ្អឹងវែង។ចំណែកឆ្អឹងខ្លីបន្តនៅមានផ្នែកខាងចុងនៃអវៈយវៈឆ្អឹងក្បាលនិងឆ្អឹងក្រវ៉ាត់អវៈយវៈ(limb girdle) ។

- Dissected frog:
- 1 Right atrium,
 - 2 Lungs,
 - 3 Aorta,
 - 4 Egg mass,
 - 5 Colon,
 - 6 Left atrium,
 - 7 Ventricle,
 - 8 Stomach,
 - 9 Liver,
 - 10 Gallbladder,
 - 11 Small intestine, 12 Cloaca



រូបភាពទី៥៦ កាយវិភាគកង្កែប

១៣.២.៣ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ

វាខុសពីត្រីសត្វកង្កែបមានការអភិវឌ្ឍសាច់ដុំជើងច្រើនជាង ហើយមានភាពញែកខុសគ្នានៃសាច់ដុំរបស់ខ្លួន (trunk)។ សាច់ដុំនីមួយៗមានភាពខុសគ្នាតាំងពីលើកតំបូងហើយគេអាចស្គាល់វាយ៉ាងច្បាស់ថែមទៀតផង។

១៣.២.៤ ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ


ពេលកង្កែបលេបសត្វតូចៗចូលក្នុងមាត់ វាបានបញ្ចេញជាតិសើមដើម្បីធ្វើអោយមានភាពរំអិល (កង្កែបមិនមានក្រពេញទឹកមាត់ទេ) ដើម្បីឆ្លងកាត់ដើមក ចូលទៅក្នុងបំពង់អាហារដែលខ្លី ។

ក្នុងបំពង់អាហារមានក្រពេញជាខ្សែបញ្ចេញទឹករំលាយអាហារជាតិអាល់កាឡាំង (alkaline digestive fluid) និងមានសាច់ដុំជញ្ជាំងដើម្បីរុញអាហារចូលទៅក្នុងក្រពះជាសរីរាង្គសម្រាប់ផ្ទុកនិងរំលាយអាហារ ។

ក្រពះអាចស្រូបយកជីវជាតិអាហារខ្លះៗប៉ុន្តែចំណីអាហារដែលតូចត្រូវបានបញ្ជូនឆ្លងកាត់សាច់ដុំទ្វារក្រោមក្រពះ (pyloric valve) មានក្រពេញធំៗចំនួន២ គឺថ្លើម និងលំពែងបានបញ្ចេញសារធាតុចូលទៅក្នុងពោះវៀនតូចបន្ថែមលើសារធាតុបញ្ចេញដោយក្រពេញនៃជញ្ជាំងពោះវៀន។ ការស្រូបយកជីវជាតិអាហារប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពោះវៀនតូច។ ចំពោះចំណីអាហារមិនអាចរំលាយត្រូវបានរុញចូលទៅក្នុងពោះវៀនធំដែលនៅទីនោះវាកើតទៅជាលាមក និងត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្រៅតាមរន្ធក្នាមក។

១៣.២.៥ ប្រព័ន្ធឈាមរត់

បេះដូងចែកជាបីថតហើយមាន (១) ថតក្រោម (២) ថតលើខាងឆ្វេងនិងថតលើខាងស្តាំ (៣) ស៊ីនុសរំរែនខាងខ្នងហើយ (៤) មានបំពង់តូចយ៉ាងមាំ (conus arteriosus) ពីបាតថតខាងក្រោម (ventricle) ។ មានប្រើសនៅចន្លោះថតនីមួយៗការពារកុំឱ្យឈាមហូរត្រឡប់មកវិញ។



រូបភាពទី៥៧ ប្រព័ន្ធឈាមរត់កង្កែប

កូនក្អកៈប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់វាដូចគ្នាទៅនឹងត្រី។ បេះដូងមាន២ថត។ បេះដូងបានកន្ត្រាក់បាញ់ឈាមទៅស្រែកីដែលឈាមបានចាប់យកអុកស៊ីសែន និងបញ្ចេញចោលឧស្ម័នកាបូនិក។ ចេញពីសួតឈាមបានរត់ឆ្លងកាត់ជុំវិញរាងកាយរួចបានត្រឡប់មកកាន់បេះដូងវិញ។

កង្កែបពេញវ័យៈកង្កែបពេញវ័យបានបាត់ស្រែកី ដោយជំនួសមកវិញនូវសួតសម្រាប់ដកដង្ហើម។ វាមានបេះដូងចែកជា៣ថតគឺថតលើ២និងថតក្រោម១។ ពេលថតក្រោមចាប់ផ្តើមកន្ត្រាក់ឈាមបានរត់ចូលសួតតាមរយៈ សរសៃឈាម អាកទែរសួត។ ឈាមបានចាប់យកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន និងជម្រុះ ឧស្ម័នកាបូនិក។ បន្ទាប់ចេញពីសួតឈាមបានរត់ឆ្លងកាត់ពាសពេញរាងកាយការរលាយចូលគ្នារវាងសរសៃឈាមទាំងពីរ កើតមានជាអប្បបរិមាដោយសារកាយវិភាគរបស់ថតបេះដូង។

១៣.២.៦ ប្រព័ន្ធជកដង្ហើម

សរីរាង្គដកដង្ហើមមានសួតស្បែកនិងមាត់។ សរីរាង្គទាំងអស់មានក្លាសសើមដែលនៅជាប់សរសៃឈាម។ អុកស៊ីសែនមកពីខ្យល់រលាយនៅក្នុងផ្ទៃសើមរួចបានសាយភាយចូល (diffuse) ក្នុងឈាមដែលឧស្ម័នកាបូនិកឆ្លងកាត់ក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា។ សួតរបស់សត្វកង្កែបគឺជាថង់យឺត (elasticsac)

ចំនួន២ដែលមានថតតូចៗជាច្រើន (alveoli) ។ ថតទាំងនេះមានសរសៃប្តូរឈាមតូចៗនៃសួត (pulmonary capillaries) ។

១៣.២.៧. ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោល

សរីរាង្គបញ្ចេញចោលរបស់សត្វកង្កែបមានតម្រងនោមវែងចំនួន២។ ទឹកនោមត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងតម្រងនោម រួចឆ្លងតាមបំពង់នោម (ureter) ទៅកាន់រន្ធក្នុងក្បាល។ ក្នុងរដូវក្តៅបរិមាណទឹកនោមសត្វកង្កែបប្រចាំថ្ងៃស្មើ១/៣នៃទម្ងន់ខ្លួនរបស់វា។

១២.៣.៨ ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

ខួរក្បាលរបស់សត្វកង្កែបនៅក្នុងខ្សែត្រង់ដែលនៅផ្នែកខាងមុខមានអង្គគោលខួរក្បាលចំនួន២រាងទ្រវែងដែលបញ្ចប់នៅផ្នែកខាងមុខមានកំពកយានវិញ្ញាណ (olfactory lobe) តូចៗ។ ខួរឆ្អឹងខ្នងលាតសន្ធឹងចាប់ពី medulla ទៅ urostyle (ឆ្អឹងឆ្មារៗស្ថិតនៅបាតឆ្អឹងខ្នងរបស់បណ្តុកសត្វ) ។

តួនាទីរបស់ខួរក្បាលត្រូវបានកំណត់ដោយការសិក្សាឥរិយាបថរបស់វា។ កំពកយានវិញ្ញាណដើរតួនាទីចាប់ក្លិន។ អង្គគោលខួរក្បាល គឺជាកន្លែងចងចាំ ភាពវៃឆ្លាត និងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពឆន្ទៈ (voluntary control) ចំពោះសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ តែសត្វកង្កែបមុខងារនេះមិនបង្ហាញច្បាស់លាស់ទេ។

១៣.២.៩ ប្រព័ន្ធបន្តពូជ

ក្រពេញកេទរបស់សត្វកង្កែប ឬអូវែរ ដែលមានចំនួន២ បានតភ្ជាប់ទៅនឹងស៊ីឡូម (coelom) នៅក្បែរតម្រងនោម ដែលមានក្លាសពោះរៀន (mesentery) មួយជួយទ្រក្រពេញកេទនីមួយៗ។ ពេលស្ថិតពេញវ័យក្នុងរដូវបង្កាត់ពូជផ្លូវលីគុល (follicle) បានបែកតាមរយៈរំញោចរបស់អ័រម៉ូនរបស់ក្រពេញកេទ អ៊ីប៉ូក៊ីសស៊ីតបានចាកចេញចូលទៅក្នុងប្រហោងស៊ីឡូម (coelom) ។ វាបានចាកចេញទៅក្រៅតាមបំពង់អូវែល (oviduct) ។

ចំពោះសត្វឈ្មោលមានពងស្វាសតូចៗចំនួន២រាងដូចគ្រាប់សណ្តែកភ្ជាប់ទៅនឹងក្បែរតម្រងនោមដោយមានក្លាសពោះជួយទ្រ។ ពងស្វាសនីមួយៗមានបំពង់ពូជ (semiferous tubules) ។ ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតពេញវ័យត្រូវបានចូលទៅក្នុងបំពង់តូចៗ (efferent ductules) ដែលតភ្ជាប់ទៅបំពង់បង្ហូរទឹកនោមដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខនៃតម្រងនោម។ ក្នុងពេលរួមភេទស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតត្រូវបានបញ្ចេញតាមរន្ធក្នុងក្បាល ដើម្បីបង្កកំណើតជាមួយស៊ីតរបស់សត្វកង្កែប។

១៣.២.១០ ប្រវត្តិធម្មជាតិ និងវដ្តជីវិត

សត្វកង្កែបត្រូវការបរិស្ថានសើមដើម្បីរក្សាសំណើមរបស់ស្បែកវា។ ភាគច្រើនវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងឬក្បែរស្រះ ឬប្រឡាយទឹក។ វាជាសត្វដែលមានឈាមត្រជាក់ (cold-blooded) ឬសត្វប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពដងខ្លួនតាមបម្រែបម្រួលបរិយាកាសខាងក្រៅ។ កង្កែបឈ្មោលចូលចិត្តប្រមូលផ្តុំនៅក្បែរទឹក។ វាស្រែកយំទាក់ទាញសត្វកង្កែបចំពោះសត្វកង្កែបដែលមានស៊ីតពេញវ័យបានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីរួមភេទ


ជាមួយសត្វឈ្មោល។ សត្វឈ្មោលឡើងពាក់សត្វញីពេលកង្កែបញីបញ្ចេញស៊ុត។ កង្កែបឈ្មោលបានបញ្ចេញទឹកកាមដើម្បីបង្កកំណើតជាមួយស៊ុត។ សត្វកង្កែបញីមួយអាចពងបានស៊ុតជាច្រើនរយស៊ុតដែលក្នុងនោះស៊ុតខ្លះមិនបានលូតលាស់ និងត្រូវបានសត្វដទៃស៊ី។

កូនញាស់ (កូនក្អក) ជាច្រើនត្រូវបានសត្វត្រី ពស់ និងអណ្តើក ឬសត្វល្អិតក្នុងទឹកស៊ីជាអាហារ និងខ្លះទៀតបានងាប់ដោយសារទឹកវឹងខ្លះ។ ក្នុងចំណោមស៊ុតដែលបានបញ្ចេញដោយសត្វញីមានតែចំនួនតូចដែលបានលូតលាស់ទៅជាកង្កែបពេញវ័យក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាបរិមាណនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រក្សានិរន្តរភាពសត្វកង្កែប ។

សត្វកង្កែបពេញវ័យនៅអាយុណាមួយ។ កង្កែបឈ្មោលចូលចិត្តប្រមូលផ្តុំនៅក្បែរទឹកនិងស្រែកយំទាក់ទាញសត្វញី។ ចំពោះសត្វញីដែលមានស៊ុតពេញវ័យបានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីរួមភេទជាមួយសត្វឈ្មោល។ សត្វឈ្មោលទំពឹងលើសត្វញី។ ពេលកង្កែបញីទម្លាក់ពងមកក្រៅត្រូវបានកង្កែបឈ្មោលបញ្ចេញទឹកកាមសម្រាប់បង្កកំណើត។

ស៊ុតវាមានក្លាសកើតពីជាតិអិលដូចបាហ្វយព័ទ្ធជុំវិញ។ ស៊ុតបានលូតលាស់ដោយបានធ្វើចំណែកនិងវាក្លាយជាកូនអប្រិយ័ងដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយលឿងស៊ុត។

កូនក្អកចាប់ផ្តើមស៊ីសំណើអាស់ហ្គាហើយវាមានស្រក៏នៅខាងក្រៅ។ ស្បែករបស់កូនក្អកដែលមាន២ស្រទាប់បានដុះពីតំបន់ស្រក៏ខាងក្រៅទឹកចេញក្រៅតាមរន្ធដំណកដង្ហើមចាប់ផ្តើមដុះជើងក្រោយ រួចជើងមុខ។ កន្ទុយបានរួញខ្លី ហើយបម្រែបម្រួលរបស់វាជិតត្រូវបានបញ្ចប់។



រូបភាពទី៥៨ វដ្តបង្កកំណើត

១៣.៣ សាឡាមិនឌើ (Salamanders: លំដាប់ Caudata)

- វាមានដងខ្លួនវែង និងមានកន្ទុយ។
- ខណៈពេលពេញវ័យវាជាសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ ។
- ជាទូទៅវាស់នៅក្នុងព្រៃសើម។
- វាចូលក្នុងទឹកខណៈពេលដែលរួមភេទ។



រូបភាពទី៥៩ សាឡាមិនឌើ

សំណួរ

- ១. តើបណ្តុកសត្វដកដង្ហើមយ៉ាងដូចម្តេច ?
- ២. ប្រៀបធៀបបេះដូងនិងរត់ឈាមរបស់កូនក្អកនិងកង្កែបពេញវ័យ ?
- ៣. ចូរពិពណ៌នាអំពីការបម្រែបម្រួលរបស់សត្វកង្កែប ?
- ៤. ចូររៀបរាប់ពីទម្រង់ និងមុខងាររាងស្បែករបស់សត្វកង្កែប ?
- ៥. តើបណ្តុកសត្វណាមិនមានជើង ហើយខ្លួនវាមានស្រកាដូចត្រី ?

ជំពូកទី១៤

ថ្នាក់លូន (Class reptile)

សេចក្តីផ្តើម

សត្វលូនដែលបានលើកមកសិក្សាមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

- បង្គុយ ថ្លែន (lizard) និងពស់ ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ Squamata,
- អណ្តើកស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ Chelonia,
- ក្រពើ ក្រពារ ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ Crocodilia, និង
- New Zealandtuatara (Sphenodon punctatum) ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ Rhychocephalia។

លំដាប់ទាំងបួនខាងលើនេះតំណាងឱ្យលំដាប់ទាំង១៤ដែលគេបានស្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនក្នុងសម័យមេសូស្យូអ៊ិក (Mesozoic time) ដែលជាយុគសម័យសត្វលូន។


លូនជាសត្វដំបូងគេក្នុងចំណោមសត្វឆ្អឹងកងដែលបានបន្ស៊ាំជីវិតក្នុងកន្លែងស្ងួតលើដី។ ស្បែកនិងស្រកាស្ងួតទប់ទល់ការបាត់បង់សំណើមពីរាងកាយនិងជួយសម្រួលការរស់នៅលើផ្ទៃដី។ ការដាក់ឈ្មោះគឺតាមរបៀបការធ្វើដំណើររបស់វា (L.reptum= creep = លូនឬរាវ)។



រូបភាពទី៦០ ថ្នាក់លូន

១៤.១ ចរិតលក្ខណៈសត្វល្អិត

- ដងខ្លួនគ្របដណ្តប់ដោយស្បែកស្ងួតរាងបន្លា(cornified skin)ជាធម្មតាមានស្រកា(scale or scutes)និងមានក្រពេញពីរបី។
- វាមានអវៈយវៈ២គូ។ អវៈយវៈនីមួយៗមានម្រាម៥ ដែលនៅចុងម្រាមមានក្រចកឬក្រញាំសម្រាប់រត់ លូន វារឬ ឡើងសត្វថ្លៃនមួយចំនួនមិនមានជើងទេតែចំពោះសត្វពស់ និង(។
- គ្រោងឆ្អឹងកើតឡើងពីឆ្អឹងពេញលក្ខណៈ។លលាដ៏ក្បាលរបស់មានឆ្អឹងគន្លាក់ក(occipital condyle)
- ដំណកដង្ហើមតាមស្នូត សត្វអណ្តើកទឹកដកដង្ហើមតាមរន្ធក្នាត។
- វាមានសរសៃប្រសាទខ្លួនរក្បាលចំនួន១២គូ។
- បេះដូងមាន៤ថតមិនច្បាស់លាស់គឺថតលើ២ថតនិងថតក្រោមដែលផ្នែកខ្លះចែកជាពីរ។ មាន ធុរអាអក១គូគោលិកាលាមក្រហមមានឈ្នួលយ៉ូដែលមានរាងប៉ោងសង្វាង និងរាងពងក្រពើ។
- សីតុណ្ហភាពរាងកាយប្រែប្រួល(ectothermal or poikilothermal)។



រូបភាពទី១១ ប្រព័ន្ធលាមតរបស់សត្វល្អិត

ការបង្កកំណើតខាងក្នុងជាទូទៅតាមរយៈសរីរាង្គពាក់គ្នា (copulatory organ) ស៊ុតធំហើយមានល្បឿនស៊ុតច្រើនមានសំបកដូច ស្បែកឬជាតិកំបោរជាទូទៅវាទម្លាក់ពងចេញក្រៅលើកលែងសត្វថ្លៃននិងសត្វពស់មួយចំនួន។


ការធ្វើចំណែកភាគខ្លះ:(cleavage meroblastic)។ ភ្នាសអំប្រើយ៉ុងមា Samnion, chorion, yolk

sac and allantoid។ កូនទើបញ្ចាស់ឬកើតចេញ មានរាងដូចសត្វពេញវ័យ ពោលគឺវាមិនបម្រែបម្រួលទេ។ លូនបង្ហាញនូវភាពជឿនលឿនជាងបណ្តុកសត្វដោយសារវាមាន៖

- (១)ស្រកាស្នូត
- (២)មានអវៈយវៈសម្រាប់បំលាស់ទី
- (៣)អុកស៊ីតកម្ម និងមិនអុកស៊ីតកម្ម ឈាមព្រែកដាច់ពីគ្នាក្នុងបេះដូង
- (៤)គ្រោងឆ្អឹងមានឆ្អឹងពេញលេញ
- (៥)ស៊ីតសមស្របសម្រាប់ការលូតលាស់លើដីដែលមានក្លាសនិងសំបកការពារអំប្រើយ៉ុងផង។

១៤.២ ករណីសិក្សា សត្វក្រពើ (Alligator)

ដងខ្លួនចែកចេញជាក្បាលកត្តខ្លួន (trunk) និងកន្ទុយ។ មានអវៈយវៈចំនួន៤ដែលមានម្រាមជើង និងក្រញ៉ាំ និងមានសន្ទះរាងម្រាមនីមួយៗ។ មាត់វែងដែលមានធ្មេញរាងដូចសាជីនិងមានរន្ធច្រមុះតូចៗចំនួន២។ ភ្នែកធំៗចំនួន២ហើយមានត្របកភ្នែកលើនិងក្រោមនិងត្របកភ្នែកទី៣ដែលថ្លាហើយបើកបញ្ជ្រាស់នៅខាងក្នុងត្របកភ្នែក។ មានរន្ធត្រចៀកតូចៗស្ថិតនៅពីក្រោយភ្នែក។ ស្បែករឹង (leathery skin) មានស្រកាភាវងចតុកោណនៅពាសពេញខ្លួននិងកន្ទុយ។ វាមិនសកទេតែស្រកាដែលស៊ីករិចរិល បានជំនួសដោយស្រទាប់ដែលនៅពីខាងក្រោម។



រូបភាពទី៦២ កាយវិភាគសត្វក្រពើ

១៤.២.១ គ្រោងឆ្អឹង

ឆ្អឹងថ្នាំមក្រោមជាប់គ្នាជាមួយម្ខាងៗនៃតែមខាងក្រោយរបស់ឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលដោយសន្លាក់។ ពួកឆ្អឹងខ្នង (vertebral column) រួមបញ្ចូលឆ្អឹងកង៥ប្រភេទមានដូចខាងក្រោម៖
-ឆ្អឹងកងក (cervical) មានចំនួន៩



រូបភាពទី៦៣ លក្ខណៈទូទៅសត្វថ្លែន

ស្បែកមានភាពយឺតអាចបត់បែនបាន ហើយមានស្រកាតម្រៀបជាជួរ តាមបណ្តោយ ឬកាត់ទទឹងបញ្ជិត ស្រទាប់ស្នូកខ្លះដូច (ដូចខ្សែអង្កត់ទ្រូង) ខ្លះរលោង។

វាមានអណ្តាតដែលចល័ត ឬលៀនបានតិចតួច សម្រាប់ចាប់ចំណីដូចជាសត្វល្អិតជាដើម។

ឆ្អឹងថ្នាមមានធ្មេញតូចៗ។ សត្វថ្លែនមានប្លោកនោម ប៉ុន្តែកាកសំណល់ (ទន់ជ្រាយពណ៌ស) ត្រូវបានបញ្ចេញចោលមកក្រៅដូចសត្វបក្សី និងល្អិតភាគច្រើនដែរ គឺតាមក្បូរក្បាច់។

សត្វឈ្មោល មានប្រដាប់ភេទឈ្មោលចំនួន២នៅបាតកន្ទុយ ខណៈពេលរួមភេទ វាលៀនចេញ ១ ឬទាំង២។

១៤.៤ អំពីពស់

ការបាត់អវៈយវៈឬខ្នងនិងការលូតវែងនៃដងខ្លួនបានកើតមានឡើងស្របគ្នាជាមួយការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងក្រុមជាច្រើននៃសត្វឆ្អឹងកង រួមទាំងអន្ទង់ និងត្រីរាងដូចអន្ទង់ផ្សេងទៀត។

តំណែលនៃឆ្អឹងក្រវ៉ាត់ត្រកៀក (pelvic girdle) និងអវៈយវៈក្រោយនៅមានចំពោះពស់ថ្លាន់និងពស់មួយចំនួនទៀត។ ពស់គ្មានឆ្អឹងក្រវ៉ាត់អវៈយវៈ ឆ្អឹងទ្រូងត្របកភ្នែក ត្រចៀកនិងប្លោកនោមទេ។ ស្បែកមានស្រកាជាជួរ ជួនកាលរលោង ឬបន្ទះៗដូចជាពស់មានពិសម្យ៉ាង (rattle snake) ។


ភ្នែកត្របដោយស្បែកថ្លា (transparent cuticle) និងមិនមានក្លាសត្រចៀកផ្នែកខាងក្រៅទេ។



រូបភាពទី៦៤ លក្ខណៈទូទៅសត្វពស់

ជំពូកទី១៥ ថ្នាក់បក្សី (Class Aves: birds)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



រូបភាពទី១៥ លក្ខណៈទូទៅរបស់ថ្នាក់បក្សី


១៥.១ បរិកលក្ខណៈ:

- ខ្លួនបក្សីគ្របដណ្តប់ ដោយរោមនិងមានស្នាមសីតុណ្ហភាពខ្លួនបានធ្វើនិយតកម្មខាងក្នុង (homiothermal orendothermal) ។
- អវៈយវៈទាំង៤បានបំផ្លែងទៅជាស្នាមសម្រាប់ហើរនិងជើងក្រោយសម្រាប់ទំងើរនិងហែលទឹក។ ចាប់ពីក្បាលដង្កង់ដល់ម្រាមជើងគ្របដណ្តប់ដោយជាតិស្នែង។
- មាត់បក្សីមានចំពុះមាន និងស្រោបជាតិស្នែងមិនមានធ្មេញទេ។ ផ្តឹងលលាដ៏ក្បាលមានគន្លាក់ផ្តឹង ក (occipital condyle) ។ ក អាចបត់បែនបាន ហើយជាទូទៅវែង។




រូបភាពទី៦៦ លក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វបក្សី

- បេះដូងមាន៤ថត(ថតលើ២និងថតក្រោម២)មានតែឆ្នូរអាអកខាងស្តាំ។សួតតូចភ្ជាប់ទៅ ផ្ទឹងជំនីនិងថង់ខ្យល់ដែលមានជញ្ជាំងស្មើនៅចន្លោះសរីរាង្គក្នុង។ ប្រអប់សម្លេងស្ថិតនៅ គល់បំពង់ខ្យល់(windpipe) ។
- ពពួកបក្សីមិនមានប្លោកនោមទេ។
- លាមកមានសន្ទានពាក់កណ្តាលរាវ(semi-fluid) ។
- ជាធម្មតាមានអូវែតខាងឆ្វេង និងបំពង់អូវុលតែប៉ុណ្ណោះ។ ការបង្កកំណើតនៅខាងក្នុង ស្ថិតមានល្បឿនស្ថិតច្រើន និងមានសំបកជាតិកំបោរ។ វាទម្លាក់ស្ថិត និងក្រាបភ្លាស់ ។



a. រូបភាពទី៦៧ ប្រព័ន្ធលាមតំរបស់សត្វបក្សី



b.

- a. Deoxygenated blood from body is pumped through the heart and to lungs
- b. Oxygenated blood is returned to heart to be pumped to rest of the body (where it gives up O2)

១៥.២ ករណីសិក្សាមគ្រីស្រុក (Domestic Fowl)


១៥.២.១ ចរិតលក្ខណៈខាងក្រៅ

មានស្រុកមានក្បាលវែងហើយបត់បែនបាននិងខ្លួនមាំ។ ស្លាបភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកខ្នងមានរោមស្លាបវែងវាបត់បានរាងអក្សរZ។ ជើងក្រោយនីមួយៗមានសាច់ដុំជាផ្នែកៗចំនួន២គឺភ្លៅនិងកំកូនជើង។ កន្ទុយមានរោមស្លាបវែង។ មាត់របស់វាមានចំពុះ។ លើផ្ទៃក្រោមមាន រន្ធដូចរន្ធច្រមុះ ភ្នែកធំនៅសង្វាងនិងមានត្របកភ្នែកលើ និងក្រោម និងមានត្របកភ្នែកទី៣។

វាគ្របដណ្តប់ដងខ្លួនវាដោយស្បែកដែលភ្ជាប់ទ្រសាច់ដុំធ្ងរលុងមានសភាពស្ងួតនិងមិនមានក្រពេញទេ លើកលែងនៅគល់កន្ទុយផ្នែកខាងលើ។ វាមានរោមស្លាបជាច្រើន និងស្តើងៗ។

១៥.២.២ គ្រោងឆ្អឹង


ឆ្អឹងទន់ភាគច្រើនមានប្រហោងក្នុងដើម្បីសម្រាលទម្ងន់។ លលាជីក្បាលវែងដែលមានប្រអប់ខ្នុរក្បាលធំ និងគន្លងសម្រាប់ភ្នែក។ ឆ្អឹងក្រោមដែលគ្មានធ្មេញបង្កើតបានជាចំពុះស្រួច មានស្រោបជាតិស្នែង។ កមានឆ្អឹងកងចំនួន១៦។ តួខ្លួនមានឆ្អឹងកងភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងជិតហើយឆ្អឹងកងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្នងខាងក្រោមរលាយភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្អឹងក្រវាត់ត្រគៀក។ វាមានឆ្អឹងកងកន្ទុយតូចៗ២-៣សម្រាប់ទ្រស្លាបកន្ទុយ។



រូបភាពទី១៨ ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹងរបស់សត្វបក្សី

១៥.២.៣ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ

សត្វផ្លឹងកងថ្នាក់ទាបភាគច្រើនណែកសាច់ដុំមានច្រើនក៏ ប៉ុន្តែសម្រាប់បក្សីនិងថនិកសត្វមានសាច់ដុំជើងធំសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនលឿន។ មាន និងមានបារាំងមានសាច់ពណ៌ស។ ភាគច្រើននៃដងខ្លួនជាសាច់ដុំសម្រាប់ហើរ។ សាច់ដុំជាប់ស្អិត (drum stick) ជាសាច់ដុំសម្រាប់រត់ និងទំ។




រូបភាពទី១៩ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំរបស់សត្វបក្សី

១៥.២.៤ ប្រព័ន្ធនិរន្តរណៈអាហារ

អណ្តាតតូចស្រួចចុងមានស្រោបជាតិស្នែង។ វាស្ថិតនៅក្នុងចំពុះក្រោមនៅខាងមុខបំពង់កខ្លី។ បំពង់អាហារវែង រីកធំនៅផ្នែកខាងក្រោមត្រង់គែរ ជាកន្លែងរក្សាចំណីទុក និងឆ្លើម។ ក្រពះរួមមានថង់ក្រពះ (proventriculus) សម្រាប់បញ្ចេញសក្រពះនិងកោះ (gizzard or ventriculus) សម្រាប់កិនអាហារ។ ពោះរៀនរាងស្មើនិងរាងរង្វលក្លាប់ទៅរន្ធតូចនិងមានរន្ធកូអាក់ធំ។ ចំណីអាហារត្រូវបានកិន


បំបែកនៅក្នុងកោះដោយសារសកម្មភាពជញ្ជាំងសាច់ដុំ និងមានជំនួយពីគ្រាប់គ្រួសដែលវាលេបចូលដោយចេតនា។ ថ្លើមមាន២ផ្នែក៖ មានថង់ទឹកប្រមាត់មួយ (gall bladder) និងបំពង់ទឹកប្រមាត់០២ រីឯលំពែងដែលមានបំពង់០៣ភ្ជាប់ទៅនឹងពោះវៀន ។



រូបភាពទី៧០ ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

១៥.២.៥ ប្រព័ន្ធលាមាមរត់


បេះដូងមាន៤ថតថតលើ២ និងថតក្រោម២ដែលចែកដាច់រវាងឈាមដែលសំបូរអុកស៊ីសែន (oxygenated) និងខ្យត់អុកស៊ីសែន(unoxygenated)។ ឈាមរ៉ែនដែលរត់នៅក្នុងខ្លួនចូលថតលើស្តាំឆ្លងកាត់ថតក្រោមស្តាំរួចប៊ីតចេញពីទីនោះទៅកាន់សួតដើម្បីចាប់យកអុកស៊ីសែន។ វាចេញពីសួតត្រឡប់មកថតលើឆ្វេងរួចទៅកាន់ថតក្រោមឆ្វេងនិងចេញទៅពីបេះដូងតាមធ្នូអាអកខាងស្តាំទៅកាន់រាងកាយ។



រូបភាពទី៧១ លក្ខណៈទូទៅរបេះដូងបក្សី

១៥.២.៦ ប្រព័ន្ធជកជង្គឹម

- រន្ធច្រមុះស្ថិតនៅលើជំពុះភ្ជាប់ទៅរន្ធច្រមុះខាងក្នុង (internalnares) ដែលស្ថិតនៅពីលើមាត់ ។
- រន្ធខ្យល់ នៅបាតដើមកភ្ជាប់បំពង់ខ្យល់រាងវែងហើយបត់បែនបាន
- ប្រអប់សម្លេង ស្ថិតនៅបាតនៃបំពង់ខ្យល់ ផ្ទុកសាច់ដុំបំពង់សម្លេង។
- ទងស្នូតបានភ្ជាប់ប្រអប់សម្លេងទៅស្នូតនីមួយៗ ។
- ចលនានៃសាច់ដុំរបស់ឆ្អឹងជំនីបផ្ដើមកម្លាំងរុញខ្យល់ចេញនិងចូល។




រូបភាពទី៧២ ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម

១៥.២.៧ ប្រព័ន្ធបន្តពូជ

បក្សីឈ្មោលមានពងស្វាស២និងបំពង់ដឹកនាំស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត(ductus deferens)។ ពងស្វាស រីកធំក្នុងរដូវបន្តពូជ។ ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតក្នុងថង់ទឹកកាយត្រូវបានបញ្ជូលទៅក្នុងកូអាក់របស់បក្សីមេក្នុងពេល ពាក់គ្នា។ ប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់បក្សីមេលូតលាស់តែផ្នែកខាងឆ្វេង ប៉ុន្តែផ្នែកខាងស្តាំអាចដំណើរការឡើង វិញបើសិនគេកាត់ខាងឆ្វេងចេញ។ អូវុស៊ីតនៅក្បែរតម្រងនោម ដឹកនាំអូវុលពេញវ័យទៅបំពង់អូវុលរួច ទៅកូអាក់។ ជាធម្មតា អូវុស៊ីតបំពង់អូវុលតូច តែក្នុងរដូវបន្តពូជវារីកធំ ដោយវាមានអូវុលច្រើន។

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



រូបភាពទី៧៣ ប្រព័ន្ធបន្តពូជ

១៥.២.៨ ប្រព័ន្ធសរីរាង្គផ្សេងទៀត

- ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោល:មានតម្រងនោម២ និងបំពង់ទឹកនោម២ដែលដឹកនាំកាកសំណល់ពាក់កណ្តាលរាវទៅក្នុងអាត់។ បក្សីមិនមានបញ្ជូននោមទេ។
- ប្រព័ន្ធប្រសាទ:មានខួរក្បាលដែលធំជាងពពួកបណ្តុកសត្វនិងល្អន។ ឃានវិញ្ញាណខ្សោយតែវាមានចង់អុបទឹកធំៗពួកវាមានភ្នែកធំដែលមើលឃើញច្បាស់ (sharp vision) និងមានសមត្ថភាពបែងចែកពណ៌យ៉ាងច្បាស់។
- ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន: មានក្រពេញក៏ជូធារី (pituitary gland) នៅបាតនៃខួរក្បាល ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត ស្ថិតនៅផ្នែកក្រោមនៃក islets of Langerhans ក្នុងលំពែង និង paired adrenal ventral នៅលើតម្រងនោម ។

១៥.៣ បក្សីតំណាងប្រទេសកម្ពុជា

សត្វត្រយងយក្ស (Giant Ibis) មានឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រ *Thaumatibis gigantea* ។ ត្រយងយក្សជាសត្វស្លាបមួយប្រភេទដែលរស់នៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង។ បក្សីប្រភេទនេះត្រូវបានគេចាត់ចូលជាសត្វដែលកម្រនិងងាយរងគ្រោះផុតពូជនៅលើពិភពលោក។ សព្វថ្ងៃនេះគេឃើញមានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុនេះហើយទើបត្រយងយក្សជាសត្វស្លាបតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជា។




រូបភាពទី៧៤ សត្វត្រយងតំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជា

សំណួរ

- ១-តើចរិតលក្ខណៈពិសេសរបស់បក្សីមានអ្វីខ្លះដែលមានចរិតលក្ខណៈទាំងនេះ ថ្មីមិនដែលមានចំពោះសត្វផ្សេងកងថ្នាក់ទាបជាង ?
- ២-ចូរពិពណ៌នាចរិតលក្ខណៈពិសេសនៃគ្រោងផ្លែឈើរបស់បក្សី ?
- ៣-តើមេកានិកអ្វីដែលដើរតួនាទីកិនអាហាររបស់បក្សី ?
- ៤-ចូរពិពណ៌នាចរិតលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រព័ន្ធដកដង្ហើមរបស់បក្សីតើស្នូតរបស់បក្សីខុសពីសត្វផ្សេងកងដទៃទៀតយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ?
- ៥-តើបក្សីវិវត្តន៍ចេញពីក្រុមសត្វផ្សេងកងណា ? តើបក្សីក្នុងសម័យមេសូស្យូអ៊ីចមានចរិតលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលមិនឃើញមានក្នុងបក្សីសម័យក្រោយមកទៀត ?

ជំពូកទី១៦ ថ្នាក់ថតិកសត្វ (Class mammals)



រូបភាពទី៧៥ សាខាថ្នាក់ថតិកសត្វ

១៦.១. តើថតិកសត្វជាអ្វី?

១៦.១.១ លំនាំដើម

គេចែកថតិកសត្វទៅតាមប្រភេទចំណីអាហារដែលពួកវាស៊ីមានដូចខាងក្រោម៖

- សត្វកកែវ (rodents) រួមមាន កណ្តុរ កាំប្រម៉ា។
- សត្វតិណាសី (herbivorous) សត្វស៊ីស្មៅជាអាហាររួមមាន គោ ក្របី សេះ ចៀម។
- សត្វសព្វាសី (omnivorous mammals) សត្វស៊ីសាច់និងរុក្ខជាតិជាអាហាររួមមាន ខ្លា ឃ្មុំ ជ្រូក និងមនុស្ស។
- មំសាសី (carnivorous) សត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ រួមមាន ខ្លា ឆ្កែ ឆ្កែទឹក និងត្រីបាឡែនខ្លះ។
- សត្វស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារ (insectivorous) រួមមានប្រចៀវ កំពឹងដូង
- សត្វស៊ីផ្លែឈើជាអាហារ (frugivorous) មាន ប្រចៀវ ជ្រើង និងស្វា។

១៦.១.២ មរិកលក្ខណៈ:


- វាមានរោមគ្របដណ្តប់ដងខ្លួន (ខ្លះរង្វើល) ម្តងម្កាលជ្រុះរោមចាស់និងដុះរោមថ្មី។ ស្បែករបស់វាមានក្រពេញជាច្រើនដូចជាក្រពេញផលិតជាតិប្រេងពេញញើសនិងក្រពេញទឹកដោះ។
- ធ្នឹងលលាដ៍ក្បាលមានធ្នឹងកំពកខាងក្រោយចំនួន២ (occipital condyles) ធ្នឹងកងកំចំនួន៧។ វាមានកន្ទុយវែង និងកម្រើកបាន។

- តំបន់ច្រមុះ ជាទូទៅរាងស្មើឆ្មឹងថ្នាមមានធ្មេញ ជាច្រើនប្រភេទនិងខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទចំណី។ ភ្នែកមានត្របកអាចធ្វើចលនាបាន ត្រចៀកមានស្លឹកត្រចៀក ។



រូបភាពទី៧៦ សត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ

- មានអវៈយវៈ៤ (ត្រីបារ៉ាឡនិងភេសមុទ្រមិនមានជើងក្រោយ) ដែលជើងនីមួយៗមានម្រាម៥ (ឬតិចជាង) សម្រាប់ដើរ រត់ ឡើង ចោះរូង ហែលទឹក ឬហើរ។ ក្រចកជើងមានក្រញាំវីងមាំ ឬមុតស្រួច ។
- បេះដូងមាន៤ថត (ថតលើ២ និងថតក្រោម២) មានធូរអាអកឆ្វេងនៅសល់។ កោសិកាឈាមក្រហមដែលមិនមានណ្ឌូយ៉ូ និងជាទូទៅរាងរង្វង់។
- ដកដង្ហើមតាមរយៈស្មូតមានប្រអប់សម្លេងនិងមានសាច់ដុំសន្ទះទ្រូងខណ្ឌចែកស្មូតនិងបេះដូងពីប្រហោងពោះ។មានប្លោកនោមបញ្ចេញនោម។
- វាមានសរសៃប្រសាទលលាដ៏ក្បាលចំនួន១២គូ។ ខួរក្បាលរបស់ពួកវាមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ទាំងខួរក្បាលផ្នែកធំ (cerebrum) និងខួរក្បាលនៅផ្នែកខាងក្រោម (cerebellum) ។
- សីតុណ្ហភាពខ្លួនបានធ្វើនិយតកម្ម (homeothermal or endothermal) ។
- សត្វឈ្មោលមានលីង្គ។ការបង្កកំណើតនៅខាងក្នុង។អូវុលតូចៗនិងមិនមានសំបកត្រូវបានរក្សាទុក នៅក្នុងស្បូនសត្វញីសម្រាប់ការលូតលាស់មានក្លាសអំប្រើយ៉ុងមានសុកនិងកូនចិញ្ចឹមខ្លួនដោយទឹកដោះដែលចេញពីក្រពេញទឹកដោះរបស់សត្វមេ។



រូបភាពទី៧៧ ប្រព័ន្ធលាមាមត់

១៦.២. ករណីសិក្សាសត្វស្រុក (Domestic Cat)

១៦.២.១ ចរិតលក្ខណៈខាងក្រៅ

ដងខ្លួនទាំងមូលគ្របដណ្តប់ដោយរោមក្រាស់ ក្បាលរាងមូល កខ្ចី ដងខ្លួនតូចនិងវែង កន្ទុយវែង និងបត់បែនបាន។ ជើងមានបួនជើងមុខ២និងជើងមួយៗមានម្រាម៥មានបន្ទះសាច់បាតជើង (fleshy pad) និងមានក្រញាំរាងកោងនិងអាចពន្លឺលចូលបាន (curved retractile claw)។ ជើងក្រោយមាំជាងជើងមុខ មានម្រាម៤ និងក្រញាំវែងមាំដូចគ្នា។

រន្ធប្រមុះ២តូចៗស្ថិតនៅខាងក្រោមចុងប្រមុះនិងមាត់មានបបូរមាត់។ ភ្នែកនីមួយៗមានត្របកភ្នែក២និងមានរោមភ្នែក (eyelash) និងមានត្របកភ្នែកទី៣ (nictitating membrane) ស្ថិតនៅពីខាងក្រោមត្របកភ្នែកទាំង២។ នៅមុំភ្នែកនិងប្រមុះមានរោមវែងៗសម្រាប់ទទួលវិញ្ញាណ។ វាមានស្លឹកត្រចៀកនៅពីក្រោយភ្នែកដែលត្រចៀកនីមួយៗមានរន្ធសម្លេងចូលទៅក្នុងក្បាល។ ដងខ្លួនមានទ្រូង (chest/thorax) ពោះធំស្ថិតនៅខាងក្រោយនិងមានក្បាលដោះ៤ឬ៥គូចំពោះឆ្មាញី។ រន្ធបញ្ចេញចោលបើកនៅខាងក្រោមកន្ទុយ។ ចំពោះឆ្មាឈ្មោលវិញមានពងស្វាស២ស្ថិតនៅក្នុងចងពងស្វាស (scrotum) ដែលព្យួរពីក្រោមរន្ធតូច។




រូបភាពទី៧៨ ឆ្មាស្រុក

១៦.២.២ ចរិតលក្ខណៈខាងក្នុង

* ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង

គ្រោងឆ្អឹងភាគច្រើនកើតពីឆ្អឹងរឹងលើកលែងផ្ទៃសន្លាក់ដែលកើតពីឆ្អឹងខ្ចី និងស្ថិតលើផ្នែកនៃឆ្អឹងជំនី។ ឆ្អឹងលលាដ៏ក្បាលរាងមូលគឺដូចជាប្រអប់រឹងមួយឆ្អឹងទាំងអស់ភ្ជាប់គ្នាដោយថ្នើរ (sutures) ។ នៅលើមុខមានន្ទប្រមុះ និងគន្លងភ្នែក។ នៅផ្នែកខាងៗមានក្រអូម (palate) ដែលនៅតែមៗនោះមានធ្មេញ។




រូបភាពទី៧៨ ប្រព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹងឆ្មា

* ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ

ថនិកសត្វមានសាច់ដុំជាផ្នែកៗ លើឆ្អឹងកងនិងឆ្អឹងជំនីតិចជាងពពួកសត្វឆ្អឹងកងថ្នាក់ទាបតែមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងចំពោះសាច់ដុំលើក្បាលកនិងអវៈយវៈ។ ឆ្មាមានសាច់ដុំលើមុខដែលអាចឱ្យវាបង្ហាញនូវការរំភើបដូចជាខឹង ស្អប់ ភ័យ ព្រួយជាដើម។ ចរិតលក្ខណៈពិសេសរបស់ថនិកសត្វ គឺមាន


សន្ទះទ្រូង (diaphragm) រាងជាក្រឡមមូល (dome) ដែលចែកខ័ណ្ឌប្រហោងខ្លួន (coelom) ខាមុខជាប្រហោងទ្រូង (thoracic cavity) សម្រាប់ដាក់បេះដូងនិងសួតនិងប្រហោងពោះសម្រាប់សរីរាង្គផ្សេងៗទៀត។




រូបភាពទី៧៩ ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ

* ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម

ខ្យល់ដែលចូលតាមរន្ធច្រមុះត្រូវបានកម្ដៅ និងសម្អាតដោយភ្នាសអេពីតេលូរ៉ូមសើម (mucous epithelium) ដែលស្ថិតនៅលើផ្ចិតរាងសាដីបញ្ជាស់ (turbinate bone) រួចឆ្លងកាត់បំពង់កចូលទៅក្នុងរន្ធបំពង់ខ្យល់ (glottis) ដែលស្ថិតនៅពីមុខប្រអប់សម្លេង (larynx) ។ បន្ទាប់មកវាបានឆ្លងកាត់បំពង់ខ្យល់ដែលនៅផ្នែកទ្រូងវាបានចែកចេញទងសួតជាពីរ (bronchi) បន្ទាប់មកបានចូលទៅដល់សួត។ សួតជាសរីរាង្គដូចស្កុង (Sponge) និងមានភាពយឺត។




រូបភាពទី៨០ ប្រព័ន្ធដកដង្ហើម



រូបភាពទី៨១ ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោល

* ប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោល

តម្រងនោម២ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចង្កេះ (lumbar region) នៅលើភ្នាសពោះ(peritoneum) ។ ទឹកនោមបានឆ្លងកាត់ពីតម្រងនោម ចូលបំពង់បង្ហូរនោម (ureter) រួចរក្សាទុកនៅក្នុងប្លោកនោម (bladder)។ ទឹកនោមត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅ តាមរយៈការកន្ត្រាក់របស់ប្លោកនោម។



រូបភាពទី៨២ កាយវិភាគស្រុក

ឯកសារយោង

សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត កងក្រឹស្នា: មេរៀនសត្វវិទ្យា

ហូ ប៊ុនយេត(២០១៥): មេរៀនសត្វវិទ្យា

E.J.L. SOULBLY(1968). Helminths, Arthropodes and Protozoa of Domesticated Animals.

Miller Harley (2005). Zoology, Sixth Edition.

Tracy I. Storer L. Usinger, Jame W. Nybakken (1955 1961, 1968). Elements of Zoology.