



**សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
បរិមាណវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ**

**សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ
ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ**

**Basic Of Pathology
IN VETERINARY MEDICINE**

លោក ហ៊ិន ហៀក



២០២១

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ



សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ

BASIC OF PATHOLOGY
IN VETERINARY MEDICINE

ហ៊ិនហៀក

វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ

២០២១

ក្សេមសិទ្ធិ

© ឆ្នាំ ២០២១

ក្សេមសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃសៀវភៅនេះ អាចចម្លងចម្លងនិងផលិតឡើងវិញ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកនិពន្ធនិងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មឡើយ។

បោះពុម្ពលើកទី១

ដោយមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ (ស.គ.ន) នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

អ្នកនិពន្ធ៖ លោក ហ៊ិន ហៀក

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ១២ ៩៦៤ ៦០៩

អ៊ីមែល៖ hunhieak@gmail.com

© . Mr. HUN Hieak, 2021. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any process without the prior written permission from the author and the Royal University of Agriculture.

First Edition

Printed by the Research Creativity and Innovation Fund (RCI Fund) of Ministry of Education, Youth and Sport, the Kingdom of Cambodia

Enquiries about the book:

Author: Mr. HUN HIEAK

Mobile phone: +855 12 964609



សាកលវិទ្យាល័យតូមិនកសិកម្ម

ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះទៅអ្នកនឹងអាច៖

- កំណត់សញ្ញាណរោគសាស្ត្រនៃជំងឺជាក់លាក់និងការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធសរីរាង្គក្នុងសាពាង្គកាយសត្វច្បាស់លាស់
- បញ្ជាក់ពីបុព្វហេតុនៃការវិវឌ្ឍន៍ស្លាកស្នាមរោគសាស្ត្រសត្វបានត្រឹមត្រូវ
- អនុវត្តន៍វិធីសាស្ត្ររោគសាស្ត្រសត្វក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលផ្ដោតលើស្លាកស្នាមនិងការប្រែប្រួលជាលិកាសរីរាង្គសត្វបានស្មាត់ជំនាញ



ឧទ្ទិសកថា

ទូលបង្គំ ខ្ញុំបាទ **ហ៊ិន ហៀក**

សូមឧទ្ទិសស្នាដៃដល់ពោះ

ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធហតីតព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីយានី បុព្វការីជន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
វីរជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ ដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុកសាងនិងការពារបូរណភាពទឹកដី
អធិបតេយ្យខ្មែរឱ្យបានគង់វង្សនិងទទួលបានសុខសន្តិភាព
រីកចម្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយស្នាដៃនេះក៏សូមឧទ្ទិសដល់លោកឪពុកបង្កើតព្រមទាំងញាតិ
សន្តានផងដែរ។

សូមព្រះអង្គ អស់លោក យាងនិងអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកុំបីអាក់ខានឡើយ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ខ្ញុំបាទ **ហ៊ុន សែន**

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី។

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភស្តុភារ ដែលមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត **ចៅ ម៉ីនថាន** ជាសាកលវិទ្យាធិការ ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ដែលមានឯកឧត្តម **សាន វឌ្ឍនា** អនុរដ្ឋលេខាធិការ ។

មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

មហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រសត្វ។

ការផ្តួចផ្តើម លើកទឹកចិត្តនិងធ្វើឱ្យបញ្ញវន្តខ្មែរ
មានឱកាសបញ្ចេញស្មារតីនិងជំនាញជាសៀវភៅខេមរភាសាសម្រាប់និស្សិត បញ្ញវន្ត
ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានា អាចយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រកបដោយភាពងាយស្រួល។

សូមថ្លែងអំណរគុណគណៈកម្មការបច្ចេកទេស៖

១. បណ្ឌិត ឆឹម គុច ប្រធាន

២. លោក ទង សុជាតិ អនុប្រធាន

ដែលបានជួយកែតម្រូវឱ្យសៀវភៅនេះកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ និងងាយស្រួលអនុវត្ត។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភរិយា បុត្រាបុត្រី បងប្អូន មិត្តភក្តិរួមការងារ ដែលបានគាំទ្រទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្ត រហូតដល់ការផលិតជាសៀវភៅនេះបានសម្រេចជាស្ថាពរ។

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យ បំផុតមួយដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅ មុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូប រាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបន កម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការ អភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុល ឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សឺដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅ វិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវ ជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥%នៃការវិនិយោគ ទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជន ពិភពលោក។

ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ
រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ
៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី?
ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា?

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល
និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ
ហើយដែលប្រការនេះចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល
និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ
និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលបានមនុស្សធម៌ និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។

ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច
ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based
Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy)

ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ

នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សុំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ
ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ
អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ
ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំគឺជាការត្រួតត្រាយមាតិកាសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកប
ដោយពុទ្ធិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ
សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ
ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទា ក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។
សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិគឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ
តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មពីព័ត៌មានទៅជា មូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់
បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ
ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន
និងរាប់ជាបុរេលក្ខណ៍នៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ
និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជា ចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។

ជាតុដីចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា
ហើយការរៀបរៀង និងត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានូវវត្ថុនៃ
វិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ
និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ
ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប
ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច
តាមរយៈការរៀបរៀង និងត្រួតពិនិត្យ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា
ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជាស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងវត្ថុនៃបច្ចេកវិទ្យាជាមួយ
ការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ

ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិវិទ្យា។
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
សួនឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
តំបន់ដីបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា
តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល
ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។
លក្ខណៈសម្បត្តិនៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញនិងតម្រង់ទិសដោយចំ
ណេះដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះ
កើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាស្ថាប័ន ស្រាវជ្រាវ
មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណធិបតេយ្យ និង
ជាពិសេសគឺការបណ្តុះវប្បធម៌អំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិនិងបច្ចេកវិ
ទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្សនិងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា
ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ
មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព
ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន ៣០៥ពាន់
និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន ១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ
មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិតនិងសាធារណៈជន

រួមមានការអានសៀវភៅ

ការអានលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក

ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវីដេអូ និងការអានលើកុំព្យូទ័រ

ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយ

សំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។

ម្យ៉ាងវិញទៀត

អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

ចំណាយពេលតិច

ងាយស្រួលអាន

និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។

នាពេលបច្ចុប្បន្ន

សិស្ស-

និស្សិតនិងសាធារណជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ

។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។

ម្យ៉ាងវិញទៀតបច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើបអាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំ ឌីជីថល និងមតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហាញចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមតិកាឌីជីថលដែលមានភាពចម្រុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល

ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល

គួបផ្សំជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះនិងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្តុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សាឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិនិងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

1. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា។
2. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និង និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ ។

3. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
4. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើត បណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថលជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា អាចទទួលបាននិងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណាន កាន់តែសម្បូរបែបនិងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
5. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលវេលានិងចាត់ទុកវប្បធម៌និងអកប្បកិរិយា អំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិលវៃនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
6. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលែងចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញ សម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការ វិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI Fund”។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលកាត់បន្ថយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមាន ឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិការបន្ថែមទៅលើទិសដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និងនូវកែលម្អសៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និងនូវកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណលើកកម្ពស់គុណភាពនិងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀតការរៀបរៀង និងនូវកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា ។
- លើកកម្ពស់ទំនើបការរូបនីយកម្ម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់។
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ។
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងវប្បធម៌នៃការរៀបរៀង និងនូវកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ និងនូវ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និងនូវកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណលើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សានិងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំនិងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សា ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬ អាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច

សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។

ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ

សូមចូលរួម

ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទួលបាន

និងថ្លៃថ្នាំនៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា

និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់

នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តថវិកាមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និង កែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និង កែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយ ពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឡើយ។

អារម្ភកថា

ការចិញ្ចឹមសត្វ

គឺជាមុខរបរប្រជកសិករយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយវាបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាកសិករ នូវអាហារ ជីវជាតិ ប្រូតេអ៊ីន និងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រង់ទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងសំខាន់។

ឧបសគ្គចម្បងក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វគឺ ជំងឺរាតត្បាត និងជំងឺផ្សេងៗទៀត ដែលសម្លាប់សត្វ។ បច្ចុប្បន្ននេះ កង្វះសៀវភៅសិក្សាបច្ចេកទេស ឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗជាភាសាជាតិ ជាពិសេសសៀវភៅបច្ចេកទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ជាឧបសគ្គក្នុងការកសាងធនធានមនុស្ស និងការផ្ទេរចំណេះដឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹង ជំនាញបសុព្យាបាល ខ្ញុំបាទបានចងក្រងជាសៀវភៅ "សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ"

នេះឡើងជាខេមរៈភាសាដើម្បីជាឯកសារបង្អែក និងជួយផ្គត់ផ្គង់នូវចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដល់និស្សិត អ្នកបច្ចេកទេស និងបសុពេទ្យលើវិជ្ជាសញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ។

សៀវភៅមួយនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រ នៃបម្រែបម្រួលរោគសញ្ញាដែលបណ្តាលពីជំងឺ ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើសត្វ ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការងារអនុវត្តជាក់ស្តែង។

យើងខ្ញុំយល់ថា សៀវភៅនេះប្រាកដជា នៅមានចន្លោះ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលនូវការរិះគន់កែលម្អក្នុងន័យស្ថាបនា និងត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យឯកសារនេះកាន់តែសុក្រិត្យថែមទៀត។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសជាមុន ដល់មិត្តនិស្សិត និងអ្នកមិត្តអ្នករាប់អានទាំងអស់ផងដែរប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងដោយអចេតនាក្នុងការប្រើប្រាស់ឃ្លាប្រយោគឬកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ ដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅនេះនឹងអាចជួយដល់មិត្តនិស្សិត អ្នកអានទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមនូវបាតុភូតនានា ទាក់ទងទៅនឹងបម្រែបម្រួលរោគសាស្ត្រ។ យើងខ្ញុំសូមជូនពរ ដល់មិត្តនិស្សិត និងមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គល និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។

សូមអរគុណ!!

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

អ្នកនិពន្ធ

ហិន ហៀក

អ្នកនិពន្ធ

- គោត្តនាម និងនាម ៖ ហិន ហៀក
- អាសយដ្ឋាន ៖ រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ស្ថាប័នការងារ ៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ
- ឯកទេស ឬមុខជំនាញ ៖ ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ



- ប្រវត្តិការសិក្សា ៖
 - បរិញ្ញាបត្រផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ឆ្នាំ១៩៩៧។
 - អនុបណ្ឌិត វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ និងវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៤។
 - គ្រូម បណ្ឌិត វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២២។

- បទពិសោធន៍ការងារ ៖
 - ១៩៩៧ ដល់ ២០១៨ គ្រូឧទ្ទេសឧត្តម មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ និងវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។
 - ២០១៨ដល់បច្ចុប្បន្នព្រឹទ្ធបរសេរង មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ នៃ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។
 - មុខវិជ្ជាឯកទេស៖ ប្រពន្ធនៃវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ

មាតិកា

ទំព័រ

ឧទ្ទិសកថា.....	i
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	ii
បុព្វកថា	iii
សេចក្តីបញ្ជាក់នៃមូលនិធិ.....	viii
អារម្ភកថា	ix
អ្នកនិពន្ធ	xi
មាតិកា.....	xiii
បញ្ជីតារាង	xxi
បញ្ជីដ្យាក្រាម	xxiv
បញ្ជីក្រាហ្វិច	xxv
បញ្ជីរូបភាព.....	xxvi

ជំពូកទី ១

សេចក្តីផ្តើម

១.១. វេជ្ជសាស្ត្រសុព្យាបាល

១.១.១ Clinical Veterinary Medicine..... ១

១.១.២ Preventive Veterinary Medicine..... ១

១.២ កត្តាត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ..... ២

ជំពូក២

គោលការណ៍នៃការសិក្សាវេតសាស្ត្រសត្វ

២.១ សុខភាព..... ៣

២.២ ជំងឺ..... ៤

២.២.១ ជំងឺមានរោគសញ្ញា	៤
២.២.១ ជំងឺគ្មានរោគសញ្ញា	៤
២.៣ កត្តាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់	៥
២.៣.១ ការខូចខាតរូបរាងពីកំណើត	៥
២.៣.២ ជំងឺផ្តល់ដោយមេបាតាមសែន	៦
២.៣.៣ កង្វះសារធាតុ	៦
២.៣.៤ ការរាតត្បាតដោយអតិសុខុមប្រាណ	៧
២.៣.៥ ការរាតត្បាតដោយបរាសិត.....	៧
២.៣.៦ ការបំផ្លាញដោយកត្តារូប	៨
២.៣.៧ ការបំផ្លាញដោយសារធាតុគីមី	៩
២.៤ កត្តារួមផ្សំជំងឺ	១០
២.៤.១ កត្តារួមផ្សំបង្កជំងឺខាងក្នុង.....	១០
២.៤.២ កត្តារួមផ្សំបង្កជំងឺខាងក្រៅ	១១

ជំពូក៣

សញ្ញាណទូទៅនៃរោគសាស្ត្រ

៣.១ General Pathology.....	១៤
៣.២ Special Pathology or Systemic Pathology.....	១៤
៣.៣ ការស្លាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរក្រោយពេលស្លាប់	១៥
៣.៣.១ ការវិវត្តនៃសាកសព	១៦
៣.៣.២ អត្ថប្រយោជន៍នៃការរលួយនៃសាកសព	១៧
៣.៤ Necrosis, Type of Necrosis and Patho-morphogenesis.....	១៧
៣.៤.១ Necrosis.....	១៧
៣.៤.២ ប្រភេទ Necrosis.....	១៨

៣.៤.៣ Pathological signs	១៩
៣.៤ លទ្ធផល Necrosis	២០
៣.៥ ATROPHY and TYPE of ATROPHY and PATH-MORPHOGENESIS	២០
៣.៥.១ Atrophy	២០
៣.៥.២ Type of Atrophy	២១
៣.៥.៣ Morphogenesis	២២
៣.៦.៤ លទ្ធផល Atrophia.....	២២
៣.៦ ខ្លឹមសារនៃបំបែរ Dystrophy និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៃសារពាង្គកាយ	២២
៣.៦.១ ខ្លឹមសារនៃ Distrophia	២២
៣.៦.២ Clinical Signs of Distrophy	២៣
៣.៧ ចំណែកថ្នាក់នៃ Distrophy និង អត្ថប្រយោជន៍របស់វា	២៤
៣.៧.១ ចំណែកថ្នាក់នៃ Distrophy	២៤
៣.៧.២ Protein Dystroph.....	២៥
៣.៨ Hyperemia អាទិ និង រើន និងលក្ខណៈនៃទ្រង់ទ្រាយរបស់វា	២៧
៣.៨ ១ ផ្អាកចលនាឈាម និង Limpha ដោយផ្នែក.....	២៧
៣.៨.២ លក្ខណៈ:	២៧
៣.៩ Stasis and Haemorrhage.....	២៨
៣.៩.១ Stasis	២៨
៣.៩.២ Haemorrhage	២៨
៣.១០ Anemia និង Infarction	២៩
៣.១០.១ Anemia.....	២៩
៣.១០.២ Infarction.....	២៩
៣.១១ THROMBOSIS AND EMBOLISM	៣១

៣.១១.១ THROMBOSIS	៣១
៣.១១.២ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងឈាម.....	៣៣
៣.១១ .៣ . Embolism.....	៣៤
៣.១២ Hypertrophy	៣៦
៣.១៣ Hyperplasia	៣៨
៣.១៤ Metaplasia	៣៩
៣. ១៥ REGENERATION	៤១
៣.១៦ REGENERATION OF TISSUES AND ORGANS	៤៣
៣.១៦.១ REGENERATION OF TISSUES	៤៣
៣.១៧ ORGANISATION AND INCAPSULATION.....	៤៥
៣.១៦.២ Regeneration Organs	៤៥
៣.១៧.១ ORGANISATION.....	៤៥
៣.១៨ ការលាក់ (Inflammation)	៤៥
៣.១៨.១ នីមិត្តហេតុនៃ Inflammation	៤៦
៣.១៨.២ Endo-Factor	៤៧
៣.១៨.៣ ការវិវត្តន៍នៃ Inflammation	៤៧
៣.១៨.៤ Inflammation Hypermia	៤៧
៣.១៨.៥ បុព្វហេតុនាំឲ្យមាន Proliferation	៤៨
៣.១៨.៦ លទ្ធផលនៃ Inflammation.....	៤៨
៣.១៨.៧ Diagnosis	៤៩
៣.១៨.៨ ចំណែកថ្នាក់ Inflammation	៤៩
៣.១៨.៩ គ្រោងនៃចំណែកថ្នាក់ InFlammation	៤៩

៣.១៨.១០ ការឲ្យឈ្មោះ Inflammation.....	៥០
៣.១៨.១១ Exudative type of inflammation	៥៣
៣.១៨.១២ Proliferativr type of Inflammation	៥៥

ជំពូក៤
ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ

៤.១ បាក់តេរី.....	៥៦
៤.២ វីរុស.....	៤៩
៤.៣ រីកេតស៊ី.....	៥៧
៤.៤ ពពួកផ្សិត	៥៧
៤.៥ ពពួកប្រូតូសូអា	៥៧
៤.៦ បរ៉ាសិត	៥៨
៤.៧ បុព្វហេតុបង្កជម្ងឺផ្សេងទៀត	៥៩
៤.៧.១ បុព្វហេតុដែលបង្កពីខាងក្រៅខ្លួន	៦០
៤.៧.២ បុព្វហេតុដែលបង្កដោយអំពើនៃរូបសាស្ត្រប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍	៦១

ជំពូក៥

ផ្លូវចម្លងរោគ

៥.១ ស្បែក.....	៦២
៥.២ ប្រដាប់រំលាយអាហារ	៦២
៥.២.១ មាត់	៦២
៥.២.២ ពោះវៀន	៦៣
៥.២.៣ ត្រូបកភ្នែក.....	៦៣
៥.២.៤ ប្រដាប់ដំណកដង្ហើម.....	៦៣
៥.២.៥ ប្រដាប់បន្តពូជ និងប្រព័ន្ធទឹកអម្រូន	៦៣

៥.២.៦ កន្សោមដោះ: ៦៣

ជំពូក៦

របៀបចម្លងរោគ

៦.១ ការឆ្លងដោយផ្ទាល់..... ៦៤

 ៦.១.១ ប្រដាប់បន្តពូជ ៦៤

 ៦.១.២ ស្បែក-ភ្នាសស្តើង ៦៤

 ៦.១.៣ ឆ្លងតាមរបួស ៦៤

 ៦.១.៤ ឆ្លងតាមតំណក់ទឹកដែលចេញពីសត្វ..... ៦៤

 ៦.១.៥ ឆ្លងតាមអុវី ៦៥

 ៦.១.៦ ឆ្លងតាមទងសុក ៦៥

៦.២ ការឆ្លងដោយប្រយោល..... ៦៥

 ៦.២.១ តាមរយៈទឹក និងចំណី ៦៥

 ៦.២.២ តាមរយៈទឹកដោះ:..... ៦៥

 ៦.២.៣ តាមរយៈសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ៦៥

ជំពូក៧

ការសិក្សាអំពីនិមិត្តរោគ

៧.១ Subjective Symptoms ៦៦

៧.២ Objective Symptoms..... ៦៧

៧.៣ Premonitory or Precursory Symptoms..... ៦៧

៧.៤ Direct or Idiopathic Symptoms..... ៦៧

៧.៥ Indirect or Sympathetic Symptoms..... ៦៧

៧.៦ Typical Symptoms..... ៦៧

៧.៧ Atypical Symptoms ៦៨

៧.៨ Periodical or Remittent Symptoms.....	៦៨
៧.៩ Diagnostic or Pathognomic Symptoms.....	៦៨
៧.១០ Prognostic Symptoms.....	៦៨
៧.១០.១ ចង្កោមរោគសញ្ញា	៦៨
៧.១០.២ ស្លាកស្នាម	៦៩
៧.១០.៣ ការព្យាករណ៍	៦៩

ជំពូក៨
ភាពសាំវិទ្យា

៨.១ Immunity.....	៧១
៨.២ Immune System.....	៧១
៨.៣ កោសិកាសំខាន់ៗនៃ Immune Response or Immunization	៧៣
៨.៣.១ Lymphocyte	៧៣
៨.៣.២ Form of Infectious Immun Response.....	៧៤
៨.៣.៣ Immunity of Transplantation	៧៦
៨.៣.៤ Morphogenesis of Auto-immune-Process.....	៧៧
៧.៣.៥ Allergic Reaction	៧៧
៨.២ ការការពារជម្ងឺ	៧៨
៨.២.១ អនាម័យ	៧៨
៨.២.២ ការសំលាប់មេរោគ.....	៧៨
៨.២.៣ សារធាតុគីមីប្រើសំរាប់សំលាប់មេរោគ.....	៧៩
៨.៣ ការត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ	៧៩
៨.៣.១ ការសិក្សាភាពរាតត្បាតជម្ងឺ.....	៧៩
៨.៣.២ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺ (Disease Diagnosis).....	៨០

៨.៣.៣ ការធានាស្ថានភាពសត្វគ្មានជំងឺ (Quarantine)	៨១
៨.៣.៤ ការវះកាត់សាកសពសិក្សាស្នាក់ស្នាមជំងឺ (Autopsy/Postmortem Examination)	៨១

ជំពូក៩

វិធីកត់ត្រាប្រវត្តិសត្វឈឺ

៩.១ ការសាកសួរ ឬ កត់ត្រាប្រវត្តិសត្វ	៨៣
៩.២ ការពិនិត្យទូទៅ	៨៣
៩.២.១ ការពិនិត្យដោយភ្នែក	៨៣
៩.២.២ ការត្រួតពិនិត្យគ្លីនិច	៨៣
៩.៣ ការត្រួតពិនិត្យពិសេស នៃប្រព័ន្ធសរីរាង្គមួយចំនួន	៨៤
៩.៤ ការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍	៨៤

ជំពូក១០

បំណកស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យ

១០.១ ការបកស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យ	៨៥
១០.២ បរិស្ថានសត្វ	៨៥
១០.២.១ បរិស្ថានខាងក្រៅ (Outdoor Environment)	៨៥
១០.២.២ បរិស្ថានខាងក្នុង (Indoor Environment)	៨៦

ជំពូក១១

គោលការណ៍ នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

១១.១ ការបែងចែកនៃវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ	៨៨
--	----

ជំពូក១២

ប័ណ្ណពិនិត្យកាយសម្បទា

ខ្លឹមសារនៃ DYSTROPHY.....

ពោគសញ្ញានៃ DYSTROPHY.....

ចំណែកថ្នាក់នៃ DYSTROPHY និង អត្ថប្រយោជន៍របស់វា.....

HYPEREMIA អាក់ទែ និង វ៉ែន.....

STASIS AND HAEMORRHAGE.....

 STASIS.....

 HAEMORRHAGE.....

ANEMIA, INFARCTION.....

 ANEMIA.....

 INFARCTION.....

THROMBOSIS AND EMBOLISM.....

 THROMBOSIS.....

 EMBOLISM.....

HYPERTROPHY.....

 PHYSIOLOGY.....

 PATHOLOGY.....

HYPERPLASIA.....

METAPLASIA.....

REGENRATION.....

REGENERATION.....

 REGENERATION TISSUE.....

REGENERATION ORGANS.....

ORGANISATION AND INCAPSULATION.....

 ORGANISATION.....

 INCAPSULATION.....

ការរលាក (INFLAMMATION).....

ជំពូក ៤
របៀបចំលទ្ធភាព

៤.១- ការប៉ះផ្ទាល់.....

 ៤.១-១-ប្រដាប់បន្តពូជ.....

 ៤.១-២-ស្បែក-ហ្វាសស្តើង.....

 ៤.១-៣-ឆ្អឹងតាមរបួស.....

 ៤.១-៤-ឆ្អឹងតាមតំណក់.....

៤.២-ដោយមានពីកំណើត.....

 ៤.២-១ តាមអុំរើ.....

 ៤.២-២-តាមទងសុខ.....

៤. ៣- ដោយប្រយោល.....

 ៤.៣-១-តាមរយៈទឹក និងចំណី.....

 ៤.៣-២-តាមរយៈទឹកដោះ.....

 ៤.៣-៣-តាមរយៈសំភារៈប្រើប្រាស់.....

ជំពូក ៥

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

ជំពូកទី ១

សេចក្តីផ្តើម

វេជ្ជសាស្ត្រសត្វបុរាណទាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលជម្ងឺ និងការពារជម្ងឺ។ វេជ្ជសាស្ត្រសត្វបុរាណ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិជ្ជាសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាល ការការពារ និងការសិក្សា ទូទៅនៃជម្ងឺសត្វជាពិសេសសត្វស្រុក។

ក្នុងការអនុវត្តបុរាណវិទ្យា ត្រូវមានចំណេះដឹងរឹងមាំ លើកាយវិភាគវិទ្យា សរីរវិទ្យា បរិស្ថិតិសាស្ត្រ រោគសាស្ត្រ អតិសុខុមប្រាណសាស្ត្រ និង ឱសថសាស្ត្រ។ បន្ថែមពីលើនេះ បុរាណវិទ្យាត្រូវមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើការតាមដាន និង យល់ដឹងអំពីទម្លាប់ និង អត្តចរិតសត្វមានសុខភាពល្អធម្មតា ដើម្បីមានសមត្ថភាព ព្រែកឱ្យដាច់រវាងសត្វមានជម្ងឺ និងសត្វមានសុខភាពល្អ។

វេជ្ជសាស្ត្រសត្វបុរាណ (Veterinary Medicine) អាចចែកចេញជា:

១- Clinical Veterinary Medicine: គឺជាការពិនិត្យ សិក្សារោគវិនិច្ឆ័យ និង ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹង ជម្ងឺសត្វ។

២- Preventive Veterinary Medicine: ជាការអនុវត្តសកម្មភាព ថែរក្សាសុខភាពសត្វ នៅពេល មានជម្ងឺរាតត្បាត។ វាពាក់ព័ន្ធជាមួយកត្តាត្រួតពិនិត្យ និងការពារជម្ងឺសត្វ។ ជម្ងឺ (Disease) ជា ការប្រែប្រួលទាំងឡាយ ដែលខុសប្លែកពីរូបសាស្ត្រ និង សរីរសាស្ត្រធម្មតាបានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានជម្ងឺ។ វាបញ្ជាក់អំពីកង្វះសកម្មភាព ឬសមត្ថភាព នៃសាច់ដុំកាយ ដើម្បីបំពេញនាទីជីវិតសាស្ត្រធម្មតា។

ប្រពលភាពនៃសព្វកាយសត្វ		ភាពសាហាវនៃមេរោគ		ស្រោស
Potential Of Organism	X	Virulence of Germ	X	Stress
Cm ។ W				=


គំនូសបំព្រួញ ១: កត្តាត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ

Stress- អាចបណ្តាលពីកត្តារូបសាស្ត្រ បរិស្ថានជុំវិញ ចំណីអាហារ ការប្រើប្រាស់ ។ល។

មានកត្តា២ដែលជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ និង ប្រយោល ត្រូវលើកមកសិក្សា:កត្តាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ (Direct Affected Factor) ដូចជា ការបង្កឡើងដោយ អតិសុខុមប្រាណ បរិស្ថិត កត្តារូប កត្តាចណី ការខ្វះជាតិគីមី ជីវជាតិ ការពុលជាដើម។

កត្តារួមផ្សំផ្សេងៗដែលបង្កជម្ងឺ (Predisposing Factor) ជាកត្តារួមផ្សំផ្សេងៗ ដែលបង្កឱ្យសព្វាង កាយសត្វចុះខ្សោយគេចែកចេញជាកត្តារួមផ្សំខាងក្នុង (Intrinsic) និងកត្តារួមផ្សំខាងក្រៅ (Extrinsic) ។

ជម្ងឺនឹងមិនអាចរាតត្បាតបានទេនៅពេលដែលសត្វមានភាពសំនឹងជម្ងឺ។ ភាពសំនឹង និងភាពធន់នេះបានមកដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង ឬការជាសះស្បើយពីជម្ងឺ។ សត្វដែលអាចទទួលជម្ងឺ (Susceptible Animal) ជាសត្វ គ្មានភាពធន់ (Resistance) ឬភាពសំនឹងជម្ងឺ (Immunity) ។



គំនូសបំព្រួញ ២: កត្តាមានឥទ្ធិពលលើសុខភាពសត្វ

២. គោលការណ៍នៃការសិក្សារោគសាស្ត្រ (Principle of Pathology)

រោគសាស្ត្រជាសាខានៃជីវសាស្ត្រ ដែលទាក់ទងនឹងការសិក្សានៃជំងឺ (Disease) ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលស្រទាប់កោសិកា និងជាលិកា។ កោសិកាមានពីរ ប្រភេទគឺ កោសិកាប្រូការីយ៉ូត និងកោសិកាអឺការីយ៉ូត (Prokaryotic and Eukaryotic cells) កោសិកាប្រូការីយ៉ូតជាកោសិកាគ្មានណ្វៃយ៉ូ ហើយនៅខាងក្នុងមាន DNA (ក្រូម៉ូសូម) តំណាង នូវសម្ភារតពូជ។ វាគ្មានភ្នាសសម្រាប់រុំព័ទ្ធខ័ណ្ឌចែកជាមួយស៊ីតូប្លាសឡើយ។

ឧទាហរណ៍: ពពួកបាក់តេរី ជាកោសិកាប្រូការីយ៉ូត។

កោសិកាអឺការីយ៉ូត ជាកោសិកាមានណ្វៃយ៉ូដែលរុំព័ទ្ធដោយភ្នាសហើយនៅក្នុងនោះមានDNA ផ្ទុកនូវសម្ភារតពូជ។ ឧទាហរណ៍ពពួកប្រូតូសូអារ (Protozoa) កើតពីកោសិកាប្រូការីយ៉ូតតែមួយ ចំណែកឯមេតាសូអាន់ (Metazoan) ជាពហុកោសិកាប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតជា ជាលិកាអេពីតេលូមូម សាច់ដុំ សន្ទាន ផ្លឹង ផ្លឹងខ្លី និងប្រសាទ។

អ្វីជាជំងឺ? ជំងឺ គឺជាការប្រែប្រួលនៃសារពាង្គកាយ (Organism)

ប្លែកខុសពីប្រក្រតីដែលបណ្តាលមកពីកត្តាផ្សេងៗ។

ការសិក្សារោគសាស្ត្រទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាសរីរវិទ្យា (Physiology) កាយវិភាគវិទ្យា (Anatomy) ។ បរិយាកាសវិទ្យា (Environment) និងមរតពូជ (Genetic) ។

អ្វីទៅជាសុខភាព និងជំងឺ (What is health and disease ?)

ក. សុខភាព (Health): គឺជាភាពសុខសាន្តនិងភាពរស់រវើកនៃសារពាង្គដែលឯករាជ្យ។ ក្នុងផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វ (Livestock Production)-សុខភាពសត្វជាកត្តាជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់ផលចំណេញ ពោលគឺការចិញ្ចឹមសត្វ និងការលូតលាស់អាស្រ័យលើសត្វមានសុខភាពល្អ (Health animale) ។ មានកត្តាជាច្រើនដែលទាក់ទងដល់ផលចំណេញនៃផលិតកម្មនោះ គឺសុខភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ហើយសត្វអាចមានសុខភាពល្អលុះត្រាតែមានការចាត់ចែង (Management) និងធ្វើអនាម័យបានល្អ (Good Hygiene) ។ សុខភាពបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់កាយវិភាគវិទ្យា និងនាទីរបស់វា ដែលមួយភាគធំបំផុតក្នុងសាព៌ាង្គកាយកំពុងមានដំណើរការសកម្មល្អ។ សុខភាពបញ្ជាក់នូវលក្ខណៈ

និង គុណភាពរបស់ រូបសាស្ត្រ (Physic) សរីរសាស្ត្រ (Physiology) និង អត្តចរិត-មនោ (Mentality) កំពុងមានសកម្មភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ខ. ជំងឺ (Disease): ជំងឺបានត្រូវគេកំណត់និយមន័យយ៉ាងងាយថា ជាការផ្ទុះឡើងនូវបាតុភូតខុសពីប្រក្រតីទៅលើជីវសាស្ត្រនៃសារពាង្គកាយ (Physiological Function) ។ និយមន័យនេះរួមបញ្ចូលទាំងបុព្វហេតុផ្សេងៗ ដែលបណ្តាលអោយប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត និងបុព្វហេតុមានការប៉ះទង្គិចដល់សារពាង្គកាយ។ ការប្រែប្រួលទាំងឡាយ ដែលខុសប្លែកពីរូបសាស្ត្រ និង សរីរសាស្ត្រធម្មតាបានត្រូវបញ្ជាក់ ថាមានជំងឺ។ វាបញ្ជាក់អំពីកង្វះសកម្មភាព ឬសមត្ថភាព នៃសារពាង្គកាយ ដើម្បីបំពេញនាទីជីវសាស្ត្រធម្មតា។

នៅក្នុងប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមសត្វ អ្នកចិញ្ចឹមមានការបារម្ភណ៍ ដូច្នេះគេបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្លួនផលិតកម្មមានទំហំធំ និងមានសត្វច្រើន ។ ជំងឺអាចលេចឡើងជាលក្ខណៈសម័យជំងឺ (Individual) ឈឺតែសត្វមួយដោយឡែក ហើយមិនបង្កអោយមានការរាតត្បាតទៅសត្វដទៃ វាជាបញ្ហាមិនសូវសំបាប់ប៉ុន្តែក្នុងករណីជំងឺរោគគ្រោះព្រមគ្នាលើសត្វ ឬលើសត្វមួយក្រុមដូចជាជំងឺ បណ្តាលមកពីខ្វះសារធាតុគីមី ជំងឺបង្កដោយប៉ារ៉ាស៊ីត រីសផ្សេងៗ អាចបង្កអោយមានការខាតបង់យ៉ាងធំធេងជាកង្វល់គំរៀមកំហែងសេដ្ឋកិច្ច។ ដើម្បីចៀសវាងនូវការខាតបង់ និងបរាជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វគេត្រូវផ្អែកលើការយកចិត្តទុកដាក់ជាចំបង កត្តាសុខភាពទូទៅតាមរយៈការអនុវត្ត វិធានការការពារលើសត្វនីមួយៗក៏ដូចជាហ្វូងដើម្បីប្រឆាំងទប់ស្កាត់ជំងឺ ដែលអាចផ្ទុះឡើងដោយវិធានការណ៍ចាក់ថ្នាំការពារការថែបំប៉ន ផ្តល់ចំណី និងរក្សាអនាម័យ។

ខ.១ ជំងឺមានរោគសញ្ញា (Clinical Disease)

ក្នុងករណីនេះ គេសម្គាល់ឃើងថាសត្វមានរោគសញ្ញាបង្ហាញអោយឃើញដូចជា រាគ (Diarrhoea) ការមិនស៊ីចំណី (Anorexia) ការចុះខ្សោយ (Weakness) ការថយទម្ងន់(Weight loss) មានឡើងកម្ដៅ (Fever) មានការឈឺចាប់ (pain)ជាដើម។

ខ.២ គ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ (Subclinical Disease)

មានការសណ្ឋានជាច្រើន ដែលឈឺគ្មានរោគសញ្ញាហើយបន្ថយសមត្ថភាពបន្តពូជរបស់សត្វ និងការលូតលាស់របស់វា ដូចជាការចុះថយនៃអត្រាបង្កកំណើតកូនសត្វ

និងការលូតលាស់ធំជាតំយីត។ល។

ក្នុងសភាពធម្មតាកូនសត្វត្រូវលូតលាស់ក្នុងអត្រាសមាមាត្រកំណត់មួយ (និយាម- Standard) ច្បាស់លាស់

អាស្រ័យទៅពូជនិងប្រភេទរបស់សត្វ។ ឧទាហរណ៍ កូមជ្រូកក្នុងករណី ជម្ងឺគ្មានរោគសញ្ញាស៊ីចំណីច្រើនប៉ុន្តែធំជាតំយីត បើប្រៀបធៀបជាមួយកូនជ្រូកដទៃទៀត ដូច្នោះវាបណ្តាលអោយមានការខាតបង់យ៉ាងធំធេងលើការផ្តល់ចំណី ពេលវេលា និងកម្លាំងពលកម្ម។

២.១ កត្តាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ (Direct Affected Factors) :

ការបង្កជម្ងឺត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទៅតាមប្រភេទនៃសកម្មភាព ឬ អតិសុខុមប្រាណទាំងឡាយ ដែលបណ្តាល ឱ្យមានបម្រែបម្រួលក្នុងសព្វកាយ។ នៅពេលមានជម្ងឺកើតឡើង យ៉ាងហោចក៏ត្រូវតែមានភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ មួយធ្វើសកម្មភាពដែរ ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការបង្កជម្ងឺ បណ្តាលដោយកត្តាសំប្រាប់ច្រើន។

ករណីខ្លះជម្ងឺទាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់សត្វនិមួយផ្ទាល់ រីឯករណីខ្លះទៀតមានកត្តារួមផ្សំទាំងឡាយដែលជួយគាំទ្រដល់ភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ ឱ្យមានសកម្មភាពលប់លើសព្វកាយដែលអាចការពារបាន។ បុព្វហេតុផ្ទាល់បង្កជម្ងឺគឺ:

២.១-១- ការខូចរូបរាងពីកំណើត (Congenital Deformity):

ជម្ងឺមានពីកំណើតដែលបណ្តាលមកពីការលូតលាស់មិនប្រក្រតី (Abnormal Development) នៃអំប្រើយ៉ុង (Fetus) នៅពេលសត្វផឹម (Pregnancy)។ ករណីនេះភាគច្រើនបណ្តាលពីការខូចខាត ឬជាឥទ្ធិពលតំណពូជ ដែលផ្តល់ឱ្យដោយ មេ-បា។ វាគឺជាការខូចទ្រង់ទ្រាយ (Malformation) រួមផ្សំជាមួយការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីនៃអំប្រើយ៉ុង (Abnormal Development of fetus) នៅក្នុងស្បូនមេ។

ករណីជាច្រើន ការខូចរូបរាងពីកំណើត អាចស្រាយបញ្ជាក់អំពីបុព្វហេតុបណ្តាលពីជម្ងឺរបស់មេពេលផឹម។ សត្វអាចលូតនៅពេលមានផ្ទុះជម្ងឺឆ្លង (Outbreak of Infectious Diseases) ឬ មិនលូតហើយ ករណីនេះកូនសត្វ ដែលកើតមកអាចមានការខូចរូបរាង ដូចជា ខ្វាក់ភ្នែក ខូចជើង គ្មានប្រដាប់បន្តពូជ។ល។

ជួនកាលទៀតការខូចរូបរាងនៃអំប្រើយ៉ុងអាចបណ្តាលពីការប្រើថ្នាំទៅលើមេសត្វពេលសត្វផឹម។ ដូច្នោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វផឹម (ក្នុងដំណាក់ដំបូង ១

ទៅ

៣ខែ)។

ការប្រើថ្នាំនៅពេលសត្វដើមអាចជាបុព្វហេតុបណ្តាលឱ្យលេចឡើងនូវភាពមិនប្រក្រតីចំពោះកូនសត្វ
ពេលកើត ហើយមួយទៀតការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពខ្លួនសត្វពេលសត្វដើម
ក៏ជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការលូតលាស់នៃអំប្រើយ៉ុង
ដោយសារនៅពេលសីតុណ្ហភាពខ្លួនសត្វឡើងខ្ពស់វាបណ្តាលឱ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ (Nervous
System) អសកម្ម ឬ ខូចមុខងារ (Malfunction) ។
ការឡើងសីតុណ្ហភាពខ្លួនសត្វភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការរាតត្បាតដោយពពួកអតិសុខុមប្រាណ
ហើយដែលបណ្តាលឱ្យអំប្រើយ៉ុងលូតលាស់ខ្សោយ ឬ អាចងាប់នៅក្នុងពោះមេ។

ឧទាហរណ៍: កូនគោដែលកើតពីមេ រាតត្បាតដោយវីរុស Akabane នៅរវាងអាទិត្យទី៤ និង
ទី៨ នៃរយៈពេលចាប់មានគភ៌ នឹងបណ្តាលឱ្យមានការបំផ្លាញសាច់ដុំ (Limb Deformity) ឬ
គ្មានជាលិកាខ្លួរក្បាល (Non brain tissue)
ហើយដែលបន្ទាប់មកប្រអប់ខ្លួរក្បាលត្រូវបំពេញដោយវត្ថុរាវ (Fluid) ជំនួសខ្លួរក្បាល។
បរិមាណវត្ថុរាវកើនឡើងយ៉ាងច្រើន ហើយបន្តរាលដាលដល់ផ្នែកខាងលើនៃខ្លួរក្បាលទៀត។
កូនគោបែបនេះនៅមានជីវិត ប៉ុន្តែពុំអាចធ្វើចលនា និងទំពាអៀងបានឡើយ
ហើយកូនគោនឹងស្លាប់ដោយដាច់ពោះ។ គេជួបប្រទះញឹកញាប់នូវករណីរូបភាពខ្លួនមួយក្បាល ២ ឬ
ខ្លួនមួយមានជើង ៦ ឬ ៨ ហើយកូនសត្វមានសភាពខ្សោយ។
ទាំងនេះជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការលូតលាស់ ដែលភាគច្រើនបណ្តាលពីការប្រែប្រួលនៃសំពៅកាយ
មេពេលដើម។ ត្រូវថែរក្សា និង ពិនិត្យសត្វដើមឱ្យបានល្អ ដើម្បីជៀសវាងករណីនេះ
ព្រោះវាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ច ផលិតកម្មយ៉ាងធំធេង។

២.១-២-ជម្ងឺផ្តល់ដោយមេបាតាមសែន (Hereditary Disease):

ជម្ងឺផ្តល់ដោយមេបាជាជម្ងឺ ទាំងឡាយណាដែលមានមូលដ្ឋានចំលងពីមេ-បា។
វាជាការចំលងតាមមរតកតំណពូជ (Genetic) ឬ (Gene)។
វាក៏អាចបណ្តាលពីកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យសត្វខ្សោយងាយទទួលជំងឺ
(Susceptibility)។ ជួនកាលជម្ងឺបណ្តាលពីការបង្កាត់ពូជ។ ភាពងាយទទួលជម្ងឺមហារីកក្អែក ជា
លក្ខណៈតំណពូជតាមសែន
ហើយវាប្រែប្រួលទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិប្រែប្រួលពិសេសណាមួយដូចជា កម្ដៅ និង
សំណើម សត្វបង្ហាញ សញ្ញាមហារីកក្អែក ដែលអាចពិនិត្យឃើញយ៉ាងច្បាស់។

២.១-៣-កង្វះសារធាតុ (Vitamin and Miniral Deficiency):

ជម្ងឺបណ្តាលពីការខ្វះសារធាតុ (Deficiency Diseases) ជាប្រភេទជម្ងឺពិសេសដូចជាការខ្វះធាតុគីមី ទង់ដែង (Copper/Cu deficiency) កង្វះវីតាមីន A (Vitamin-A Deficiency) កង្វះអ៊ីយ៉ុងដែក និងកង្វះសារធាតុជាច្រើនទៀតដោយសារចំណីអាហារមិនមានគុណភាព ហើយដែលបណ្តាលឱ្យសត្វពុំឃ្លានចំណីអាហារ (Anorexia)។ ការមិនឃ្លានចំណីអាចបណ្តាលមកពីបុព្វហេតុពីរផ្សេងទៀត: ចំណីអាហារសត្វពុំមានជីវជាតិ និងពុំមានសារធាតុ - ខនិចគ្រប់គ្រាន់ ឬ សត្វគ្មានលទ្ធភាពស៊ីចំណីអាហារ ដោយសារជម្ងឺ ឬការរោគក្បាលបន្ត (Secondary Infection) ដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រ និងមេតាបូលីស (Metabolism)។

ជម្ងឺបណ្តាលពីការខ្វះសារធាតុគីមីនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ ហើយដែលបណ្តាលឱ្យសត្វថយទំងន់ និងលូតលាស់យឺត (ក្រិន)។ ជម្ងឺជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជា ជំពៅរលួយ សត្វងើបឈរពុំរួច ។ល។ ការខ្វះ Ca និង P បណ្តាលឱ្យសត្វទន់ភ្លើងខ្នង (Rachit) កង្វះទង់ដែង (Cu) និង កូបាល (Co)-សត្វពុំឃ្លានចំណី កង្វះអ៊ីយ៉ុងដែក (Fe)-សត្វមានសភាពស្នែកស្លាំង (Anemia) ខ្វះវីតាមីន E -ការបន្តពូជរបស់សត្វចុះខ្សោយ ។ល។ កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

២.១-៤-ការរោគក្បាលដោយអតិសុខុមប្រាណ (Infection by Micro-organism):

អតិសុខុមប្រាណ ជាភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺយ៉ាងសំខាន់ និង ចំពោះមុខ។ អតិសុខុមប្រាណដែលមិនបង្កជម្ងឺហៅថា Non-Pathogenic Microorganism ហើយអតិសុខុមប្រាណដែលបង្កជម្ងឺហៅថា Pathogenic Microorganism - Pathogen។ Pathogen សំដៅទៅលើអតិសុខុមប្រាណទាំងឡាយណា ដែលបង្កជម្ងឺចំពោះមុខ និង ផ្ទាល់ទៅលើសត្វ។ ប្រភេទនៃ Pathogen នីមួយៗ ខុសគ្នាដោយសមត្ថភាពបង្ករោគ (Virulence) របស់វា។ Virulence គឺជាសមត្ថភាពបង្កជម្ងឺរបស់មេរោគ ដែលពេលនោះមេរោគទាំងនេះអាចធ្វើសកម្មភាពដូចជា:

- លូតលាស់លឿន (Multiplication)
- បញ្ចេញសារធាតុពុល -Toxin (Exotoxin ឬ Endotoxin)
- ធ្វើឱ្យមានរបួស (Migration)

ជម្ងឺបានត្រូវគេចែកចេញជាក្រុម ទៅតាមប្រភេទភ្នាក់ងារបង្កជម្ងឺ ៖

- ជម្ងឺបង្កដោយបាក់តេរី (Bacterial Disease)
- ជម្ងឺបង្កដោយពួកផ្សិត (Fungal Disease)

- ជម្ងឺបង្កដោយប្រូតូសូអា (Protozoal Disease)


២.១.៥. ការរោគគ្បាតដោយបរាសិត (Infestation/Parasitism):

Parasitism ជាការរស់នៅនៃ សត្វតូចកាយមួយ ដោយពឹងអាស្រ័យទៅនឹងសត្វតូចកាយមួយទៀត និង មានសកម្មភាពបំផ្លាញសត្វតូចកាយ ដែលពឹងអាស្រ័យនោះ។ ការរោគគ្បាត នៃពពួកបរាសិតនេះ អាចមានពីរយ៉ាង:


Internal infestation: ជាការរោគគ្បាតដោយពពួកបរាសិតខាងក្នុងខ្លួនដូចជាពពួកព្រូនមូល (Thelminth) ព្រូនសំប៉ែតវែង (Trematode) និង ព្រូនសំប៉ែតខ្លី (Cestode)។

External Infestation: ជាការរោគគ្បាតដោយពពួកបរាសិតខាងក្រៅខ្លួន ដូចជា: ពពួកតុតកែ ចៃ មេកម ។ល។ ចំនួនបរាសិតតិចតួចមិនអាចបង្កឱ្យមាន Clinical Disease បានទេ ប៉ុន្តែសត្វអាចចុះខ្សោយ ហើយងាយទទួលជម្ងឺផ្សេងៗ និង មានការលូតលាស់ពុំសមមាត្រ និងការចំណាយ។ ដើម្បីអាចធ្វើការរោគគ្បាតបានពពួកបរាសិតភាគច្រើន ជាពិសេសពពួក Cestode និង Trematode ត្រូវការ វដ្តជីវិតរបស់វាដោយពឹងពាក់សត្វតូចកាយសត្វមួយទៀត (Intermediate Host) ដើម្បីស្នាក់អាស្រ័យ និង ធ្វើការបំបែកពីស៊ីតទៅជាកូនដង្កូវ ដែលអាចរោគគ្បាតទៅសត្វតូចកាយសត្វមួយទៀត (Definitive Host)។

វដ្តជីវិតនៃបរាសិត (Lyfe Cycle or Parasitism)



ដំណាក់កាលរាតត្បាតនៃកូនដង្កូវ
(Infective Stage of Larvae)



២.១.៦. ការបំផ្លាញដោយកត្តារូប (Physical Injury and Irritants):

សត្វអាចរងគ្រោះដោយបណ្តាល ពីការមុត (Trauma)។ ដំបៅជើងពុំអាចដើរបាន ជួនកាលប្រភេទរបួសអាចជាប្រហោង (Peforation) ដែល ងាយរាតត្បាតដោយពពួក Anaerobic Bacteria ដូចជាពពួក Tetanii ឬ Welchii។ ជាលិកាអាចរហែក ឬ រហក (Laceration) ឬអាចខ្ចាំដោយប៉ះទង្គិច (Concussion) ឬពេលសត្វជល់គ្នា។ ជួនកាលសត្វត្រិច (Sprain) ជើង ឬភ្នាត់ផ្អឹង (Luxation) ឬបាក់ផ្អឹង (Fracture)។

សត្វនៅហាលវាលក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យយូរ បណ្តាលឱ្យមានការបំផ្លាញដោយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ និង កំដៅ (Injury by Sun Radiation and Heat)។ កាំរស្មីអុលត្រាវីយ៉ូឡែត (Ultraviolet Ray) កាំរស្មី X (X-Ray) និង កំដៅ (Heat) បណ្តាលឱ្យសត្វរលាកស្បែក។ ការចុះត្រជាក់ខ្លាំង ការកើនឡើង និង ចុះថយ សំពាធបរិយាកាស (Increase and Decrease Atmospheric Pressure) បណ្តាលឱ្យភាពធន់ និង ភាពស្តាំ របស់សត្វ ចុះខ្សោយ។

២.១.៧-ការបំផ្លាញដោយធាតុគីមី (Chemical Irritants):

ក- ការពុលដោយធាតុគីមី: ធាតុគីមីជាដើមហេតុ នៃការបំផ្លាញសព្វាងកាយក្នុងករណីលើស លប់ ហើយវាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាព ឬ អាចបំផ្លាញ និង សំលាប់ជីវិតសត្វបាន យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សារធាតុគីមីមានពីរប្រភេទ ៖

- សារធាតុគីមីសរីរាង្គ (Organic)
- សារធាតុគីមីអសរីរាង្គ (Inorganic/Miniral)

ORGANIC ៖ ដូចជាពពួកថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត (Insecticide) ថ្នាំសំលាប់សត្វករកេ (Rodenticide) ថ្នាំសំលាប់ពួកផ្សិត (Fungicide) ថ្នាំសំរាប់ព្យាបាល ក្លរូហ្វូម (Chloroform) ពពួកអាត់កាឡូអ៊ីត (Alka-loides) និង រុក្ខជាតិពុល (Poisoning Plants) និងពពួក Vitamins ក៏ពុលយ៉ាងសាហាវដែរ នៅពេល គេឱ្យសត្វផឹកលើសកំរិត។ សារធាតុគីមី ដូជា GasIutelah៖ បាស លោហធាតុ ព្រមទាំងអំបិលរបស់វា (Ag , P, Hg,etc។) បង្កឱ្យមានការពុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសត្វ ដែលលេប សមាសធាតុគីមីទាំងអស់នេះ។

ខ-ការខ្វះសារធាតុ និងធាតុគីមីបណ្តាលឱ្យពុល: កង្វះសារធាតុគីមីបណ្តាលឱ្យសត្វបាត់បង់

ជីវហារ សត្វអាចស៊ីចំណីដែលវាពុំធ្លាប់ស្គាល់ ហើយ បណ្តាលឱ្យពុល។ កង្វះសារធាតុគីមីនាំ ឱ្យសត្វ បាត់ បង់នាទីជីវហារវិញ្ញាណ ដែលធ្វើឱ្យសត្វដឹងចំណីត្រូវស៊ី ឬ មិនត្រូវស៊ី។ ជួនកាលសត្វ ស៊ីប៉ះបន្លា ឬ ដែកដែល បណ្តាលឱ្យមុតមាត់ អណ្តាត ជំបៅ ហើយ សត្វពុំអាចស៊ីចំណីបាន។ សត្វបាត់បង់ជីវហារ (Anorexia) អាចសង្កេតឃើញ នៅពេលមានការខ្វះកាល់ស្យូម ផូស្វ័រ សូដ្យូម អ៊ីយ៉ុងដែក ទង់ដែង សង្កសី ម៉ាញ៉េស្យូម (Mn) អ៊ីយ៉ូត (I) បូតាស្យូម (K) ម៉ង់កាណែស (Mg) ជាដើម។ សត្វ ខ្វះវីតាមីន ខ្លាញ់ កាបូអ៊ីដ្រាត (Carbohydrate) និង ប្រូតេអ៊ីន (Protein) គេសង្កេតឃើញសរីរាង្គរបស់វា បាត់បង់បណ្តារូបធាតុ (Metabolism) ។

ដើម្បីការពារនូវការខ្វះសារធាតុទាំងនេះសំរាប់គោ គេមានផលិតជុំអំបិលខនិចសមាសសំរាប់ឱ្យគោលិត បន្ថែមក្រៅពីការផ្តល់ចំណី។ សត្វងើម និង សត្វចិញ្ចឹមយកទឹកដោះ មានបញ្ហា ខ្វះសារធាតុគីមីជាញឹកញាប់។

២- កត្តារួមផ្សំបង្កជម្ងឺ (Predisposing Factors)

Predisposing factor --ជាកត្តាបង្កឱ្យសត្វងាយទទួលជម្ងឺ។ កត្តារួមផ្សំនេះជាបុព្វហេតុបង្កជម្ងឺ ប្រយោល ដែលមានអំពើយឺតទៅលើសព័ន្ធកាយ។ កត្តាទាំងនេះ -- គឺជាបរិយាកាសនៅជុំវិញលក្ខខណ្ឌទឹក-ដី អាកាសធាតុ ដែលមានឥទ្ធិពលលើសត្វ ហើយបណ្តាលឱ្យសត្វចុះខ្សោយ (Stress) សុខភាព និង ភាពធន់នឹង ជម្ងឺ។ កត្តារួមផ្សំនេះចែកចេញជាពីរ:

- កត្តារួមផ្សំបង្កជម្ងឺខាងក្នុង (Intrinsic)
- កត្តារួមផ្សំបង្កជម្ងឺខាងក្រៅ (Extrinsic)

២-១-កត្តារួមផ្សំបង្កជម្ងឺខាងក្នុង (Intrinsic Predisposing factor) :

អាយុ (Age) --មានជម្ងឺមួយចំនួនរាតត្បាតលើសត្វក្មេងៗខ្លាំងក្លា ធៀបទៅនឹងសត្វជំទង់។ នេះជាលក្ខណៈពិសេសដោយសព្វកាយសត្វក្មេងពុំទាន់មានភាពធន់ និង ភាពស៊ាំបានល្អនៅឡើយ។ កូនសត្វតូចៗ ទទួលភាពស៊ាំពីមេរបស់វាតាមរយៈ ការបៅកូឡូស្ត្រូម (Colo-strum) -- ទឹកដោះ ដំបូងរបស់មេ បន្ទាប់ ពីកើតកូនរួច។ ចំពោះសត្វចាស់ភាពទទួលជម្ងឺកាន់ តែមានកំរិតខ្ពស់ អាស្រ័យដោយការចុះខ្សោយ នៃប្រព័ន្ធ ភាពធន់ និង កំលាំងប្រឆាំងរបស់សព្វកាយទល់នឹងការប្រៀត ចូលពីខាងក្រៅ។ ការខ្វះសមត្ថភាព ធ្វើចលនា និង ការរលាកសន្លាក់ ធ្វើឱ្យការរក្សាស្ថេរភាព កំដៅក្នុងខ្លួនពុំអាចធានាបាន។

ប្រភេទ (Genus/Species): ជម្ងឺមួយចំនួនមានលក្ខណៈពិសេស សំរាប់ប្រភេទសត្វមួយ ដែលខណៈនោះសត្វប្រភេទផ្សេងទៀត ពុំឈឺជម្ងឺនោះឡើយ ដូចជា: មនុស្សពុំឈឺជម្ងឺប៉េស្ត គោក្របី (Rinderpest) ប៉ុន្តែសត្វគោក្របីពុំឈឺជម្ងឺអាសន្នរោគមនុស្សទេ។ គោក្របីឈឺជម្ងឺអុតក្តាម (Foot and Mouth Disease) ប៉ុន្តែសត្វសេះពុំឈឺជម្ងឺអុតក្តាមឡើយ។ ជម្ងឺកញ្ជ្រូលជ្រូក ប៉េស្តជ្រូក ឈឺចំពោះតែសត្វជ្រូកប៉ុណ្ណោះ ។

ពូជ (Breed): ពូជសត្វមួយចំនួនមានលក្ខណៈពិសេស ចំពោះជម្ងឺមួយចំនួន ដែលខុសប្លែកពីសត្វពូជគោសាច់ និង គោសំរាប់កំលាំងអូសទាញ។ គោពូជទឹកដោះ ច្រើនមានជម្ងឺរលាកកន្សោម ដោះ (Mastitis) និង រលាកស្បូន (Endometritis)។

យ- ភេទ (Sex): ភេទនីមួយៗ ញី និង ឈ្មោល មានជម្ងឺដោយឡែកនៅប្រដាប់បន្តពូជរបស់វា។ រលាកស្បូនឈឺតែចំពោះសត្វ ញីប៉ុណ្ណោះ។ ជាទូទៅភេទនាំទៅរកភាពទន់ខ្សោយងាយទទួលជម្ងឺ: ភេទឈ្មោល ងាយទទួលជម្ងឺខ្វាក់មាន់ (Night Blindness) និងរលាកតំរងនោម (Nephritis) ផ្ទុយទៅវិញ ភេទញីងាយឈឺ ជម្ងឺថ្លើម (Liver Disease) ច្រើនជាង ភេទឈ្មោល។

ង- ជម្ងឺផ្សេងទៀត (Other Diseases): ជម្ងឺបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗ ជាកត្តាមជ្ឈិមឱ្យមានការផ្ទុះ ជម្ងឺ (ជាពិសេសចំពោះសត្វដែលមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ -- ងាយឆ្លងជម្ងឺជាងសត្វមានសុខភាពល្អ)។ ភាព ចុះខ្សោយ បណ្តាលពីជម្ងឺទី១ (Primary Infection) សព្វកាយសត្វ ពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់ គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាត នៃជម្ងឺទី២ (Secondary Infection)។ ក្នុងករណីសត្វមាន ជម្ងឺដង្កូវថ្លើម វាមានសភាពស្លេកស្លាំង (Anemia) ដែលធ្វើឱ្យសត្វចុះខ្សោយ។ ម្យ៉ាងទៀតដង្កូវ ថ្លើមបានស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម និង នាំមេរោគពីពោះវៀន នៅពេលកូនដង្កូវចូលដល់ថ្លើម ប្រសិនបើ សព្វកាយខ្សោយនោះ បាក់តេរីទាំងនោះ នឹងធ្វើការរាតត្បាត។

២-២-កត្តារួមផ្សំបង្កជម្ងឺខាងក្រៅ (Extrinsic Predisposing factor) :

ក- លក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុ (Climatic Condition) --ជាធម្មតាសត្វអាចសំរាប់ខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃបរិយាកាសដោយខ្លួនឯង។ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព-សំពាធនិង សំណើមនៃ មជ្ឈដ្ឋានភាពចប់អាប្រអូរ ចង្អៀតខ្វះខាតចេញចូល ជះឥទ្ធិពលដល់ភាពធន់របស់សត្វកាយ សត្វ។ ឧទាហរណ៍: ការចុះត្រជាក់ បណ្តាលឱ្យសត្វមានជម្ងឺប្រដាប់ដកដង្ហើម (Respiratory Disease) ដូចជា រលាកសួត (Pneumonia) រលាកបំពង់ក (Laryngo-Tracheitis) ។

បំបែបនៃកត្តាបរិស្ថាន (Enviromental Factor) បណ្តាលឱ្យសត្វងាយទទួលជម្ងឺ ដូចករណីរាតត្បាត នៃបរាស៊ីតខាងក្រៅ (Ectoparasite) ពុំសូវមានទេនៅរដូវរំហើយ ព្រោះស្បែកសត្វស្ងួត ផ្ទុយទៅវិញពេលមានកំដៅ និង សំណើមគ្រប់គ្រាន់ ការរាតត្បាតដោយពពួក ចៃ តុក កែ មេកម មានសភាពខ្លាំងខ្លា។

ខ- ខ្យល់អាប្រអូរ (Polluted air)

ភាពអាប្រអូរនៃខ្យល់បណ្តាលពីធូលីឧស្ម័នជាដើម ជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យសត្វខ្សោយដែលងាយរលាក។ ការចុះខ្សោយនេះជំរុញឱ្យបាក់តេរីបង្ករោគចូលពីខាង ក្រៅ ឬ មាននៅក្នុងសួតស្រាប់ក្លាយជា Pathogene។ ការសាងសង់ទ្រុងត្រូវតែគិតគូរដល់ដំណើរខ្យល់បក់ចេញចូលបានល្អ។ ដង់ស៊ីតេសត្វក្នុងទ្រុងត្រូវមានចំនួនសមស្រប។ ភាពអាប្រអូរនេះក៏បណ្តាលមកពីទឹកនោម លាមកសត្វ និង ការប្រើប្រាស់ ថ្នាំសំលាប់មេរោគផងដែរ។ ដូច្នោះការយកចិត្តទុកដាក់ បោសសំអាតលាង និងថែរក្សាអនាម័យជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីការពារជម្ងឺ។

គ- លក្ខខ័ណ្ឌ ដី (Soil Condition) --សត្វដែលចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងផ្ទាល់ដី មានលាមក សំណើម និង ទឹកម៉ូត ជាញឹកញយបណ្តាលឱ្យសត្វមានជម្ងឺក្រចកជើងជាញឹកញយ។ ភាពក្រខ្វក់ កំដៅសំណើម នេះផ្តល់លក្ខខ័ណ្ឌ លូតលាស់យ៉ាងប្រសើរដល់ពពួកបាក់តេរីបង្ករោគ។

ឃ- ការផ្តល់ចំណី (Nutrition) --ចំណីជាសារធាតុសំរាប់ការលូតលាស់របស់សត្វ ប៉ុន្តែតាមរយៈ ចំណីមានគុណភាពមិនល្អ និង ផ្តល់ច្រើនហួស ឬ តិចហួស សត្វអាចមានបម្រែបម្រួលនៅលើ ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និង បណ្តាញរូបធាតុ (Metabolism) - បណ្តាលឱ្យមាន រហួស រលាក ឬ រំហែក ក្រពះ។ ចំណីស្ងួតហុយ សត្វដកដង្ហើមស្រូបចូលស្អិត ចំណីសើមអាចផ្ទុះផូរ ដោយមានមេរោគរីក សាយ និងធ្វើ Fermentation។ ចំណីប្រភេទនេះ នាំឱ្យសត្វអាចក្អក រលាកសួត និង ហើមពោះ។ ចំណីមួយចំនួន ជាតិសេសចំណីដែលមានសែលុយឡូសតិចអាចបង្កើតឱ្យមានឧស្ម័ននៅក្នុងក្រពះធំ

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

នៃសត្វទំពៀរអៀង បណ្តាលឱ្យ ហើមពោះ (Bloat/Timpania)។ ដើមហេតុនៃចំណីគ្មានគុណ ភាព អាចបណ្តាលឱ្យសត្វស្លាប់ ដោយសារការហើមពោះសង្កត់ទៅលើសន្ទះទ្រូង និង សួត សត្វ ជាប់ដង្ហើម និង តាមរយៈចំណីសត្វអាចពុល ឬ រាគផងដែរ។ ចំណីជាយាន្តចំលង ប្រភពមេរោគ ច្រើនប្រភេទ ពីស្ថានីយមួយទៅមួយទៀត។

ង- ទឹក (Water): កង្វះទឹកបន្ថយភាពធន់របស់សត្វ ផ្ទុយទៅវិញទឹកក្រខ្វក់ និងទឹករឹង (មានអំបិល រ៉ែច្រើន) បណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វ។ ទឹកជាប្រភព និង ជំរករបស់មេរោគច្រើន ប្រភេទ។

ច- កង្វះចលនា និង ខ្លាញ់លើស (Lack of Movement and Over Fatness): ករណីនេះ កើតឡើងចំពោះសត្វមួយភាគធំ ដែលគេចិញ្ចឹមក្នុងទ្រូង ជាពិសេសមេជ្រូក។ សត្វដែលខ្វះចលនា ភាគច្រើនមានជាលិកាខ្លាញ់ដុះហុំព័ទ្ធសរីរាង្គមួយចំនួនដូចជា ក្រពះ ថ្លើម បេះដូង ដែលបណ្តាល ឱ្យសរីរាង្គទាំង នោះថយនាទី និង រុញស្វិត (Atrophy) ប្រការនេះសត្វមានភាពទន់ខ្សោយផ្នែក ការពារសាតាំងកាយ។ ជាលិកាខ្លាញ់ព័ទ្ធសរសៃឈាម និង បេះដូង ប៉ះពាល់ដល់ចលនាឈាម រត់ និង សុខភាពទូទៅ ជាពិសេសធ្វើឱ្យមានការខ្សោយចុះនៃដំណើរបង្កើតអង្គទឹកការពារខ្លួន។ អតុល្យភាពនៃទម្ងន់ខ្លួនសត្វបណ្តាលមកពីលើសជាលិកាខ្លាញ់បណ្តាលឱ្យសាច់ដុំរុញស្វិត (Atrophy) និង សាច់ដុំទន់ខ្សោយ (Limb Weakness)។

ឆ- ស្ត្រេស (Strees): ដឹកនាំដោយឆ្លងកាត់ក្រពេញអាដ្រែណាលីន (Adrenaline Gland)។ នៅ ពេលមានការភិតភ័យ ឬ ភ្ញាក់ផ្អើល ព័ត៌មាននេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅក្រពេញអាដ្រែណាលីន ដោយ ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ ហើយបង្កើតឱ្យមានអាដ្រែណាលីនចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរត់ បេះដូង លោតញាប់ ដើម្បីទប់ទល់ និង ធានាដល់សកម្មភាព នៃសរីរាង្គទាំងឡាយក្នុងរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែប្រសិនបើ Strees នេះនៅតែបន្តមានរយៈពេលយូរ ប្រព័ន្ធសរីរាង្គសត្វត្រូវចុះខ្សោយ។ Strees អាចបណ្តាលពី ធាតុអាកាសផ្លាស់ប្តូរ ការប្តូរចំណីលឿន ការយក ទឹកដោះច្រើនហួស ការ ប្រើសត្វ ច្រើនហួស ។ល។ ដែលមានអំពើ ធ្វើឱ្យមាន ភាពទ្រុឌទ្រោម នៃសាតាំងកាយ។

៣.សញ្ញាណទូទៅនៃរោគសាស្ត្រ (Definitions of General Pathology)

រោគសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីបម្រែបម្រួល និងកំហុចទ្រង់ទ្រាយនៃ Micro និង Macro Structures។ នៅលើសរីរាង្គ និងជាលិកាពេលមានជម្ងឺ។ រោគសាស្ត្រកាយវិភាគវិទ្យា និងរោគសាស្ត្រសរីរវិទ្យាជាផ្នែកដ៏ធំពីរក្នុងមុខវិទ្យារោគសាស្ត្រ។ Pathology មានន័យថា Pathos ការឈឺចាប់ដែលសិក្សាអំពីគ្រប់បម្រែបម្រួល

និងការបាត់បង់មុខងារព្រមទាំងខូចខាតទ្រង់ទ្រាយនៅក្នុងសារពាង្គកាយ។ បម្រែបម្រួលមុខងារសរីរាង្គ និងទ្រង់ទ្រាយមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយ Pathology គេចែកជា៖

៣. ១. General Pathology : សិក្សាអំពីការវិវត្តនៃរោគសាស្ត្រទូទៅដូចជា៖ Atrophy

Dystrophy Necrosis, Hypertrophy, Regeneration, Imflammation ,Leukosis , Tumor, Abnormal growth etc ។

៣. ២. Special Pathology or Systemic Pathology :

សិក្សាពីជម្ងឺតាមសញ្ញានៃបុព្វហេតុ បង្កជម្ងឺនោះជម្ងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយពពួកបាតុរី រីកស ពពួក Fungus ជាដើម។

ជម្ងឺបង្កដោយប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបង្កឡើងដោយពពួក Trematode (ព្រូនសំប៉ែត), Cestode (ពពួកតនញ៉ា) Nematode (ព្រូនមូល), Carditis, Preicatitis, Anemia ។ល។ បុព្វហេតុបីខាងលើ ព្រមទាំងកត្តាគីមី និងកម្ដៅ ពន្លឺ ព្រមទាំងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញមានមុខងារយ៉ាងសំខាន់ធ្វើអោយបាត់បង់មុខងារបណ្តាលរូបធាតុក្នុងសារពាង្គ កាយការវស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀតផ្នែកនេះសិក្សាផងដែរនូវទ្រង់ទ្រាយសរីរាង្គ និងប្រពន្ធសរីរាង្គពេលមានជម្ងឺផ្សេងៗ។ Pathoanatomy អាចអោយយើងដឹង និងកំណត់បាននូវរយៈពេលដែលសត្វងាប់ តាមរយៈការវិវត្តនៃសាកសព។

ការសិក្សា Pathology រួមបញ្ចូល

- Histopathology
- Pathomorphology

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សានេះ គឺការសិក្សា Normal Anatomy និង Normal Physiology ព្រោះថា Patho-anatomy សិក្សាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាបែបហើយដើម្បីសម្រេចការងារនេះបានគឺ យើងត្រូវចេះដឹងអំពីអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពធម្មតាជាបឋមសិន។ Patho-anatomy ផ្តល់នូវការសិក្សា Pathological Changes នៅក្នុងសារពាង្គកាយ ពេលមានជម្ងឺផ្សេងៗកើតឡើង។ ខ្លឹមសារទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ចំពោះបសុពេទ្យ ព្រោះថាវាជាកន្លឹះសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យអោយបានត្រឹមត្រូវឈានទៅដល់ការព្យាបាល និង ការពារជម្ងឺមានប្រសិទ្ធភាព។

ដើម្បីសិក្សា Patho-anatomy: យើងត្រូវអនុវត្តតាមរបៀបនៃការសិក្សារបស់វា ដែលមានដូចជា:

- ១. ការវះកាត់សាកសព ដើម្បីសិក្សាសរីរាង្គដែលមានជម្ងឺ
- ២. Biopsy ដើម្បីសិក្សាលើផ្នែកខ្លះនៃខ្លួនសត្វពេលសត្វនៅរស់
- ៣ .រៀបចំធ្វើកញ្ចក់ដាំពណ៌ ដើម្បីសិក្សា Histological Process
- ៤ .ការមើល Microscop ប្រើពន្លឺ និងអេឡិចត្រូនិច

៣. ៣. ការស្លាប់ និងការផ្លាស់ប្តូរក្រោយពេលស្លាប់ (Death and its Postmortem):

គ្រាប់ការវះកាត់សាកសព តែងតែកើតឡើងនូវបាតុភូតនៃការស្លាប់ និងបម្រែបម្រួលក្រោយពេលស្លាប់ជានិច្ច។ ការសិក្សា និងបម្រែបម្រួលពីការស្លាប់ ផ្តល់អោយយើងអាចដឹងបានថាតើសាកសពដែលងាប់ នេះបណ្តាលពីបុព្វហេតុអ្វី។

១. Death: ជាការបញ្ចប់មិនត្រឡប់វិញនូវសកម្មភាព និង សរីរាង្គ និងសារពាង្គកាយ។ គេចែកការស្លាប់ជា:

a) Physiological កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយជីវិតទាំងអស់ចុះថយ បន្តិចម្តងៗរហូតដល់បាត់បង់សម្មភាព ច្រើនតែកើតឡើងលើសត្វ ឬមនុស្សចាស់។

b) Pathological: កាលណាកើតឡើងបណ្តាលពីជម្ងឺ ឬ ក៏បណ្តាលពីកត្តានៃអំពើខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ។ការវិវត្តនៃការចុះខ្សោយបន្តិចម្តងៗ ហៅថា Agony បន្តក្នុងរយៈពេលខ្លី ពេលនោះចលនាដង្ហើម ចលនាបេះដូងត្រូវផ្លាស់ប្តូរបាត់បង់រំព្រោច កើតឡើងនូវ Agony ព្រមទាំងបញ្ឈប់ចលនាបេះដូង និងដង្ហើម។

c) Clinical: កាលណាចលនាបេះដូងត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេលណាមួយ បន្ទាប់មកបន្តចលនាបន្តិចទៀតដែលនៅពេលនោះសរីរាង្គទាំងណាយកន្ត្រាភ្លើងវិញនោះវាឈាន ទៅរកការរឹង ហើយរលួយបន្តទៀត។ ការរឹងអាចមានឡើង ២០ នាទីបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ចលនាបេះដូងហើយរយៈពេលនេះវាកើនឡើង ប្រសិនបើគេយកសារពាង្គកាយទៅដាក់នៅកន្លែងត្រជាក់។

d) Biological: គឺជាដំណើរចុះថយសកម្មភាពសារពាង្គកាយ ហើយបន្តសញ្ញាជីវិតត្រូវបានបញ្ឈប់អស់តែម្តង។

e) Cause of Death

១. Paresis and Collapse of Heart

២. Respiratory Collapse ដោយសារមាន Paralysis នៃប្រដាប់ដកដង្ហើម សរសៃប្រសាទ។ ការបញ្ឈប់ចលនាបេះដូង និងដង្ហើមអាចបណ្តាលមកពីដាច់សរសៃឈាម Infact នៃសាច់ដុំបេះដូង។ គេពិនិត្យឃើញតាមរយៈការបាត់បង់ដីពចរ និងរំញោចគ្មានលក្ខខ័ណ្ឌ។

• ការវិវត្តមានដូចតទៅ៖

១. ការចុះសីតុណ្ហភាព

២. ការកករឹង

៣. ការជាំ

៤. ការរលួយ

ក. ការចុះសីតុណ្ហភាព ប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ ១ អង្សាសេចុះចងក្នុងរយៈពេល ១ ម៉ោងរហូតដល់សីតុណ្ហភាពសាកសពស្មើនឹងសីតុណ្ហភាព នៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ

ខ. ការរឹងនៃសាកសព៖ គឺជាការហាប់ណែននៃសាច់ដុំ និងសន្លាក់កើតឡើង ១-២ម៉ោង បន្ទាប់ពីសត្វស្លាប់។ ដំបូងសាកសពស្ថិតនៅកន្លែងមួយមិនផ្លាស់ប្តូរសាច់ដុំទៅជាទន់ សន្លាក់ទន់អាចបត់បានរយៈពេល ៣-៤ ម៉ោងបន្ទាប់មកសាច់ដុំក្លាយជារឹង ពីព្រោះ Glycogen បានបំផ្លាញ ហើយបំផ្លែងជាស្ករដែលធ្វើអោយសាច់ដុំហាប់ណែនរឹង។ បម្រែបម្រួលទៅជារឹងបន្តដល់ ២០-២៤ម៉ គឺវាចាប់ផ្តើមពីសាច់ដុំក្បាល និងបញ្ឈប់នៅសាច់ដុំកន្ទុយមានន័យថា ការវិវត្តន៍ របស់វិវត្តពីក្បាលទៅកន្ទុយ។

បន្ទាប់មកដំណើរការនេះបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយគឺពីកន្ទុយមកក្បាលវិញ។

គ. ការជាំនៃសាកសព៖ កើតឡើងក្នុងរយៈពេល ៣-៦ម៉ បន្ទាប់ពីសត្វងាប់។ ឈាមតាមរឺនបានទៅផ្គុំគ្នានៅបាតសរសៃរឺន ពីព្រោះសរសៃឈាមពេលនេះឈប់កន្រ្តាក់ទៀតហើយ គឺចលនាឈាមនៅនឹងមួយកន្លែងក្នុងសរសៃឈាមបាតកូតនេះហៅថា Hypostasis ដែលជាដំណាក់កាលទី ១។ ស្នាមជាំយើងអាចពិនិត្យឃើញបន្ទាប់ពីយើងបកស្បែកចេញ រយៈពេល ៨-១០ម៉ បន្ទាប់ពីស្លាប់ទឹកងងឹតបានត្រូវប្រមូលផ្តុំនៅបាតសរសៃឈាម ជាមួយនិងកំណកឈាមក្នុងសរសៃឈាមនោះដែរហើយគោលិកាក្រហមបែក (អេម៉ូក្លូប៊ីន) ចេញសរសៃឈាមនេះជាដំណាក់កាលឈាមនៅក្នុងសាកសពមានសភាពផ្សេងៗគ្នា ឈាមកក និងបង្កើតជាដុំនៅក្នុងបេះដូង និង សរសៃឈាម។ សាកសពស្លាប់ដោយពិយាជាឈាមពុំកកទេ។ ដូចច្នោះសភាពឈាមគួបផ្សំនឹងការវិវត្តន៍នៃសាកសពសត្វនេះអាចអោយគេសិក្សារកបុព្វហេតុ ដែលបណ្តាលអោយសត្វស្លាប់បាន។

ឃ. ការរលួយនៃសាកសព៖ កើតឡើងពីព្រោះអង់ស៊ីមបំពេញតួនាទីរបស់វា។ បរិមាណអង់ស៊ីមដែលច្រើនស្ថិតនៅក្នុងពោះវៀនហើយការរលួយចាប់ផ្តើមពីកន្លែងណាដែលសម្បូរដោយអង់ស៊ីម។ ការធ្វើឡើងជាមួយពពួកបាក់តេរី មីក្រូផ្លូវ៉ា ពពួកអតិសុខមប្រាណដទៃទៀតក្នុងសារពាង្គកាយសត្វបានត្រូវបំបែកដៃបណ្តាលអោយសាច់ផុយរលួយ។ ពពួកបាក់តេរីដូចជា B. pulrificus, B. perfringens , Coli ។ល។ បំបែកធ្វើអោយសាច់រលួយហើយបង្កើតជាសារធាតុដូចជា៖

- ប្រូតេអ៊ីន
- អាស៊ីត
- ឧស្ម័ន មេតាន, អម៉ូនីញ៉ាក់....

ឧស្ម័នរបស់សាកសពមានក្លិនស្អុយខ្លាំង ឬ ក៏ក្លិនរលួយ។ ការរលួយមានដំណើរប្រព្រឹត្តទៅលឿនប្រសិនបើមានសំណើម និងកំដៅ។ H2s ផ្សំជាមួយអម៉ូក្លូប៊ីនបង្កើតបានជា Sulphohemoglobine ដែលមានពណ៌លឿង ឬ លឿងទំ។ ហេតុច្នេះហើយបានជាការដាំដំបូងមានពណ៌ក្រហម បន្ទាប់មកមានពណ៌លឿងទំទៅវិញ។ ការរលួយនៃសាកសពប្រព្រឹត្តទៅជាមួយការបង្កើតឧស្ម័ន និង ការប៉ោងរលួយ។ ការរលួយនេះបញ្ចប់ដោយការបំបែកសារធាតុគីមីនៃសារពាង្គកាយ។

៣. ៣. ១ អត្ថប្រយោជន៍នៃការរលួយនៃសាកសព

- ១.កំណត់រយៈពេលនៃសត្វស្លាប់
- ២.កំណត់ស្ថានភាពនៃសត្វស្លាប់ (វាជួលដេកទៅស្តាំ ឬឆ្វេង)
៣. ស្លាកស្នាមជាំអាចសម្គាល់បាននូវការសំលាប់សត្វ

៣.៤ Necrosis, Type of Necrosis and Patho-morphogenesis

៣.៤. ១. Necrosis

ពេលមាន Necrosis កោសិកាបានត្រូវខូចខាត ខែលបណ្តាលអោយខូចខាតដល់សរីរាង្គ និងសារពាង្គកាយ។ សរីរាង្គកាយ ឬកោសិកាដែលមាន Necrosis បាត់បង់ទាំងស្រុងបញ្ឈប់មុខងាររបស់វាមិនអាចសះស្បើយឡើងវិញ។ មុននឹងកើត Necrosis ដំបូងកើត Necrobiosis ជា Process បញ្ឈប់នូវសកម្មភាពជីវិតនៃកោសិកាបណ្តាលអោយកោសិកាបាត់បង់នូវទំរង់របស់វា។ Necrosis និង Necrobiosis គេសង្កេតឃើញលើសារពាង្គកាយធម្មតាដែរ ឧទាហរណ៍ Epytelia ស្បែកស្រទាប់ក្តាសកោសិកាយាម។ល។ វាតែងតែងាប់ និងផ្លាស់ប្តូរជាប្រក្រតី។ Pathological បណ្តាលមកពីបុព្វហេតុផ្សេងៗគឺ៖

- មេការនិច
- ជីវសាស្ត្រ
- គីមី
- រូបសាស្ត្រ

Paralysis of Nervous System

- ខូចសរសៃឈាមក្នុងកោសិកា

៣.៤. ២. ប្រភេទ Necrosis (Type of Necrosis)

តាមបុព្វហេតុគេចែក Necrosis ជា:

- ផ្ទាល់
- មិនផ្ទាល់

ក. Necrosis ផ្ទាល់: មានកន្លែងដែលទទួលការប៉ះទង្គិចផ្ទាល់គឺ (Necrosis) បណ្តាលពីការ កៀប, ដំបៅមានកំដៅ ឬ គ្មានកំដៅ និងរលាកបណ្តាលមកពីភ្លើង ឬ ចរន្តអគ្គិសនី ឬ ដោយសារធាតុគីមី, Toxin of Brateria or Parasite ។ ឧ.ជម្ងឺ Tuberculosis មាន Necrosis នៅ Organs ផ្សេងៗដូចជា: សួត (Lung) ពោះវៀន (Intestine)

ខ. Necrosis មិនផ្ទាល់ជា Necrosis ដែលកើតឡើងបណ្តាលពីការបាត់បង់តួនាទីរបស់ប្រពន្ធសរសៃ (Nervous System) និងប្រពន្ធឈាមរត់ (Blood cycle system) គឺវាពុំមែនបណ្តាលពីកត្តាដោយផ្ទាល់ទេ។ ការបាត់បង់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ ទាំងនេះបណ្តាលអោយជាលិកាខ្វះការត្រួតពិនិត្យ និងចំណីអាហារ។ ខ.សរសៃប្រសាទថ្លើមស្លាប់ ដូចនេះថ្លើមទទួលបាន ឬ សរសៃឈាមចូលថ្លើមស្ទះក៏បណ្តាលអោយ

Necrosis នៅថ្លើមដៃ ព្រោះថ្លើមខ្លះឈាមដែលជាចំណីអាហារផង ជាអ្នកដឹកនាំអុកស៊ីសែនទៅអោយជាលិកា និងនាំឧស្ម័នការបូនិចមកស្អិតវិញ។

គេជួបប្រទះ Allergical Necrosis ផងដែរ។ ១. ការចាក់ថ្នាំ ឬ ក៏សេរ៉ូមនៅកន្លែងដដែលៗគេសង្កេតឃើញមាន Necrosis of Tissue។

៣.៤.៣. Pathological signs (Forms)

A_ Macroscopically forms (Patho_anatomy)

ក/ ពណ៌ Necroses: នៅលើ Organs Parenchima ពេល Necroses ពណ៌ពិតពីការដាច់សរសៃឈាមពេលនោះ Necroses មានពណ៌សប្រផេះ។ បើបណ្តាលពីស្ទះសរសៃវ៉ែន Necroses មានពណ៌ក្រហម។ នៅពោះរៀនដំបៅ Necroses មានពណ៌លឿងខ្ចី ឬបៃតង។ ដំបៅ Necroses លើស្បែកមានពណ៌ក្រហមជាំ។

ខ/ មានសភាពមិនផ្លាស់ប្តូរ (Cosistance)

- ស្នូត ហាប់ (រឹង) ព្រោះមានឈាមកក (Coagulation Necrosis)
- សើម ទន់ មានសំណើមដោយ (Colliquative or Liquefection)
- Gangerne រាវមានភាពជា Gangerne ស្នូតពីព្រោះរឹង (ហាប់ណែន) ដោយសារមានកំណកឈាមដែលបណ្តាលពីបណ្តាញហ្វីប្រីន នៃឈាម។

✦ Necroses ស្នូត: ប្រព្រឹកទៅដោយមានសំណាក Protein នៅក្នុងកោសិកានៅក្នុង Plasma នៅក្នុងចន្លោះកោសិការ។ វាមានពណ៌ស មានសភាពហាប់ណែនពេលគេកាត់វា នោះផ្ទៃរបស់វា (មុខកាត់)មានសភាពស្នូត។

✦ Necroses សើម:ប្រព្រឹកនៅកន្លែងណាដែលសំបូរសារធាតុរាវ ដូចជាទឹកដើមដូចនៅក្នុងខ្នងខ្នាតនៅថ្លើម។ល។

Gangerne: ជា Necrosis of tissue ដែរដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្យល់នៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ វាប្រព្រឹកទៅដោយវត្តមាននៃសំណើម, សីតុ, ណ្តាភាព, កំដៅ ពេលមាន Infection ជាដើម។ ដំបៅមានពណ៌ផ្សេងៗ

ដូចជា ពណ៌បៃតង, ពណ៌ប្រផេះ, ពណ៌ក្រមៅជាដើម។ គេជួយប្រទះ Gangene នៅលើទឹកដោះគោ, ស្នូត រឹងស្បែកគេជួប ប្រទះប្រភេទ Gangene ដូចជា៖

- Gangene ស្នូត

- Gangene សើម

ក. Gangene ស្ងួត: (Munification) កើតក្រោមអំពើកម្ដៅទាប, ការពុល, ជម្ងឺកញ្ជិល, Leptospirosis ។ នៅលើដំបៅ Gangene ស្ងួត អេម៉ូក្លូប៊ីន (Haemoglobine) ក្លាយជា Sulfo-hemoglobine ដែលមានពណ៌ខ្មៅហើយស្បែកស្ងួត។

2. Gangene សើម ឬគេហៅថា Gangene រលួយ ឬគេហៅថា Gangene Cepticum គឺជាការបង្ហាញកោសិកាងាប់ទៅជាសារធាតុរាវ។ ពេលមានពពួក Bacteria Gangene នេះរីកតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ Gangene ប្រភេទនេះគេប្រទះឃើញនៅ ក្នុងស្ងួត, ពោះវៀន, ស្បូន បន្ទាប់ពីមានការរលាក ឬ Gaemorgic infact ហើយ Gangene ហើយប្រភេទនេះមានក្លិនស្អុយមុតណាស់។

B. Microscopically (Patho-Gystology)

ជាទំរង់យ៉ាងសំខាន់របស់ Necrosis ដែលគេពិនិត្យឃើញនៅក្នុងបម្រែបម្រួលណ្ឌូយ៉ូកោសិកា ហើយចែកជា:

1_ Karyorhtis: ជាការរំលោភណ្ឌូយ៉ូ ឬ ចែកណ្ឌូយ៉ូជាផ្នែកៗ

2_ Krayolysis: ការរលាយនៃណ្ឌូយ៉ូ។ ក្នុងដំណើរនៃ Necrosis ជួនកាលបណ្តុលអោយរលាយ Chromatine ហើយធ្វើអោយណ្ឌូយ៉ូរលាយ និង ជ្រាបវិបាត់រូប។

3_ Karyopyknos: ណ្ឌូយ៉ូកោសិកាមានភ្នាសមិនស្មើជ្រុង ឬ ណ្ឌូយ៉ូខូចទម្រង់ហើយក្លាយជាហាប់ណែនរួមមាឌ។

4_ រលាយ Vacuole: នៃណ្ឌូយ៉ូ គឺជាការបង្កើត Vacuol នៅក្នុង Cytoplasm បង្កើត Plasmolysys។

៤. លទ្ធផល Necrosis

នៅជុំវិញ Necrosis បង្កើតជាតំបន់រលាកយ៉ាងខ្លាំង។ ជាលទ្ធផលការងាប់ជ្រាបរលាយបាត់ បង្កើតជាលិកាថ្មីមកជំនួស នេះជា Procces ដែលគេហៅថា organization ឬ ការរលាយ។ ប្រសិនបើការរលាយមិនប្រព្រឹកឡើងទេ ពេលនោះជុំវិញ Necrosis បង្កើតជា Capsul ហើយជាលិកាភ្ជាប់ (ចំណង) ដែលហៅថា Incapsultion នៅក្នុង Capsul ផ្សំជាមួយសារធាតុខនិក (Ca, P) process គេហៅថា Multification.

៣.៥ ATROPHY and TYPE of ATROPHY and PATH-MORPHOGENESIS

៣.៥.១- Atrophy:

គឺជាការខូចខាត និង បំផ្លាញបណ្តារូបធាតុនៃកោសិកា ដែលបណ្តាលពីបំប្លែងក្នុងជាលិកាសរីរាង្គ ។ វា ដឹកនាំទៅរក Necrosis ឬ ការស្លាប់នៃកោសិកា ឬ សរីរាង្គ ។ ដំបូងសារពាង្គកាយបន្តទៅរក លក្ខខណ្ឌបំប្លែង នៃបណ្តារូបធាតុ គឺ Hypertrophy ប្រតិកម្មផ្សេងទៀត ដែលជា Process ឱ្យសារពាង្គកាយអាចការពារទប់ទល់បាន។ ដូច្នោះ Atrophy ជាបំប្លែងនៃទំហំកោសិកា ដែលបណ្តាលឱ្យ កោសិកាស្ងួតតូច ហើយខ្សោយ មិនអាចបំពេញមុខងារដូចប្រក្រតី ។

៣.៥.២-Type of Atrophy:

គេចែក Atrophia ជាថ្នាក់តាមកត្តាដែលបង្កឱ្យមានឡើង:

១- Physiological Atrophy: ជា Process ធម្មតា ដែលរមែងកើតឡើងចំពោះសត្វ មានសុខភាពល្អ។ Ex: ស្បូន, កន្សោមទឹកដោះ គឺរួមតូច និង រីកធំក្នុងពេលកំណត់ មួយ ។ មួយទៀតកោសិកា និង ជាលិកាសរីរាង្គស្ងួតតូចបន្តិច ម្តងៗពេលសារពាង្គកាយ កាន់តែចាស់ ។

២- Starvation Atrophy

៣ - Pathological Atrophy: បណ្តាលពីកត្តាចង្រៃមួយចំនួន ដែលគេចែកវាជា

- Atrophyទូទៅ : គឺសារពាង្គកាយសត្វទាំងមូលទៅជាស្នម មានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ ។ Ex:ជម្ងឺ ប្រសាទ ជម្ងឺក្រពេញ Endocril ជាដើម ។

Atrophy ផ្នែក: គេចែកជា ៦ ប្រភេទ:

១. Neurotrophic atrophy : សាច់ជុំស្បែក និង សេរីរាង្គផ្សេងទៀតទទួល Atrophy បណ្តាលពីការបំផ្លាញសរសៃបញ្ជូនព័ត៌មាន ដោយបុព្វហេតុផ្សេងទៀត ទទួល Atrophy បណ្តាលពីការបំផ្លាញ សរសៃបញ្ជូនព័ត៌មានដោយបុព្វហេតុ ផ្សេងៗ ។

២. Atrophy: កើតឡើងបណ្តាលពីខូចប្រព័ន្ធលាម វាកើតឡើងព្រោះសរសៃឈាមរួមតូច បណ្តាលពីរលាកសរសៃឈាម ផ្ទៃសរសៃឈាម ហើយធ្វើអោយរន្ធសរសៃរួមតូច សរីរាង្គ និង ជាលិកាខ្វះឈាម និង បណ្តារូបធាតុផ្សេងៗ ។

៣. Endocrine Atrophy: បណ្តាលពីបាត់មុខងាររបស់ ក្រពេញ កោសិកា ។ ១. ការគ្រៀវ ធ្វើឱ្យពងស្វាស ឬ ស្បូនទទួល Atrophia

៤. Atrophy : បណ្តាលពីការខ្សោយឬ សកម្មភាពសរីរាង្គ ឬជាលិកាបានត្រូវបញ្ឈប់។

៥. Atrophy: បណ្តាលពីអំពើនៃសំពាធ ។ វាកើតឡើងក្រោមឥទ្ធិពលនៃ អំពើ ។

៦. Atrophia : បណ្តាលពីកត្តាគីមី និង កត្តារូប។ ១. កម្មស្នីX : កម្មស្នី ធ្វើឱ្យខូច កោសិកា ខួរក្បាល ឬ ជួនកាលបញ្ចូលឱ្យ Atrophia ខួរឆ្អឹងទៀតផង ។

៣.៥.៣-Morphogenesis:

Microscopically. មើលក្នុង Microscop_ យើងឃើញទំហំកោសិកាតូច។ ទៅស៊ីតូប្លាស មាន គ្រាប់ៗ ជាច្រើនមានពណ៌ត្នោត គឺជាផលិតផលនៃបណ្តុររបេធាតុ ។ Atrophia ដូចនេះគេជួបនៅឆ្អឹង ហើយគេ ហៅថា Atrophia ពណ៌ដី (ត្នោត) ។ ណ្ហែយ៉ូក៏រួមតូចដែរ គេសង្កេតឃើញមាន Atrophia ។ ទៅជាលិកា ខ្លាញ់ក្នុងកោសិកាផ្ទុកទៅដោយសារជាតុពណ៌ប្រផេះគឺជា Atrophia ខ្លាញ់ ។ នៅសរីរាង្គវិញកោសិកា Parenchima រួមតូច ។ សំពាធឈាម ផ្ទុយទៅវិញ វាលូតលាស់កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងកោសិកា។ ពេលមាន Atrophia នៅសាច់ដុំ ជាលិកាសាច់ដុំក្លាយទៅខ្លាញ់ ។

៣.៥.៤- លទ្ធផល Atrophia:

គឺជាការស្ថិតតូចនូវកោសិកា Parenchima ប៉ុន្តែពេលកោសិកា ចាស់វាជំនួសអោយកោសិកាថ្មីនេះជា Atrophia នៃ Process ត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញ ។

៣.៦ ខ្លឹមសារនៃបំបែបរូប Dystrophy និង

អត្ថប្រយោជន៍របស់វា នៃសារពាង្គកាយ

៣.៦.១ ខ្លឹមសារនៃ Distrophia:

ជាការប្រែប្រួលនៃល្បាយអង្គធាតុគីមី ទំងន់កោសិកា និង ជាលិកា ដែលទាក់ទងទៅនឹង លក្ខខណ្ឌចំណី អាហារ និង បណ្តារូបធាតុនៃកោសិកា ឬ សរីរាង្គ ។

- ❖ និមិត្តរូបអាចបណ្តាលពី
 - មានគុណភាពអង្គ
 - - លក្ខណៈនៅរបស់សត្វ
 - - អំពើនៃកត្តា Pitical Climistry ឬ Mechanism
 - - ការឆ្លងដោយមេរោគ
 - - ជម្ងឺប្រដាប់ឈាមរត់
 - - ជម្ងឺសរសៃប្រសា
 - - បំបែបរូបនៃក្រុម Endocril

Process របស់ dystrophia គេជួបប្រទះពេលមានជម្ងឺគ្រប់ប្រភេទ។ មូលដ្ឋាននៃ Distrophia គឺការខូចទ្រង់ទ្រាយ និងមុខងាររបស់ជាលិកា និង Process របស់អង្គស៊ីម។ គេចែក Distrophia ជាប្រភេទ:

1. -Decomposition បំបែបរូបទំងន់, Protein, សារធាតុខ្លាញ់ និង សារធាតុរ៉ែ។
2. Infiltraline:
3. Tranformation ជាការបង្ហាយ Protein ទៅជាខ្លាញ់ និង សារធាតុកាបូន ។ ការបង្ហាយ Glucose ទៅជា Glycogene ដែលផ្ទុកនៅក្នុងកោសិកា ។
4. បំបែបរូបសំយោគសារធាតុ Protein, ខ្លាញ់. សារធាតុកាបូន ត្រូវបង្កើតច្រើន ឬ តិចខុសពីធម្មតា ។ ព្រោះធម្មតាសរីរាង្គផលិតគ្រប់ល្បាយ តាមតំរូវការ ។

❖ **Microscopically**

មានលក្ខណៈជាការផ្លាស់ប្តូរនៃទ្រង់ទ្រាយ និង ធាតុផ្សំរបស់កោសិកា និង ជាលិកា។ ក្នុងស៊ីតូឡូសនៃកោសិកាគេឃើញ:

- គ្រាប់ៗ

➤ តំណក់ខ្លាញ់

➤ - Crystall

❖ **Macroscopically**

គេសង្កេតឃើញមានការប្រែប្រួល ពណ៌ ទ្រង់ទ្រាយ, ទំហំ, សភាព (Consistance) ជាដើម ។ កាលណាបំបែបបែបនេះ ប្រព្រឹត្តទៅមានល្បឿនខ្លាំងនោះ Process របស់វា គេហៅថា Degeneration ។

៣.៦.១ - Clinical Signs of Distrophy:

- បំផ្លាញមុខងាររបស់សរីរាង្គ
- ខូចដំណើរសំយោក Protein សារធាតុកាបូន
- រាំងស្ទះសកម្មភាពបេះដូងដូង ថ្លើម តំរងនោម ប្រសិនបើយើងលុបបំបាត់និមិត្តហេតុដែលធ្វើឱ្យមាន Distrophy នោះវានឹងបាត់ទៅវិញ ។ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើនិមិត្តហេតុនេះនៅតែបន្តនោះ Distrophy ក្លាយជា Degeneration ហើយបន្ទាប់មកទៅជា Necrobiosis និងទីបំផុតទៅជា Necrosis។

៣.៧. ចំណែកផ្នែកនៃ Distrophy និង អត្ថប្រយោជន៍របស់វា

៣.៧.១ .ចំណែកផ្នែកនៃ Distrophy:

អាស្រ័យដោយប្រភេទបណ្តារូបធាតុ Distrophy គេចែក ចេញជា៖

- Proteine Distrophy
- Lipid Distrophy
- Hydrocarbon Distrophy
- Mineral Distrophy
- Genetical Distrophy
- Gangrene បណ្តាលពីជម្ងឺផ្សេងៗ (Distrophy Cause by disease)

ក. Protein Distrophy: ចែកជា:

- a. Tissue dioproly ជាការផ្តួចៗបបាតុ Prote នៅក្នុងកោសិកា ។
- b. Extro-Distrophy: ជាការផ្លាស់ប្តូរបញ្ហារូបធាតុនៅក្រៅកោសិកា

គឺនៅបន្ទាបមួយទៅកោសិកាមួយ ។ វាមាន

- Muscle
- Fibrinous
- Amyloid

c. Tissue Distrophy. Lipid

ខ. Lipid Distrophy :

- Parenchima
- Mesentary

ក. Hydrocarbhone Dictrophy: ជាការប្រែប្រួលនៃបណ្តារូបធាតុ, សារធាតុកាបូនក្នុងសារពាង្គកាយ:

- កើនបរិមាណ Glycogene ក្នុងសរីរាង្គ និង សាច់ដុំ
- ថយបរិមាណ Glycogene ក្នុងសរីរាង្គ និង សាច់ដុំ
- Glycogene ផ្ទុកនៅក្នុងសរីរាង្គបំពេញនាទីជា Toxin

ឃ. Miniral : ពេលប្រែប្រួលបណ្តារូបធាតុរ៉ែ គេសង្កេតឃើញមានការបង្កើតជុំថ្ម និង Proteine

- ជុំរឹងបង្កើតពីរុក្ខជាតិ ដូចជាស្លឹកឈើ, ស្មៅ...

➢ ជាជំងឺដែលបណ្តាលឱ្យស្ទះពោះវៀន ឬ ស្ទះក្រពះ បង្កើតពីការផ្គុំគ្នានៃសរសៃសក់ ឬ រោមសត្វ ។

❖ ការចុះថយនៃអំបិល Ca កើតមាននៅពេលសត្វមានជំងឺ Rachit Osteomalosia និង Osteo-Distrophy

❖ Pathology នៃអំបិល Ca នៅក្នុងជាលិកា អំបិល Ca អាចបណ្តាលឱ្យជាលិកាទទួលនូវ៖

- Dystrophic
- Matabolitic

៣.៧.២. Protein Dystrophy:

គឺជាបំបែកបំប្លែងនៃទម្រង់របស់សារធាតុ Protein ឬ

ក៏ជាបំបែកបំប្លែងនៃល្បាយសារធាតុគីមីនៅក្នុងសមាសធាតុ Protein ។ គេចែកជា៖

១. Dystrophy មាន គ្រាប់ : ជួបប្រទះញឹកញាប់ លើកោសិកាសត្វមានជំងឺឆ្លង, ពុល ឬ ចំណីខ្វះគុណភាព ។ Dystrophy ប្រភេទផ្តើតជាគ្រាប់ៗនៃ Protein នៅក្នុងស៊ីតូប្លាស ។

❖ និមិត្តរោគ៖ បណ្តាលពី៖

- ការសំយោគ និង បំបែក Protein ពុំសមស្រប
- បំប្លែងសារធាតុកាបូន និង ខ្លាញ់ទៅជា Protein មិនស៊ីចង្វាក់គ្នា (Pathologic Transformation)

➢ នៅថ្លើម, តំរង់នោម, បេះដូង , និង គ្រោងសាច់ដុំ ។ ពេលនោះកោសិកាវីកធំ មានទំហំផ្សេងៗគ្នា ស៊ីតូប្លាស ឡើងល្អក់ មានគ្រាប់កក នៃ Proteine ហើយគ្មានកោសិកាមើលមិន ឃើញច្បាស់ទេ ។ សរីរាង្គដែលរងនូវបំបែកបំប្លែងនេះ (សរីរាង្គមានជំងឺ) វីកធំ ហើយមាន សភាពទន់ខ្លាំង។ មានពណ៌ស -ប្រផេះ ។ Process នេះអាចជួសស្រាលឡើងវិញបាន ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើពុំជួសស្រាលទេនោះវាវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងររលាយកោសិកា Hydrolytic Dystrophy រឺ Necrosis ។

❖ រលាយ Protein :

វាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស នៃកោសិកា ហើយ Process រលាយជាទឹកថ្លា នៅលាយជា មួយស៊ីតូប្លាស

• និមិត្តរោគ

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

- ការរាតត្បាត នៃ Bacteria

- ការពុល Poison

- Allergy នៅស្រទាប់អិលនៃថ្លើម, តំរងនោម, ស៊ីតូប្លាស នៃកោសិកាដិតជាម និង បំពេញផ្ទៃកោសិកា

❖ **Hydrolic Distrophy** ជាការបំផ្លាញបណ្តារូបធាតុប្រូតេអ៊ីន និង ទឹកពេលនោះ ទឹកស្អិតនៅក្នុងកោសិកា ។

• **និមិត្តហេតុ**

- ការរាតត្បាតនៃ Bacteria

- ពុល

- លោក

- សត្វស្នម ។ល ។

ទឹកនៅក្នុងកោសិកាស្អិតនៅជាម៉ូលេគុលសេរី ដែលបានមកពីសារធាតុរាវនៅក្នុងជាលិកា។ នៅក្នុង កោសិកាអិលនៃថ្លើម, តំរងនោម, សាច់ដុំ និង សរសៃប្រសាស គេឃើញមានសញ្ញាគ្រាប់ៗការបង្កើតជា Bacteria ដែលដក់ទៅដោយទឹក ។ ណ្ឌយ៉ូ និង ស៊ីតូប្លាសលាយចូលគ្នា បន្សំតែភ្នាសកោសិកាប៉ុណ្ណោះ ។ កោសិកាមាន ទំងន់មូលទ្រវែង បន្ទាប់មកក្លាយជា Necrosis។

❖ **Keratosi** : បង្កើតសារធាតុស្នែង

ពេលមាន Distrophy នេះកោសិកា គេពិនិត្យឃើញមានសារធាតុក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននៅតាមកន្លែងដែលកោសិកាមិនធ្លាប់មាន ។

• **និមិត្តហេតុ:**

-ខ្លះ: Vitamin A

-ខ្លះ: Protein

-ខ្លះសារធាតុខនីច Zn, P, Ca ។

ស្រទាប់អិលនៃកោសិកាស្តីកមិនយឺតល្អ ហើយក្រាស់មានរដ្ឋជាច្រើន ស្នែងដុះមិនស្មើល្អ
ស្បែក ជ្រួញ ។

**៣.៨ Hyperemia រលនៃ និង ម៉ែន
និងលក្ខណៈនៃទ្រង់ទ្រាយរបស់វា**

Hyperemia : គឺជាការស្ទុះ ឬ ការផ្អាកចលនាឈាមរត់ និង ចលនា Limpha នៅក្នុងជាលិកា។ គេចែកវាជា៖

- ផ្អាកចលនាឈាមទូទៅ
- ផ្អាកចលនាឈាមដោយផ្នែក

៣.៨ ១- ផ្អាកចលនាឈាម និង Limpha ដោយផ្នែក

នៅកន្លែងដែលទទួលរងនូវការប្រែប្រួល នៃចលនាឈាមកើតមាន៖

- Hyperemia
- Ciaz
- Haemorrhage
- Thrombosis
- Embolism
- Thrombo-embolism
- Anemia
- Infarction

❖ **Hypeema អាទែ**: កាលណាចរន្តឈាមបេះដូងធម្មតា ឬ កើនឡើង ប៉ុន្តែចរន្តឈាមបេះដូង គ្រប់គ្រាន់។

- និមិត្តហេតុ រលាក, កិត្តា Mecanhism, កិត្តា Neurolysis

❖ **Hyperemian Vein**: កើតមានកាលណាចរន្តឈាមចូលបេះដូងមិនគ្រប់គ្រាន់ បណ្តាលឱ្យហើមសរីរាង្គ ។

- **និមិត្តហេតុ**: សំពាធលើ (Vein) សរសៃរ៉ែន, Thrombosis រ៉ែន, ខ្សោយបេះដូង ឬ រីកបេះដូង។

៣.៨ ២ -លក្ខណៈ

Hyperemia រ៉ែននៅក្នុងស្បូតជាញឹកញាប់ ។ Hyperemiaរ៉ែនយូរបណ្តាលឱ្យមាន Hyperemia នៅសរីរាង្គ ។

៣.៩ Stasis and Haemorrhage

៣.៩ ១ – Stasis :

គឺជាសភាពនៅនឹងថ្នល់នៃចរន្តឈាមនៅក្នុងសរសៃ ។

• **និមិត្តហេតុ :** យូរ, រលាក

Hyperemia យូរធ្វើឱ្យខ្វះបរិមាណឈាមទៅចែកចាយដល់កោសិកា បណ្តាលឱ្យចរន្តយឺតងាយស្ទុះសរសៃឈាម ។ ការស្ទុះ សរសៃឈាមបណ្តាលឱ្យឈប់មានចលនា ។

៣.៩ ២-Haemorrhage:

ជាការហូរឈាមចេញពីសរសៃឈាម នៅពេលសត្វនៅមានជីវិតនៅឡើយ ។ គេចែកជា៖

1. ការហូរឈាមចេញមកក្រៅ
2. ការហូរឈាមចូលទៅក្នុង

❖ **និមិត្តហេតុ**

- ហែក ឬ ដាច់សរសៃឈាម
- អំពើ Mechanique
- អំពើគីមី
- Necrosis សរសៃឈាម
- រន្ធសរសៃឈាមរីកធំ
- ពុល

Haemorrhage អាចមានទ្រង់ទ្រាយ:

- ស្រួចស្រាវ
- រាំរ៉ៃ

និង អាចចែកជា៖

- ហូរចេញពីបេះដូង
- ចេញពីអាទែ
- ចេញពីវ៉ែន
- ចេញពីសរសៃតូចៗ

នៅតាមជាលិកាគេសង្កេតឃើញឈាមហូរមានសភាពយឺត និង មានលក្ខណៈជាំក្រហម ។

កាលណា Haemorrhage គេប្រទះឃើញនៅពេញសរីរាង្គនោះ Process របស់គេហៅថា Hemorrhage ដែលបណ្តាលពីរន្ធសរសៃឈាមរីកធំ ។

កាលណា Haemorrhage គេប្រទះឃើញនៅចលនាជាលិកា Process គេហៅថាការ ជាំ ។

៣.១០ Anemia និង Infarction

៣.១០.១ Anemia

Anemia ជាលក្ខណៈ Pathology គឺជាស្ថានភាពនៃការចុះថយចំនួន (បរិមាណ) គោលិកក្រហម(Red blood cell) នៃឈាម និង Haemoglobine (HB) នៅក្នុងបរិមាណឈាម (ចុះថ្នាក់គរយ) ។

- និមិត្តហរតុ

- រួមសរសៃអាទែ
- Thromboid
- Embolism
- Hypoxia

Anemia: អាចបញ្ជាក់ដោយ Infarction or Necross ។ ទំរង់ Anemia គឺសំខាន់ ៗ គឺ

១- Anemia: បន្ទាប់ពីការហូរឈាម ពេលធ្វើការវះកាត់ ឬ របួសក្រោយមកមាន Necrosis

២-Anemia: កំពុងហូរឈាម: ជា Anemia ដែលបាត់បង់គោលិកក្រហម និង Haemoglobine នៅក្នុងឈាម ។

៣.១០ ២ Infarction:

ជាផ្នែកដែលជាលិកាងាប់ ដែលបណ្តាលពីមានការហុំព័ទ្ធនៃអាទែ ដែលមិនបង្កើតខ្លែងសរសៃឈាម (Collateral cirenlation) ម្យ៉ាងទៀត Infarction គឺជាផ្នែកនៃ

ការរកករបស់ Necrosis (Coagulative Necrosis) ។ ហេតុនេះសរសៃអាទៃពេលនេះ ខ្វះសមត្ថភាពចិញ្ចឹមជាលិកា ដោយបុព្វហេតុផ្សេងៗ ។

បុព្វហេតុសំខាន់នៃ Infarction គឺ (ខ្វះ O₂) ហើយ Infarction អាចកើតឡើងដោយហេតុ មាន Embolism និង Thrombosis ដែលនាំឲ្យកោសិកាខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម និង o₂ ។ នៅក្នុងកោសិកា ខូច Process អុកស៊ីដកម្ម បន្ទាប់នូវផលិតផល មិនចាំបាច់នៅក្នុងស៊ីតូប្លាសនៃកោសិកា ធ្វើឲ្យមាន Acantosis (លក្ខណៈធ្វើឲ្យស្បែកក្រិនក្រាស់) នៃស្បែកបណ្តាលឲ្យមាន Hyperlasia នៃកោសិកា លក្ខខ័ណ្ឌនេះអាច ឬ មិនអាចកើតមានរូបមានជាមួយ Keratosis និង Parakeratosis ។

តាមលក្ខណៈ Infarction យើងចែកជា:

- Infarction ស
- Infarction ក្រហម (Hemorrhage)
- **និមិត្តហេតុ:**
 - Thrombosis and Embolus
 - Pressure on the Vesel Wall Causing inchamia
 - ការរួមនៃសរសៃឈាម
 - Hypotension

Anemia អាចបញ្ចប់ដោយ Infarction ឬ Necrosis ។ ទំរង់ Anemia សំខាន់ៗ គឺ

១- Anemia បន្ទាប់ពីការហូបឈាម ពេលធ្វើការវះកាត់ ឬ របួស ក្រោយមាន Necrosis ។

២- Anemia កំពុងហូរឈាម ជា Anemia ដែលបាត់បង់កោសិកាក្រហម និង Haemoglobine នៅក្នុងសរសៃឈាម ។

- Infarction អាចមាន:

១- Infarcts of Kidney ច្រើនមានចំពោះគោ ជ្រូក ។ មានពណ៌លឿង ឬ ស្បែក (pale) នៅផ្នែក Cortex ។ លើសត្វគោជម្ងឺ C. Pyosenes or Strptococci លើជ្រូក បណ្តាលពី Erysipelothris rhusiopathiae ។

២- Infarcts of the spleen អាមានពណ៌ Pale ឬ Red ប្រសិនបើមានបំពេញដោយ ឈាម ។ Splenic infarcts ច្រើនមាននៅតែមដាល ។ ចំពោះផ្លែអាចជួបនៅពាសពេញ Spleen ។ Infarcts នេះបណ្តាលពី Cardiac thrombi ។

៣- Infarcts of the Hear ពុំសូវជួបលើសត្វទេ ប៉ុន្តែញឹកតាមចំពោះមនុស្ស ។ ចំពោះមនុស្សបណ្តាលពី Arteriodclerosis ។ Infarct មានពណ៌ក្រហម ឬ ស អាស្រ័យនិងអាយុនៃ Infarcts ។

៤- Infarcts of the live នៅពេលបាត់បង់ការផ្តល់ឈាម ប្រើដោយ Tumor ឬ Thrombosis នៃ Hepatic vessel ធ្វើឲមាន Infarct of the liver អាចកើតមានឡើង ។

៥- Infarct of the Lung នៅពេលមានផ្តល់ខ្ពស់ដល់ស្និត អាចបណ្តាលឲមាន Infarcts ដែលមានពណ៌ក្រហម ។ អាចបណ្តាលពី Emboli នៃ Uterine Vein និង Posterior vena cava ចំពោះគោ ។ ចំពោះជ្រូកមានក្នុងជម្ងឺ Hog Cholera, វីរុសអាចបំផ្លាញ Endothelium នៃ Pulmonary vessel Thrombosis and infarcts ចំពោះគោ ចៀម ជ្រូកផង ដែលអាចបណ្តាលពី Pastuerella ។ Pulmonary Infarction ច្រើន កើតមានជា Complicate ក្នុងករណី Bronchopneumonia ។

៦- Infarction of intestine: បណ្តាលពី Thrombosis នៃ Mesenteric Artery ដោយដង្កូវ Strongyle (larval) Nerosis and gangrene ។

៧- Infarcts of the brain: បណ្តាលពី Arteri oclerosis ជួបប្រទះចំពោះសត្វផ្តែ និងសត្វពេលមានគ្រោះថ្នាក់។ អាចបង្កើតដោយ cyst ដែលមានអង្គលៀង (Apolectic cyst)សត្វអាចមានរោគសញ្ញាសរសៃប្រសាទ។

៣.១១ THROMBOSIS AND EMBOLISM

៣.១១.១ THROMBOSIS

១. និយមន័យ: Thrombosis គឺជាការស្ទះនៃសរសៃឈាម ដោយសារធាតុផ្សេងៗជាញឹកញាប់នៅជីវិតសត្វ និងមនុស្សហើយគេចែកជា:

ក. Cardiac Thrombi: ឃើញមានផ្ទៃបេះដូង (Wall) ជាលក្ខណៈពិសេសនៃជម្ងឺ Black leg គោ ក្របី ស្ទះ (Valves)- Valvarthrombi ជាលក្ខណៈនៃ S.Erysipelas

ខ. Arterial Thrombi: ឃើញមាននៅ Anterior mesenteric artery ដែលបង្កដោយ Spirocercalupi ចំពោះផ្លែ និងដោយ Cerca Armillata លើសត្វគោ។

គ. Venous thrombin: ច្រើនជួបលើសរសៃវ៉ែនដើមមនុស្ស គឺវ៉ែនដើមមាន Collapse ហើយរងសម្ពាធសង្កត់លើជ្រុងគ្រែព្រោះពេលនោះ Intimal Epithelium រងរបួសបង្កើត Thrombi ។ គេឃើញ Venous thrombi នៅពេលមាន Chronic venous congestion (ស្លាក់ឈាម) ។ ពុំសូវជួបចំពោះសត្វទេ

ឃ. Capillary thrombi: ជួបនៅពេលមាន Inflammation។

ង. Lateral thrombi: មានលក្ខណៈដោយភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងផ្ទៃសរសៃឈាម។

ច. Occlusive: មាននៅ Small artery or Vein

ឆ. Saddle thrombi: មាននៅ Bifurcation និង Bifurcation នៃអាក់ទែ

ជ. Aseptic thrombi : មិនបង្ក Infection.

ឈ. Thrombi សៈ: Thrombocyte – Pole or white thrombi ជួបនៅបេះដូង Aorta និង Femoral artery

ញ. Thrombi ក្រហម (Erythrocyte) Red thrombi ជួបនៅវ៉ែនញឹកញាប់

ដ. White +red thrombi +សមាសធាតុឈាម និង Thrombi- mixed thrombi

ថ. Laminated thrombi: ជាការប្រែប្រួលសមាសធាតុនៃ Thrombi- mixed thrombi មាន White and red thrombi បង្កើតជាស្រទាប់ៗ នៅពេលមានឈាមហូរគេឃើញ red thrombi ម្តងវិញ

និមិត្តរូប:

Type of Thrombi វាអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទ Thrombi ជា Septic ឬ Aseptic។

-Aseptic

១. Contraction fibrin of thrombi អាចកម្រិតអោយដាច់ហើយហូរឈាមតាមចរន្តឈាម

២. Absorption : Thrombi អាចទៅទន់ ហើយធ្វើ Absorbe

គ្រោះថ្នាក់ក្នុងដំណើរវិត្តនេះគឺផ្នែកតូចៗនៃ Thrombi ដែលដាច់ហើយចូលទៅស្ទះលើ Organ បង្កអោយមាន Infection ។

- Septic នៅពេលដែលដុំ Thrombi មានលទ្ធភាពបង្កអោយមាន Infection និង Inflammation ដែលបញ្ចេញ Exudate និង បំបែកដុំ thrombi អោយក្លាយជា Emboli បង្កជាតំបន់រាតត្បាត។

•ការខូចនៃ Endothelium

a.Trauma: អាចធ្វើអោយមានកំពកឈាមដូចជា ពេលមានការរំហែក (Laceration) មុត (Rupture) ជាំ (Contusion) ការចាក់បូមយកឈាមពីវ៉ែន (puncture of veins) បណ្តាលអោយមាន thrombi។

b. Toxin ពពួកមេរោគដូចជា Streptococcus Erysipelothrix បញ្ចេញ Toxin បំផ្លាញ Endocardium បង្កអោយមាន thrombi

c. ជម្ងឺ Degenerative នៃសរសៃឈាម ជាពិសេសរលាកសរសៃឈាម (Atherosclerosis) និងការខូចខាតផ្ទៃក្នុងនៃសរសៃឈាម។

d. Viruses: ជម្ងឺប៉េសធ្វើអោយខូច Endothelium បណ្តាលអោយ Thrombosis នៅផ្ទៃផ្ទៃ។

e. Parasites: ពពួកបរស៊ីតដូចជា Strongylus vulgaris ធ្វើអោយមានរបួសក្នុងសរសៃ Mesenteric Artery ដោយចលនារបស់វាបង្កជា Thrombi

f. Tumor (ដុំពក) ពេលមានដុំពកនៅផ្ទៃក្នុងនៃសរសៃឈាមក៏បណ្តាលអោយមាន Thrombosis ដែរ។ កោសិកា Endothelium ត្រូវបានបំផ្លាញ A.T.P (Acide triphosphasic) ត្រូវបានបំផ្លាញដោយ A.D.P ដែលបណ្តាលអោយឈាមកក។

៣.១១ ២ ការផ្តាសប្តូរក្នុងឈាម

ចលនាឈាមហូរលឿនធម្មតា បង្កើត Thrombi មានដោយកិន។ Thrombosis កើតឡើងពេលចរន្តឈាមផ្តាសប្តូរ ឬ ចរនាឈាមយឺត

- ក. ការស្តាប់ឈាមយូរ (Chronic venous congestion)
- ខ. ការប៉ោងសរសៃឈាមក្រហម (Aneurysm)
- គ. ជម្ងឺបេះដូង

សរុបមកជារួម thrombi រមែងកើតឡើងដោយកត្តាបី

- កត្តាចរន្តឈាមយឺត
- កត្តាសរសៃឈាមមានរបួស
- កត្តាបម្រែបម្រួលសមាសធាតុគីមីឈាម

Thrombosis នៅអាទេនាំទៅរក Anemia

ផ្នែកខ្លះការខូចបណ្តាញបធាតុនាំអោយកោសិកាងាប់។ រីឯThrombosis នៅរំនែបណ្តាលអោយ Hypotension និងការស្លាប់ឈាមនៅជាលិកា។ តាមលក្ខណៈនៃ Thrombosis អាចចែកជា Thrombosis តាមផ្ទៃសរសៃឈាមThrombosis ស្ទុះសរសៃឈាម។

Thrombosis មានសារៈសំខាន់ណាស់ មុខងារការពារបញ្ឈប់ការហូរឈាមពេលវះកាត់។ ម្យ៉ាងទៀតThrombosis ក៏ផ្តល់លទ្ធផលអាក្រក់ដែរ ព្រោះThrombosis បង្កអោយមានលក្ខខ័ណ្ឌប្រសើរដល់ការលូតលាស់នៃPathogene ហេតុនេះThrombosis បង្កជម្ងឺជាច្រើនប្រភេទ និងជាដើមហេតុនៃ Infarction និង Necrosis។ល។

- Effects of thrombi អារស្រយទៅនឹង

- ១. វាជាប្រភេទ Mural or Occlusive
- ២. ទំហំសរសៃដែលមាន Thrombosis
- ៣. មាននៅលើ Artery or Vein

- ៤. សរីរាង្គដែលមាន Thrombosis
- ៥. មាន Collateral circulation កើតឡើងឬទេ
- ៦. ល្បឿននៃការបង្កើតសាច់ជុំ thrombi
- ៧. អាចដាក់ចេញបង្កើត Embolism ឬទេ
- ៨. ជាប្រភេទ Septic ឬ Aseptic

- សញ្ញានៃ Thrombi

- ៩. Passive Congestion and Edema
- ១០. Infarction
- ១១. Gangrene of the intestine or limbs
- ១២. Interference
- ១៣. Colic
- ១៤. Lameness ដោយស្នូរអាក់ទែសត្វខ្សោយ
- ១៥. Septicemia or pyemia thrombi ជា Metastatic abscesses
- ១៦. Sudden death នៅពេលស្នូរ: Coronary artery ច្រើនមានមនុស្សកំរមានលើសត្វ

៣.១១ .៣ . Embolism

ជាការស្ទះសរសៃឈាម ដោយសារសារធាតុដែលធ្វើចលនាក្នុងសរសៃឈាមគេហៅថា Embolism ហើយសារធាតុដែលធ្លុងកាត់គេហៅថា Embolus (Emboli-plural) ។ Emboli អាចជាអង្គធាតុរាវ (Liquid) អង្គធាតុរឹង (solid) និង ឧស្ម័ន (Gaseous) ។ Emboli ធ្វើអោយដំណើរឈាមក្នុង Artery ឬ Capillary ហើយ Emboli អាចមាននៅក្នុងសរសៃ Lymph ទឹករងៃដែរ។ Emboli នៃសរសៃរ៉ែនមានដោយកំរ ដោយទំហំសរសៃរ៉ែនធំ ហើយឈាមមានចលនាចូលទៅបេះដូង ដូច្នោះ Lymph មិនអាចធ្វើអោយស្ទះសរសៃរ៉ែនទេ ប៉ុន្តែធ្វើចលនានៅក្នុងបេះដូង។

a. Emboli បង្កដោយសារធាតុក្នុងឈាម

- កំទេច Thrombi (thrombotic) ។ Thrombi អាចត្រូវបំផ្លាញដោយដំណើរឈាម ធ្វើអោយរលាយដោយពពួកបាក់តេរីស៊ីតប្រាក់តេរី Thrombi ដាច់ចេញហើយក្លាយជា Emboli ធ្វើចលនាក្នុងឈាម។

- ដុំខ្លាញ់ (Fat emboli)

ជាលិកាខ្លាញ់បានត្រូវបំបែកជាអង្គធាតុរាវលាយនៅជាមួយទឹកក្នុងឈាម ដែលបណ្តាលពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងថ្លើម ខួរក្រហមនៃឆ្អឹងជាដើម។ ខ្លាញ់ប្រមូលជាតំណក់ ហើយធ្វើចលនាក្នុងឈាម។

- កំទេចជាលិកា (Tissue emboli

)ការរលាកនៅតាមសរីរៈឫសរសៃឈាមចលនាជាលិកាដាច់ចេញ ហើយធ្វើចលនាក្នុងឈាម។

b. Emboli បង្កដោយសារធាតុចូលពីខាងក្រៅ

- Emboli ខ្យល់ (Air embolism) ការចាក់ថ្នាំបញ្ចូលក្នុងសរសៃវ៉ែន

អាចនាំខ្យល់ចូលក្នុងវ៉ែននេះដុំខ្យល់អាចធ្វើអោយស្ទះសរសៃ Capollary ហើយធ្វើអោយតំបន់មួយចំនួនទទួល Infarction ឬ Necrosis ។

- Emboli នៃមេរោគ:

បង្កដោយការផ្គុំគ្នានៃពពួកបាក់តេរីដែលធ្វើចលនាឈាមទៅចូលសរសៃផ្សេងៗទៀត។

- បាក់ស៊ីត Emboli បាក់ស៊ីតឈ្មោះ: Derofilairia immitis អាចផ្គុំគ្នាបង្កើតជា Embolus

នៅអាទិបេះដូងសត្វឆ្កែ។ ពពួក schistosome បង្កើត Emboli នៅបណ្តាញសរសៃពោះវៀន (Mesenteric) ។ ពពួក Ascarides ក៏អាចបង្កើត emboli ដែរនៅពេលវាធ្វើចលនា។ ហើយ Trypanosom អាចធ្វើអោយមានការស្ទះ Emboli ដែរ។

ការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺនៅពេលព្យាបាលជម្ងឺបាក់ស៊ីតដោយប្រើថ្នាំសំលាប់វា យើងត្រូវតែគិតអោយបានដិតដល់អំពីផលលំបាក

ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការងាប់នៃបាក់ស៊ីតទាំងនោះនៅក្នុងសរសៃឈាមពិសេសពពួក Protozoa ។

- ការដុះដុំពក (Tumor) ការដុះដុំពកក្នុងសរសៃឈាម

អាចជាផលវិបាកដែរព្រោះដុំពកនេះអាចដាច់ហើយធ្វើចលនានៅក្នុងសរសៃឈាម។ ពិសេសប្រភេទជម្ងឺដែលដុះដុំពកដែលឆ្លង។

- លទ្ធផល Embolism លទ្ធផល embolism ទាក់ទងនឹងធម្មជាតិ Emboli

ទំហំ Emboli ដែលធ្វើចលនាក្នុងសរសៃឈាម។ លទ្ធផលនេះអាច:

១- បង្កជាតំបន់រាតត្បាតក្នុងឈាម ប្រសិនបើ Embolus ជា septic

២- បង្កើតជុំពពក Metastatic tumors ប្រសិនបើ Emboli ជាដើមហេតុនៃការបង្កើតជុំពពក។

៣- បង្កើតជាតំបន់ Ischemia ប្រសិនបើ Emboli ធំ

៤- អាចបង្កើត Infarction ឬតំបន់មួយ Necrosis ប្រសិនបើស្ទះសរសៃឈាម Artery។

- បរាសិត Emboli: បរាសិតឈ្មោះ: Dirofilaria Immitis

អាចផ្តុំគ្នាបង្កើតបាន Embolu នៅអាទិទេបេះដូងសត្វផ្តែ ។ ពពួក Schistosoe species

បង្កើត Emboli នៅបណ្តាញសរសៃពោះរៀន (Mesenteric) ។ ពពួក Ascarides Strongyles

ក៏អាចបង្កើត Emboli ដែរនៅពេលវាធ្វើចលនា ។ ហើយ Trypanosom អាចធ្វើឱ្យមានការស្ទះ Emboli ដែរ ។ ការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ គឺនៅពេលព្យាបាលជម្ងឺបរាសិត

ដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់វាយើងត្រូវតែគិតឱ្យបានដិតដល់អំពីផលវិបាក

ដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការងាប់នៃបរាសិតទាំងនោះនៅក្នុងសរសៃឈាម ជាពិសេសពពួក Protozoa ។

- ការដុះជុំពក (Trumor): ការដុះជុំពកក្នុងសរសៃឈាមអាចជាផលវិបាកដែរ

ព្រោះជុំពកនេះអាចដាច់ ហើយធ្វើចលនាក្នុងសរសៃឈាម ។ ជាពិសេសប្រភេទជម្ងឺដុះជុំពកដែលឆ្លង

➢ លទ្ធផល Embolism: លទ្ធផល embolism ទាក់ទងនឹងធម្មជាតិនៃ Emboli ទំហំ Emboli ដែលធ្វើចលនាក្នុងសរសៃឈាម ។ លទ្ធផលនេះអាច:

១. បង្កជម្ងឺជាតំបន់រាតត្បាតក្នុងឈាម ប្រសិនបើ Emboli ជា Septic ។

២. បង្កើតជុំពក Metastatic tumors ប្រសិនបើ Emboli ជាដើមហេតុ emboli នៃការបង្កើតជុំពក ។

៣. បង្កើតជាតំបន់ Ischemia ប្រសិនបើ Emboli ធំ

៤. អាចបង្កើត Infarction ឬតំបន់មួយ Necrosis ប្រសិនបើស្ទះសរសៃឈាម Artery ។

៣.១២ Hypertrophy

ជាការរីកធំ (Inlargement) នៃជាលិកា Tissue និង សរីរៈ ដែលបណ្តាលឱ្យមុខងារនៃកោសិកា Functional cell ឬ សរសៃឆ្មាៗបានត្រូវកើនឡើងតែមិនបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយកោសិកាឡើយ ។

ការរីកធំនៃកោសិកា Mechanism របស់វាគេចែកចេញជាពីរៈ

- Hypertrophy
- Hypertplasia

- Hypertrophy: ជាលទ្ធផល និង

សរីរៈដែលពេលនោះការបមពេញតួនាទីរបស់វាបានត្រូវបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែវាមិននាំ (Due to) ចុកពើត និង រលាកឡើយ (Information) ។ ម្យ៉ាងទៀតទំហំកោសិការីកធំបណ្តាលឱ្យ Metabolism ប្រព្រឹត្តទៅលឿននាំទៅដល់កោសិកាបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្ម ។

- Hypertrophy: នាំ កោសិកាបាត់បង់សម្ពាព (Capsity) ធ្វើចំណែកកោសិកា

Multiply តាមមីតូស៍។ មានការបង្កើន Protein និង RNA (ARN) នៅក្នុងកោសិកា ហើយក៏មាននៅក្នុង Mycrosomes, Ribosomes, Golgi apparatus, Lysosome ជាដើម ។

គេចែក Hypertrophy ជាពីរគឺៈ

- Physiological Hypertrophy
- Pathological Hypertrophy

Physiological: គឺជាប្រភេទ Variety ដែលកើតលើកោសិកា និង សារពាង្គកាយ មានសុខភាពធម្មតា (Normal Health) ។ ឧ.អ្នកកីឡាសាច់ដុំរីកធំ និង មានសកម្មភាពខ្លាំងក្លា . ស្សួន (Uteral) ពេលផ្ទឹម. កន្សោមដោះពេលមានកូនសត្វដែលគេបំប៉នចំណី ។

Pathological: ជាការរីកធំនៃកោសិកា ដោយកត្តាមួយចំនួន ដែលបណ្តាលឱ្យ Neuro-gumoral Regular នៃសរីរៈហើយដែលបញ្ចប់ដោយ Atrophy, Dystropy, Necrosis គេចែកវាជា Compensatory hypertrophy: ក្នុងករណីនេះ ប្រសិនបើជាលិកាកាខ្លះនៃសរីរៈ បានត្រូវបាត់បង់ជាលិកា ដែលនៅសល់ពង្រីកទំហំ ដើម្បីបំពេញនូវជាលិកាដែលបាត់បង់នោះ ។ សរីរៈមួយបានទទួល Hypertrophy នៅពេលដែលសរីរៈផ្សេងៗទៀតមាន Atrophy or dannaged ។ ពេលមានការខូចខាតលើតម្រងនោម (kidney) សរីរៈផ្សេងទៀតទទួលបាន Hypertrophies

តាំងពីពេលដែលសរីរៈទាំងនោះ ត្រូវទទួលបានបន្តបំពេញនាទីជំនួសសរីរៈ ដែលខូចខាត (kidney) ។ នេះគ្មានសារធាតុថ្មីធ្វើដែលកើតឡើងទេ គឺវាគ្រាន់តែពង្រីក ទំហំរបស់កោសិកា ។

a. Adaptive Hypertrophy: គឺជាការបន្សំ ឬ ប្រែប្រួលមួយចំនួន ។ EX:ពេលមានការរួមខ្លឹមនៃសរសៃ (Stenosis) នៃAtriculoventricular opening ផ្សេងផ្នែកលើ នៃបេះដូងខាងឆ្វេង ទទួលHypertrophy នៅពេលដែលសាច់ដុំកន្ត្រាក់រួមខ្លឹម (Contract) ខ្លាំង ហេតុដូច្នេះកោសិកា សាច់ដុំ (Muscle cell) បំពេញការងារខ្លាំង ហើយនាំទៅរក Hypertrophy បណ្តាលឱ្យ Metabolism កើនឡើង ។

b. Pseudo hypertrophy: ក្នុងរណីរីកធំនៃទំហំកោសិកាមិនកើតឡើងទេ ប៉ុន្តែសរីរៈទាំងមូលរីកធំដោយហេតុមានជាលិការីកធំ ។ ឧ. Pseudo hypertrophy នៃសាច់ដុំ (Muscle) (គេហៅថាPseudo hypertrophic muscular dystrophy in man) ទំហំនៃជាលិកាសាច់ដុំរីកធំឡើងមិនមែនដោយសារការរីកធំនៃទំហំ នៃកោសិកាសាច់ដុំឡើយ ។ ប៉ុន្តែបណ្តាលពីវត្តមាននៃជាលិកាខ្លាញ់ (Adipose) ឬ ជាលិកាគ្រាប់ៗតូចៗ (Granulation tissue) ។ បន្ទាប់មកជាលិកាសាច់ដុំ (Muscular tissue) បានត្រូវទទួល Atrophieហើយរួមមាន ។

៣.១៣ Hyperplasia

គឺជាការរីកចម្រើនជាលិកា ឬ សរីរៈដោយហេតុ (Due to)មានកើនចំនួនកោសិកា ។
វាអាចធ្វើឱ្យការបំបែក (Disruption) នៃទ្រង់ទ្រាយរបស់ជាលិកា (Architecture)។

ការកត់សម្គាល់ថាពេញវ័យមានតែកោសិកាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ដែលបំរើឱ្យថាមពលនៃការដុះដាល (Proliferate)ក្នុងខណៈកោសិកាសរសៃ(Nerve Cell)និង
កោសិកាសាច់ដុំមិនដុះ ។ ដូច្នោះ Hyperplasia បន្ទាប់មិនអំចកើតឡើង ប៉ុន្តែ Hypertrophy ។
ក្នុងករណីជាច្រើនHyperplasia អាចនៅជាមួយគ្នា Cockst ជាពិសេសនៅថ្លើម ។

• មូលហេតុ:

១. ការឈឺចុកចាប់យូរ (Chronic irritation)

a. Mechanical: ការលាក់ដោយអំពើ Mechanism

យូរលើស្បែកបំបាត់ការដុះដាលនៃជាលិកា និង កោសិកា Epithelia ថ្លៃដៃក្រិន Calluses កម្មករ ។

b. Toxic: Chemical : សារធាតុពុល Toxic Substance នៅក្នុងរុក្ខជាតិ Senecio
បណ្តាលឱ្យ Hyperplasia ថ្លើម ។

c. Bacterial Infection : នៅពេលឆ្លងជម្ងឺការឈឺចាប់អាចប្រព្រឹត្តទៅ បណ្តាលពី
Hyperplasia ។ ២. Lymphoid Hymperplasia ពេលមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ ។

២. Endocrine Imbalance :

២. Hyperplasia នៃសាច់ដុំស្បូន ឬ កន្សោមដោះ បណ្តាលពីការចាក់អម៉ូនEstrsogen ។

៣. Endocrine Secretion:

ការហូរនៃក្រពេញ Endocrine ច្រើនក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ ការលើសនៃអម៉ូន (Hormone)
(Somatotrophic) ជាលទ្ធផលនៃការដុះលើស នៃគ្រោង(Skeleton) សរីរៈនៃ Penis និង Clitoris
ធ្វើឱ្យប៉ោង និងមានដុំពកនៅក្នុងថង់អម៉ូននៅពេលដែលអម៉ូនរេទនេះបានកើតឡើង ។

៤. Deficiencies :

មិនគ្រប់គ្រាន់Viatmin កង្វះ Vitamin A ផ្តល់ផល Hyperplasia និង Hyperkeratisation
នៃស្រទាបEpithelium ស្បែក(ករណីនេះដូចនឹងករណីពុលដោយ Chloricheted naphthalenes
ដែលបំផ្លាញVitamin Aនៅក្នុងសារពាង្គកាយ ។ ក្នុងចំណីអាហារមាន កង្វះ Vitamin A នាំឱ្យកើត
Hyperplasia នៃស្រទាប់បំពង់អាហារ (Esophagal Epithelium) ។

៥. Viruses:

បណ្តាលឱ្យសាយភាយ (Proliferation) នៃកោសិកា និង Hyperplasia ដែរ។ ឧ. Hyperplasia នៃ Epithelium ដោយវីរុសជម្ងឺអុត និង Viurs ជម្ងឺប្រុស (Wart Virueses) ។

Hyperplasia: បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងខួរឆ្អឹង (Bone marrow) ក្នុង Mycloid Hyperplasia ដែលកើតឡើងនៅពេលមានតម្រូវការនេះជា Functional Hyperplasia ។

Hypertrophy and Hyperplasia

:ជាលទ្ធផលរាប់រងចំពោះការបង្កើនតាមតម្រូវការនៃសារពាង្គកាយ ។

ឧ.កាលណាចំណិតនៃថ្លើមផ្នែកណានោះបានត្រូវបាត់ មាន Hyperplasia និង Hypertrophy នៃកោសិកាថ្លើម ដើម្បីជំនួសវិញ ។ ភ្នាក់ងារនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជា Processes សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យក្នុងជាគុណយោជន៍ (Beneficial) សម្រាប់សារពាង្គកាយ ។

ប៉ុន្តែការរីកសាយភាយនៃកោសិកា ដែលកើតឡើងក្នុងរបៀបចៃដន្យ និង (Haphazard) របៀបគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង (Autonomcus) គឺគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះសរីរាង្គ និង បម្រើដោយគ្មានបំណង ។

៣.១៤ Metaplasia

ទោះបីជាកោសិកាពេញវ័យក្តី ក៏មានកោសិកាស្រដៀងគ្នាមួយចំនួន ដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីលូត លាស់នៅក្នុងជាលិកាដែរ ។ នៅពេលត្រូវការកោសិកាទាំងនេះ បង្កើនឡើង និង សំដែងឱ្យឃើញសភាពផ្សេងគ្នា ទៅជាជាលិកាថ្មី នៅកន្លែងដែលបាត់បង់។ Metaplasia គឺជាការផ្ទេរនៃជាលិកាប្រភេទមួយទៅជាជាលិកាប្រភេទផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែការផ្ទេរនេះ មានព្រំដែន។ ប្រភេទមួយនៃកោសិកា Ectoderm អាចបង្កើតកោសិកាប្រភេទផ្សេងទៀតនៃ Ectoderm ប៉ុណ្ណោះ ។ Fibrous tissuz អាចផ្លាស់ប្តូរទៅជាកោសិកាស្រទាប់ក្នុងនៃស្បែកទេ ។ Metaplasia បានត្រូវរកឃើញនៅលើជាលិកាពីរប្រភេទគឺ Epithelium និង ជាលិកាសន្ទាន (Connective tissue)

១. Epithelium Metaplasia

កើតឡើងដោយសារ៖

- ការ ឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃ (Chronic Irritation)
- កង្វះ Vitamin A (V.A Deficiency)

a- Chronic Irritation Metaplasia កើតឡើងបណ្តាលពីមានការឈឺចាប់ ឬ រលាករ៉ាំរ៉ៃ ក្នុងតំរូវការចាំបាច់នៃការការពារ Ccchanism ដែលពេលនោះប្រភេទកោសិកាថ្មី ដែលកើត ឡើងមានលក្ខណៈធនទ្រាំជាង។ ឧ. ក្នុងជាលិកាស្បែក (សុព Prolapsc) ពេលនោះកោសិកា Epithelium បានត្រូវប្តូរជាស្រទាប់ស្តើងដ៏រឹងមាំ (Squamous cell ដែលអាចទប់ទល់នឹង ការចំលង និង ការឈឺចាប់បានប្រសើរ។ គ្រាប់គ្រួសក្នុងប្រមាត់ (gall stomes) ស្រទាប់ Epithelium រឹងចង់ទឹកប្រមាត់ (gallbladder) បានប្រែប្រួល (Converted) ទៅជាស្រទាប់ ស្តើងថ្នាក់ៗធនទ្រាំ (Squamous statillied) ។

b- ក្នុងករណី Avitaminosis A : កោសិកា epithelium បានត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាស្រទាប់ ស្តើងៗ ។ នេះគឺគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះសត្វទេ ហើយអាចធ្វើឱ្យអន្តរាយ (Hesmful) ពីព្រោះ កោសិកា Epithelium ស្តើងៗនៃទងស្បែកបានត្រូវជំនួសដោយ Epithelium ស្រទាប់ៗ ពេលនោះវត្ថុក្រៅខ្លួន(Foreign body) និងការការបញ្ចេញទឹកអិលមិនបាន ផ្លាស់ប្តូរ ដែលជាការចម្លងយ៉ាងងាយស្រួល(Facilitaters Infaction) នាំឱ្យមានការរលាកស្បែក Pneumonia និង Gangrene ។

២. Connective tissue Metaplasia

ជាលិកាសន្ទានអាចប្រែប្រួលទៅជាជាលិកាឆ្អឹង (Bene) ឬ ឆ្អឹងខ្ចី (Cartlage) ។ វាកើតឡើងដោយ ការផ្សះរោគដូចជាដំបៅ ឬ របួសជាដើម នៃក្តារពោះ (Abdominal wall) ។

វ័យចាស់អង្គកម្ម (Ossification) ឆ្អឹងខ្លីនៃ larynx និង បំពង់ខ្យល់ (Trachead)

គឺក្លាយទៅជាធម្មតា ។ គោចាស់ កោសិកាស្នូត Alveolsr (Septum) សន្ទះទ្រូងអាចក្លាយទៅជាឆ្អឹង ។ Metaplasia គឺជាទូទៅគេឃើញនៅក្នុងដុំពក (tumor) លាយគ្នានៅក្នុង (Mammary gland) នៃមេម៉ែ (Bitch) ។ ស្រទាប់ ឬ យោនៃ Parenchyme (Stroma) អាចប្តូរជាឆ្អឹងខ្លី (Cartlage) និង ឆ្អឹង។

• **វិបាក:**

Metaplasia Epithelium (Metaplastic epithelium) អាចជាការដុះកោសិកាថ្មី (Neoplastic) ដូចដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុង Metaplasia នៃ Epithelium ទងស្នូត (Bronchial Epithelium) នៃមនុស្សយើងដែលពីចំណុចនេះ រោគមហារីកដៃ Bronchial Carcinoma) អាចកើតឡើង ។ រលាកស្បូនលើស្រ្តី Endometritis ជាឧទាហរណ៍នៃ Metaplasia នៃស្រទាប់ស្នើង Mesothelium (Peritoneal Mesothelium) ។

• **Metaplasia Epithelium (Metaplastic epithelium)**

អាចជាការដុះកោសិកាថ្មី (Neoplastic) ដូចដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុង Metaplasia នៃ Epithelium ទងស្នូត (Bronchial Epithelium) នៃមនុស្សយើងដែលពីចំណុចនេះ រោគមហារីកដៃ Bronchial Carcinoma) អាចកើតឡើង ។ រលាកស្បូនលើស្រ្តី Endometritis ជាឧទាហរណ៍នៃ Metaplasia នៃស្រទាប់ស្នើង Mesothelium (Peritoneal Mesothelium) ។

៣. ១៥ REGENERATION

Regeneration ជាការបង្កើតឡើងវិញនៃផ្នែកខ្លះនៃសរីរៈសារពង្សកាយ ដោយមានជាលិកា លូតលាស់ឬតាមរបៀប Hyperplasia នៃជាលិកា ។ Regeneration មានគ្រប់ការវះកាត់ប៉ុន្តែការដុះជាលឡើងវិញនៃជាលិកាពុំប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាទេ។

សត្វថ្នាក់ទាបមាន Regeneration ពេញលេញដូចជាពពួកជន្លេនជាដើម ។ ពពួកបង្កង (Lobster) ពីងពាងក៏មាន Regeneration ពេញលេញដែរ ។ ដោយឡែកពពួកសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ (បក្សី និង ថ្មីសត្វ) គឺទទួល Regeneration ឬ ការដុះជាលិកាឡើងវិញ កើតមានចំពោះប្រភេទជាលិកាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ប៉ុណ្ណោះហើយ Regeneration ប្រភេទសត្វផ្សេងៗប្រព្រឹត្តទៅខុសៗគ្នា (ពោលគឺRegeneration មិនពេញលេញ) ។

ហេតុដូច្នោះRegeneration គឺជាលក្ខណៈពិសេសនាំគ្រប់ការវះកាត់។ ប៉ុន្តែសត្វថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ការវះកាត់លើសកលលោក នោះវាមានបន្សំទៅរកRegeneration ទាបបំផុតទៅវិញ ។ លឿន និង ប្រភេទRegeneration ទាក់ទងទៅនឹង:

- ការផ្តល់ចំណី Nutrition
- ប្រភេទសត្វ
- Neurogumoral Regular

សត្វក្មេង Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅលឿនជាង ហើយពេញលេញចំណែកសត្វចាស់ផ្ទុយទៅ វិញ ។ ពេលនេះ ពួនសំខាន់ក្នុង Regeneration ពីវត្តមាន Vitamin A, B, C, D, E ។

Regenerationប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបពីរ ៖

- ការលូតលាស់ដុះជាលនកោសិកា Parenchyma និង Stroma និង Metasis ដោយ Amitosis ។
 - Regeneration នៃ Hypertrophy ដោយពង្រីកទំហំនៃកោសិកា ។
- ជួបប្រទះញឹកញាប់ចំពោះសត្វផ្ទឹមកង ។

អាស្រ័យដោយភាពខុសគ្នាពេញនៃលទ្ធផលទីបញ្ចប់នៃ Process របស់ Regeneration គេចែកជា:

- ពេញលេញ (Restitution)
- មិនពេញលេញ (Substitution)
- ខ្លាំងក្លា (Super regeneration)
- Physiological Regeneration
- Reparation (ការជួសជុល)
- Pathological regeneration

១. ពេញលេញ (Restitution):

គឺជាការដាំដុះត្រឡប់មកវិញយ៉ាងពេញលេញនៃជាលិកាដោយគ្មានប្រែប្រួលទំរង់។
 ប្រសិនបើដំបៅតូចតាចគ្មានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធឈាមនោះដំបៅសះឡើងវិញមានសភាពដូចដើម។ ឧ.
 Regeneration Epiderm ពេល dermis បានត្រូវរក្សាពុំខូចខាត
 ឬពេលសំបកឆ្អឹងបានត្រូវរក្សាសភាពដើម។

២. មិនពេញលេញ (Substitution): គេជួបប្រទះជាញឹកញាប់ គឺវាមានលក្ខណៈជំនួស។
 ជាលិកាថ្មីបានត្រូវបំពេញជាលិកាចាស់ ដែលបាត់បង់
 ហើយដែលជាប្រភេទជាលិកាផ្សេងពីជាលិកាដែលជាប្រភេទជាលិកាដែលបាត់បង់។ ឧ.
 ដំបៅដាច់សរសៃ និងសរសៃឈាម នោះដំបៅនឹងត្រូវដោយជាលិកាសន្ទាន (Connective tissue)
 គឺជាតំបន់មិនដុះរោម, គ្មានPigment និងរន្ធហ្វើស។

៣. Super Regeneration: គឺជាការដុះដាលនៃជាលិកាដ៏ខ្លាំងក្លា ពេលនេះគេឃើញជាលិកា
 Granule (gralulated tissue) ដុះឡើងក្នុងដំបៅ។

៤. Physiological regeneration: គឺជាការលូតលាស់ជាធម្មជាតិនៃការវះរស់។
 ការលូតលាស់នេះប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីពេលសត្វ ឬការវះរស់មានសុខភាពធម្មតា។ ឧ.
 ការលូតលាស់នៃក្រពះកូនគោ។

៣.១៦ REGENERATION OF TISSUES AND ORGANS

I- REGENERATION OF TISSUES :

១. Epithelium: ពេលជំរៅកោសិកា ពុំទទួលរងការបំផ្លាញនោះ: Regenerative គឺពេញលេញដោយបង្កើតជាកោសិកាថ្មីមកជំនួស។ ពេលជម្រៅនៃកោសិកា Epithelium ឬក្បែរបន្ទាងនោះ: Regenerative ប្រព្រឹត្តទៅមិនពេញលេញ។ ហើយស្នាមដំបៅនោះបង្កើតជាសន្លាក់ដែលបង្កើតជាសន្លាក់ដែលបង្កពី Connective tissue ដែលគ្មានរោម និងរន្ធព្រើស។ ហើយមុខងារនៃជាលិកាបានត្រូវតម្រូវឡើងវិញ (Compensatory) អាស្រ័យដោយមាន Hapertrophy។

២. Connective Tissue: ពេលមានរបួស ការជាសះស្បើយឡើងវិញប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបនៃការដុះកោសិកា ដោយបង្កើតជាសារធាតុម្យ៉ាងស្មើៗ ភ្ជាប់ពីកោសិកាមួយទៀត។ Ex: Connective Tissue នៃសាច់ដុំ ដំបូងបង្កើតជា Fibroblast និងកោសិកា Endothelium នៃ Capillary។ Fibroblast ជាប្រក្រតីប្រែប្រួលទៅជា Fibrosist ។ នៅចន្លោះកោសិកាបង្កើតជា សរសៃចំណងយឺត Cologene ប៉ុន្តែនៅក្នុងជាលិកាថ្មីដែលទើបនឹងកើតមកនេះសរសៃចំណងយឺត Cologene បានថយចុះហើយគ្មានសរសៃឈាម ហើយសារធាតុដែលនៅចន្លោះកោសិកានីមួយៗ បានក្លាយទៅជាកសិការទន់ (Gialine)។ ដូច្នេះវាបង្កើតដោយពេញលេញនូវការជំនួសនៃ Connective Tissue។

៣. ជាលិកាឆ្អឹង (Bony Tissue): Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅទាក់ទងនឹងការដុះដាលនៃគោលិកាឆ្អឹងថ្មី (Osteoblast-Periosta និង Endoosta) ការខូចនៃជាលិកាឆ្អឹងពេញវ័យគេហៅថា (Osteosist)។ ជាលិកាដែលកើតឡើងថ្មីធំជាងជាលិកាចាស់។ សំបកឆ្អឹងមិនគ្រាន់តែជាអ្នកបង្កើត Osteoblast ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាអ្នកបង្កើតទម្រង់ជាលិកាឆ្អឹងទៀត។ ដូច្នេះពេលសំបកឆ្អឹងត្រូវបានរក្សានោះ: Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅលឿនផ្ទុយទៅវិញពេលសំបកឆ្អឹងបានត្រូវខូចខាត Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅលឿនផ្ទុយទៅវិញនៅពេលសំបកឆ្អឹង (Osteofit) ទៀតផង។ ពេលឆ្អឹងបាក់ហើយគេមិនរក្សាឲ្យមានលំនឹងនោះ: Regeneration ឆ្អឹងពុំកើតឡើងឡើយ ទីបំផុតកន្លែងដែលបាក់អាចបង្កើតជាសន្លាក់មិនច្បាស់លាស់។

៤. Tissue of Cartilage: ការជាឡើងវិញអាស្រ័យដោយការដុះដាលនៃ Chandroblast សំបកឆ្អឹងខ្លី (Erechondra) ហើយបង្ហាយទៅជា Chondrocyst ដោយបង្កើតជាសារធាតុ Chondrine។

៥. Fatty tissue: Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅដោយបង្កើតកោសិកាក្នុងៗ Lipoblast និង Fibroblast។ កោសិកាឈាម និង Lympha មាននៃ Plasma កើតឡើងអាស្រ័យទៅនឹងការជំរុញនៃទឹកដីជាលិកាពីពោះវៀន ពីឈាម ដែលបានពីក្រហមនៃឆ្អឹងគឺ (Erythrocyte Trombocyte និង Grenulocyte) ។ ពេលមានជម្ងឺឆ្អឹងក្រហមមានការបង្កើតឈាមពុំសមស្របនោះគឺក្នុងថ្លើម, តំរង់នោម, ក្រពេញទឹករងៃ, ផាល បង្កើតជាស្នាមរបូសនៃជាលិកា Reticulary បំពេញទៅដោយឆ្អឹង។ កោសិកានៃដំបៅ ទាំងនេះក្លាយទៅជា Erythrocyte, Granulocyte និង Trombocyte ។ ការខូច Function នៃប្រព័ន្ធបង្កើតឈាមនាំទៅរក Patho-regenerationឈាម (Leucosis and Anemia) ។

៦. Muscularly tissue: Regeneration ជាលិកាសាច់ដុំប្រព្រឹត្តទៅអាស្រ័យដោយការដុះលូតលាស់នៃជាលិកាសាច់ដុំ Normal ។ ពេលរំហែក Sarcolama បណ្តាលឲ្យ Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅមិនពេញលេញ គឺបង្កើតជា Connective Tissue ។ ជាលិកាសាច់ដុំបេះដូង Regeneration មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយពេញលេញទេ វាត្រូវជំនួសដោយជាលិកាសន្ទានហាប់ណែន។ ហើយ Reparative process ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មបណ្តាលឲ្យ Hypertrophy ។

៧. Nervous tissue: Central Nervous tissue-Neurone regeneration ពុំកើតឡើងទេ។ regeneration នៃ Nervous tissue ប្រព្រឹត្តទៅនៅផ្នែកជិតចុង ប្រវែងខ្លីជាង 0,៥Cm ។ Regeneration សរសៃខាងក្រៅ និងខាងក្នុងប្រព្រឹត្តទៅដោយការបង្កើតជាលិកាថ្មីបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមបង្កើតជាទំរង់សរសៃ។ (Endo and perinerv) ការដុះដាលនៃសរសៃ (Neurv) ប្រព្រឹត្តទៅពី 0,២៥- ១ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល១យប់១ថ្ងៃ។ ការដុះដាលនៃសរសៃកើតឡើងតាមរបៀបដុះដុំពក នៃសរសៃ ហើយបន្តលូតលាស់។

៨. សរសៃឈាម៖ ការដាច់សរសៃធំៗ Artery, Vein ជាដើម Regeneration ពុំប្រព្រឹត្តទេ ប៉ុន្តែបន្ទាប់សរសៃឈាមទាំងនោះត្រូវស្ទះដោយ Thrombi និង Connective ផ្ទុយទៅវិញ Capillary regeneration ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ ដោយសារការដុះដាលនៃជាលិកា Endothelium នៃសរសៃឈាម។

II. Regeneration Organs:

១. Skin: ចាប់ផ្តើមពីការបង្កើត thrombi នៅក្នុងសរសៃឈាម និងការដុះដាលនៃជាលិកាសន្ធាននៃCapillary។ ស្នាមរបួសនៃស្បែកបានត្រូវជំនួសដោយជាលិកាសន្ធាន ដែលមានលក្ខណៈមិនរៀបរយដែលនៅទីនោះក្រពេញខ្លាញ់ និងញើសបានត្រូវបាត់បង់ ហើយបន្សល់ទុកនូវ Epidem ដែលគ្មានរោម។

២. Regeneration សរីរៈខាងក្នុង៖ ចំពោះសរីរៈខាងក្នុង Regeneration ប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនពេញលេញគឺត្រូវជំនួសនិងបំពេញដោយជាលិកាសន្ធានបណ្តាលឲ្យបាត់ Function នៃសរីរៈ។ Function នៃសរីរៈបានធ្វើ Compensatory អាស្រ័យដោយ Hypetrophy នៃជាលិកាដែលនៅសេសសល់។

៣ ១៧ ORGANISATION AND INCAPSULATION

ជា Patho-precess ដែលខិតទៅរក Regeneration វាប្រព្រឹត្តទៅនៅតំបន់ដែលកើត Necrosis និងជុំវិញជាលិកា Atrophy ព្រមទាំង Thrombosis និងកន្លែងមុតអង្គធាតុរឹងផ្សេងៗ។ល។

I. ORGANISATION:

ជាការជំនួសឡើងវិញនៃកោសិកា ឬជាលិកាដាច់តែសារពាង្គកាយការវាស់ក្នុង Process regene-rative inflammation និងអង់ស៊ីមដើម្បីរំលាយជាលិកាដាច់ដែលបន្ទាប់មកជ្រាបបាត់។ Process ប្រព្រឹត្តទៅដោយមានជំរាបនៃសារធាតុចិញ្ចឹម បន្ទាប់មកជាលិកាថ្មី(ជាលិកាសន្ធាន) បានត្រូវជំនួសឡើងវិញ។ Ex: Organization ការជាសះស្បើយនៃជម្ងឺ Tuberculosis ស្នាមរលាកនៃមេរោគ ឬ thrombosis ជាដើម។

II. INCAPSULATION:

ជាការបង្កើត Capsul នៅតំបន់ជុំវិញជាលិកាដាច់ ឬ foreign body ដោយជាលិកាសន្ធាន ។ គេជួបប្រទះនៅពេលដែលកោសិកាដាច់ ឬ foreign body មិនជ្រាបបាត់ ឬមានជំរាបយឺតយ៉ាវការលូតលាស់ នៃជាលិកាសន្ធាន។ គេសង្កេតឃើញនៅជុំវិញតំបន់មានកោសិកាដាច់ ឬ foreign body នូវការលូតលាស់នៃ Fibroblast ដែលក្លាយជាជាលិកាសាច់ដុំ ។ ជួនកាលគេជួបប្រទះ(ឧ. របេង) Capsul រឹងស្រួយនោះគឺ Fibroblast ក្លាយជាជាលិកាឆ្អឹង ។ ជួនកាលទៀតគេសង្កេតឃើញមាន ជាលិកាដាច់រលួយហូរចេញពី Capsul (Cecvestation) ជាពិសេសពេលមានជម្ងឺស្លុតផ្សេងៗ ។

ប្រសិនបើជំងឺរាងនៃជាលិកាងាប់ប្រព្រឹត្តិឆាប់រហ័សជាងការលូតលាស់នៃជាលិកាសន្ទានឃើញ មាន ជាថ្នាក់ដក់ដោយអង្គធាតុរាវដែលគេហៅថា Cyst ។ ឧ. ការបង្កើតតំបន់នៅក្នុងខួរក្បាល បង្កើតជា Hemorrhagic cyst ជាដើម។

៣.១៨ ការលាក (Inflammation)

Inflammation គឺជាប្រតិកម្មការពារបន្សំនៃសារពាង្គកាយទល់នឹងកត្តា ចង្រៃមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នានៃដំណើរការបីប្រភេទ៖

- រំហែកជាលិកា (Alterative)
- ប្រតិកម្មនៃសរសៃឈាម (Exudative)
- ការលូតលាស់នៃធាតុកោសិកា (Prolifeative)

Inflammation ប្រព្រឹត្តិទៅជាលក្ខណៈដំណើរការក្នុងតំបន់ ឬផ្នែក។ ក៏ប៉ុន្តែពេលមាន Inflammation កើតមានក្នុងសារពាង្គកាយកាលណាគេពិនិត្យឃើញប្រតិកម្មទូទៅដែរ។ ឧ. ប្រែប្រួលសមាសធាតុឈាម ប្រែប្រួល Function endocrine ផ្លាស់ប្តូរចរន្តឈាមក្នុងបេះដូង និងសរសៃឈាមកើនសីតុណ្ហភាពដងខ្លួនជាដើម។

តាមលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ

ការលាកគឺជាការបន្សំនៃសារពាង្គកាយដើម្បីរៀបចំបោសសំអាតដោយខ្លួនឯងនូវពពួកសារធាតុចង្រៃ និង foreign body តាមរបៀប Phagocytosis គឺដំបូងសាធាតុ ឬ Objective ទាំងនេះបានត្រូវក្តាប់ដោយគោលិកានៃឈាម ជាពិសេសកោសិកា Lymphocyte ។

Phagocytosis អាចមានលក្ខណៈពេញលេញគឺក្តាប់ពពួក Objective ទាំងស្រុងតែម្តង ហើយអាចមានលក្ខណៈមិនពេញលេញគឺបាក់តេរី ឬ foreign body មួយចំនួននៅសល់ក្នុងឈាម

ហើយ Phagocyte ងាប់នៅពេលនោះ Phagocyte ដែលងាប់នោះក្លាយជាអង់ស៊ីម ហើយបន្តបំផ្លាញកោសិកា Bacteria ។

១. និមិត្តហេតុនៃ Inflammation

បុព្វហេតុនាំឲ្យមានការរលាក អាចបណ្តាលពីកត្តាខាងក្នុង និងកត្តាខាងក្រៅ។

1. Exso-Factor មាន:

- a. Physical: របួសដោយអំពើ Mechanism (ជំបៅ, កៀប, មុត), កម្ដៅ (រលាក), ចរន្តអគ្គីសនី។
- b. Chiminal Cause:
 - Mineral Substance: បាស (Alkaline) អាស៊ីត (Acide) ។
 - Biochemical: បង្កដោយពពួក Toxin និងpoison របស់រុក្ខជាតិ។ល។
- c. Biological: បណ្តាលមកពីមេរោគជម្ងឺផ្សេងៗ ដូចជា Virus, Mycrobe, Fugus និងពពួកបរាសិត។

2. Endo-Factor:

បណ្តាលពីការផ្គុំនៃសារធាតុខនិក Thrombi និងProcess មួយចំនួនបំផ្លាញចរន្តឈាមរត់បណ្តារូបធាតុ។ Endo-Factor នេះអាចបណ្តាលពីអំពើផ្សេងៗនៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ដែលទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍។

២.ការវិវត្តន៍នៃ Inflammation

Inflammation ចាប់ផ្តើមពីការរំហែកខូចខាតជាលិកា (Alterative) ហើយវិវត្តទៅរក Distrophy, Necrosis ដែលចែកជា៖

- a. Alterative ទី១៖ រំហែក ឬខូចជាលិកា ដោយភ្នាក់ងារផ្ទាល់។
- b. Alterative ទី២៖ ផ្តើមចេញពីលទ្ធភាពនៃការបំផ្លាញប្រព័ន្ធសរសៃឈាម ដោយសារធាតុដែលបន្សល់ Alterative ទី១។ បំរែបំរួលនៃ Necrosis រមែងកើតឡើង ក្រោមឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៃ កត្តា Mechanism(របួស, កៀប) Chiminal (រលាកអាស៊ីត,បាស)។ល។ និងបណ្តាលពីការខូចប្រព័ន្ធឈាម (Stasis, throbosis) ព្រមទាំងសរសៃ បញ្ជូនព័ត៌មានផងដែរ។ បំរែបំរួល Distrophy កើតឡើងបណ្តាលពីអំពើ Mechanism, Chiminal បន្ទាប់បន្សំ ឬ Toxin បន្តិចបន្តួច។ ជាទូទៅករណីនេះគេឃើញមាននៅតំបន់រលាកនូវសារធាតុគ្រាប់ៗ Vacuole

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

សារធាតុខ្លាញ់នៅលាយឡំជាមួយកោសិកា Parenchima ។ Distrophy នៃ Epithelium នៅកន្លែងដែលទទួលរងអំពើ គេសង្កេតឃើញហើម (Edema) និង Fibrine Necrosis ។ ក្រោមមីក្រូស្កុប គេឃើញមានសារធាតុ បំបែកនៃ Acide nucleol gistamine, gialuronidas, gepaine ។ល។ Exudative ជាបំបែរនៃទ្រង់ទ្រាយសរសៃឈាម និងសរសៃវិញ្ញាណ។ ពេលមាន Inflammation បណ្តាលឲ្យមាន Inflammation Hyperemia, Edema, Exudation និងEmicration។

៣. Inflammation Hypermia:

ជាដំណាក់កាលដំបូងនៃ Exudative Process

វាប្រព្រឹត្តទៅដោយហេតុមានសរសៃវិញ្ញាណបាន ត្រូវរួមតូច និងរីកសរសៃឈាម។ ដំបូងសរសៃឈាមខ្លីប បន្ទាប់មករីកធំ ហើយល្បឿននៃឈាមដែលរុញចេញពីបេះដូងកើនឡើងខ្លាំង នាំឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើង (Stasis នាំទៅរក thrombosis) ចរន្តឈាមនាំចូលបេះដូងបានត្រូវបំផ្លាញនាំទៅរកការផ្ទុកកាកសំណល់នៃបណ្តារូបធាតុនាំទៅរក Inflammation Edema ។ នៅពេលនោះ Plasma នៃឈាមចាប់ផ្តើមបញ្ចេញពីសរសៃឈាមទៅក្នុងតំបន់រលាកនៅលាយឡំជាមួយទឹកអំបិល, Protein និង Fibrinogene globuline ។ល។ ការបញ្ចេញ Plasma ពីសរសៃឈាមហៅថា Exudation ហើយអង្គធាតុរវនោះគេហៅថា Exudate ឬExude។

លទ្ធផលនៃការរីកធំនៃរន្ធក្នាសសរសៃឈាម ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញគោលិកាឈាមពីសរសៃឈាម ជាលិកាមួយជាមួយ Emicration ដែរ។ សមាសធាតុនៃ Emicrate អាចជាបុព្វហេតុនៃការរលាក។

Ex: Emicration Neutrophyle ពេលមានការចំលងនៃពពួក Cocus បង្កើតជាខ្ទះ ខាប់។ ប្រសិនបើ Emicrate មាន Eosinophyle (ពេលមានការចំលងនៃ Parasite) នោះគេឃើញមាននៅកន្លែងរលាកនូវកោសិកា Leucocyte ដែលនិយាយដល់ពេលមានការចំលងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃ Microba-teria ។ នៅក្នុង Exude គេឃើញមាន Erythrocyte ហើយនឹងជាលិកាសន្ទាន និង Epithelium ផងដែរ។

Process នៃ Exudative និង Alterative

ប្រព្រឹត្តទៅដោយការដុះដាលនៃកោសិកានៃជាលិកាដែលគេហៅថា Proliferation ។ ជាទូទៅ Prolfiration មានចំពោះជាលិកា Endothelium-Fibroblast និងFibroclast។

៤. បុព្វហេតុនាំឲ្យមាន Proliferation: ដំបូងបង្អស់នៅកន្លែងរលាកមានសារធាតុចិញ្ចឹមជា (Hyperthrophy) កោសិកាបន្ទាប់ពីលូតលាស់ចូលរួមក្នុង Phagocytosis និងជំរាបនៃជាលិកាបានពិការ បំបែកនៃជាលិកា Regeneration របស់ជាលិការបួស ហើយបង្កើតជាតំបន់ខ័ណ្ឌ ឬ តំបន់ទទួលការរលាក។ នៅជុំវិញតំបន់ដែលរលាក នៅទីបំផុតជាលិការលាកទទួលការជំនួសកោសិកាថ្មី ដោយបង្កើតជាសរសៃឈាមថ្មី និង បង្កើតជា Capsul ហ៊ុំព័ទ្ធតំបន់រលាក។

៥. លទ្ធផលនៃ Inflammation: ទាក់ទងនឹង៖

1. វត្តមាននៃ Pathological agent (Microbe parasite, Foreign bodies និងសារធាតុពុល)
2. . ការលុបបំបាត់នៃភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត ដែលជាបុព្វហេតុធ្វើឲ្យមានការរបួសជាលិកា
3. ជំរាប Ecudate និងកំរិតរបស់ Regeneration នៃផ្នែកមានរបួស(រលាក)។
4. តាមទំនាក់ទំនងនេះគេចែកជា៖
 - ការជាសះស្បើយពេញលេញ
 - ការជាសះស្បើយមិនពេញលេញ

ការជាសះស្បើយពេញលេញ គេសង្កេតឃើញនៅកន្លែងដែលរងរបួសបន្តិចបន្តួចនិង ពេល Process Inflammation រង Regeneration មិនពេញលេញពេលគឺ Inflammation ប្រភេទនេះជាសះស្បើយដោយប្តូរប្រភេទជាលិកា។

៦. Diagnosis: ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ផ្អែកលើវត្តមាននៃ Process របស់ Inflammation Alteration, Exudation, Proliferation ។ Inflammation នៅសរីរាង្គក្រៅ(វិស្វកនិងភ្នាសស្តើងផ្សេងៗ) គេឃើញមានសញ្ញាដូចជា៖ រលាកក្រហម(Ruber)-Reness ហើមប៉ោង swelling មានកម្ដៅ Heat color, ការឈឺចាប់ (Pain dolor)និងការបំផ្លាញ Function នៃ Organ (Functio Leasa) ។

៧. ចំណែកថ្នាក់ Inflammation៖ គេចែក Inflammation ដោយសំអាងលើ Process របស់ Inflammation (Alteration Exudation, Proliferation) អាស្រ័យហេតុនេះគេចែកវាជាបីក្រុម។ ក្រុមនីមួយៗ មានប្រភេទ និងទំរង់ផ្សេងៗ។

៦. គ្រោងនៃចំណែកថ្នាក់ InFlammation

❖ **Alterative type**

១- Acute Form

២- Chronic Form

❖ **Exudative type**

១. Serous inflammation

a. Edema-Serous inflammation

b. Hydro-Serous inflammation

c. Edema form

២. Fibrinous Inflammation

a. Surface Inflammation

b. Deeply Inflammation

៣. Suppurative or Purulent Inflammation

a. Abscess

b. Boil or Furuncle

c. Flecmonous Inflammation

៤. Haemorrhagic Inflammation

៥. Cartarrhal or Mucous Inflammation

៦. Gangranous Inflammation'

a. Lumphocytic Inflammation

b. Allergic Inflammation

Proliferative:

1. Focal

2. Diffuse

៩. ការឲ្យឈ្មោះ: Inflammation: ឈ្មោះ: Inflammation

គេកំណត់យកតាមភាសាឡាតាំងនិងក្រិច ដោយភ្ជាប់ពាក្យអ៊ីទីស (Itis) នៅខាងចុងនៃឈ្មោះសរីរៈ ដែលរលាកជាភាសា ឡាតាំង ឬក្រិច។

ឧ. Bronchi □ Bronchitis,

Pleura □ Pleuritis

Myocardi □ Myocarditis

ការឲ្យឈ្មោះបែបនេះបានត្រូវទទួលការពិភាក្សាយល់ព្រមពីគ្រប់វិទ្យាសាស្ត្រ ដែលទាក់ទងដូចជា៖ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ, ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យាជាដើម ។ ប៉ុន្តែមានករណីលើកលែងមួយ ចំនួនដូចជា រលាកសួត(Pulmon □ Pneunonia) ជាដើម ។ ការរលាកនៅស្រោម ឬក្នុងស្មើង (Cell Wall) គេដាក់ Prefix (Peri) នៅក្បែរ រួចថែមឈ្មោះសរីរៈនោះ ដូចជារលាកក្នុងស្មើងនៃថ្លើម Perihepatitis, រលាកស្រោមបេះដូង Pericarditis ប្រសិនរលាកសរសៃចំណង ឬជាលិកាសន្ធាន (Conective tissue) គេថែម Prefix គៀកបង្កើយ ឬនៅក្បែរ Ex: Parametritis, Paranephritis (Para:នៅក្បែរ, Nephritis:តំរង់រោម)។ ការរលាកប្រហោង ឬប្រអប់នៃដងខ្លួនផ្នែកក្នុងស្មើងខាងក្នុងគេប្រើ Endo ខាងក្នុង ដូចជា Endocarditis, Endometritis, Endobronchitis ។ល។ ស្តីពីតំបន់នៃ Inflammation និងការវិវត្តន៍(Process) របស់វា នៅស្រទាប់កណ្តាលនៃប្រអប់ ឬប្រហោងសរីរាង្គគេប្រើ Suffix: Meso or Mezo: Mesoarthritis។ លក្ខណៈពេញលេញនៃការរលាក(Inflammation) ត្រូវបញ្ជាក់ទ្រង់ទ្រាយ រយៈពេលវាវី ឬស្រួចស្រាវ និង ប្រភេទរបស់វា។

២. សណ្ឋាន	ប្រភេទ	ការរលាក
Acute	Cataral	Gastritis
Chronical	Fribours	Pericarditis

ប្រសិនបើសភាពរោគសាស្ត្រដែលកើតឡើងក្នុងលទ្ធផលនៃដំណើរការ(Process)បញ្ចប់របស់ការរលាក(Inflamation)គេតម្រូវឲ្យប្រើពាក្យ Suffix Patia: Pleuropatia, Mastopatia (Mastitis) ។

បំបែកបំបែក Distrophy, Necrosis, Proliferated នៅក្នុងសរីរាង្គ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានបញ្ចេញ Exudate មិនអាចចាត់បញ្ចូលក្នុង Inflammation បានឡើយ ហើយគេឲ្យឈ្មោះបាតុភូតនេះ ដោយប្រើ Sulfix (Os) ភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះសរីរាង្គនោះ Neufros, Limfadenos ហើយប្រសិនបើមានជាលិកាសន្ធាននៅលើសរីរៈដោយបាតុភូតបំបែកទាំង៣ខាងលើគេប្រើពាក្យ Fibros Fibra សរសៃចំណង។

១០.Alterative Type of Inflammation

Alterative type of inflammation មានលក្ខណៈជាបំបែកបំបែក Distrophy និង Necrosis ដែលពេលជាមួយនោះមានប្រភេទ inflammation ២ទៀត៖ Exudative និង Alterative នៅលាយទុំជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទទាំង២ក្រុមនេះ ពុំមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាទេ។ Alterative inflammation៖ នេះគេច្រើនតែជួបនៅលើសរីរាង្គមួយចំនួនដូចជា៖

បេះដូង, ថ្លើម, តំរង់នោម, សួត។ល។

- និមិត្តរូបរោគ៖ inflammation

ប្រភេទនេះកើតមាននៅពេលដែលបណ្តារូបធាតុនៃជាលិកា បានត្រូវបំផ្លាញ ដោយសារធាតុគីមី Toxin នៃ Infection។

គេចែក Alterative Inflammation ជា៖

- Acute form
- Chronic form

A- Acute form:

មានលក្ខណៈជា Necrosis (Necrotic inflammation) នៅលើភ្នាសរំអិល គេឃើញមាកោសិកា Ephythelium និង Distrophic process ផងដែរ ។ ជាញឹកញាប់លក្ខណៈជាគ្រាប់ៗជា Vacuol ជាំកោសិកាខ្លាញ់ដែលលូតលាស់នៅក្នុងសារធាតុនៃកោសិកានៃសរីរាង្គ ។ បម្រែបម្រួល Exudative ពេលនេះលូតលាស់ខ្សោយ និង ប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈជា Inflammation Hyperaemia ។ Proliferative process ជាញឹកញយត្រូវគេឃើញកោសិកាខាតពេលមើល Microscope ដែលមានលក្ខណៈជាកោសិកាដុះរាលដាល ។ ១. Acute form of Al. inflammation អាចជា៖

១- Acute Miocarditis: ពេលមានជម្ងឺអិតក្លាម (F.M.D) នៅពេលគេវះកាត់បេះដូង គេឃើញនៅលើមុខកាត់ ដែលគេវះនូវស្នាមឆ្នុតៗ ក្រហម ស្រដៀងស្បែកខ្លាឈាយឡើងជាមួយប្រផេះលឿង ។

២- Caseous Pneumonia: ពេលមានជម្ងឺ Tuberculosis បង្កើតជាតំបន់ហ៊ុំព័ទ្ធ កោសិកាស្លុត ជួនកាលខ្លួនស្លុតទាំងមូលតែម្តង (តំបន់ត្រូវហ៊ុំព័ទ្ធដោយ Capsul នោះបានត្រូវបាត់ Function ដែលមានលក្ខណៈជាតំបន់ហាប័រណែន ស្រដៀងនិងអង្គមានពណ៌ប្រផេះលឿង ដែលរុំព័ទ្ធទាំងសរសៃឈាម និងកូនទងស្លុត ។

៣- Acute Alterative Hepatitis: បានត្រូវគេពិនិត្យឃើញមានភ្នែកខ្លះនៃថ្លើមមានពណ៌ប្រផេះលឿង Distrophy និង Necrosis នៅកន្លែងដែលរង Hyperaemia ។

B-Chronic From

មានលក្ខណៈជា Atrophy បណ្តាលពីអំពើនៃ Toxin និង ជាតិពុលគីមីយូរលើកោសិកា។ ដូចជាពេលមានជាតិពុលគីមីក្នុងចំណីសត្វ ឬ Toxin មេរោគក្នុងខ្លួនសត្វជាដើម។ លក្ខណៈនៃ Chronic from នេះធ្វើឲ្យជាលិការួមមាឌ ដោយហេតុថា Element Parenchima បានត្រូវរង Atrophy ។ មាន Capsul និង ស្រទាន់ស្តើងៗកើតមាននៅកន្លែងដែលមាន Inflammation ឬ រុំព័ទ្ធសរីរាង្គពីខាងក្រៅជ្រួញៗហើយនៅពេលកាត់សរីរាង្គទទឹងនៅមុខកាត់គេឃើញមានពណ៌ស្លេកស្លាំងមានជលិកាសន្ធានដុះឡើងជំនួសកោសិកា ដែលរង Atrophy។

១១. Exudative type of inflammation

ពេលនេះមានលក្ខណៈជាបំរែបំរួលនៃសរសៃឈាម ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបែប Inflammation Hyperaemia ហើយការបញ្ចេញតាមក្លាសសរសៃឈាមនូវល្បាយឈាម។ Alterative និង Proliferative នៅពេលនេះ បាតុភូតទាំងពីរមានសកម្មភាពខ្សោយជាង Exudative Inflammation ។ ប្រភេទ Inflammation នេះរមែងកើតមាននៅសរីរាង្គ ដែលទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធឈាមផ្ទាល់ និង ដែលសំបូរសំណើមណ(ស្លុត . ក្លាសរំអិល. ខួរក្បាល។ល។)។

ពេលមានអំពើនៃកត្តាខ្សោយល្មម ពេលនេះបង្កើតឲ្យមានជា Serous Exudate ដែលផ្សំដោយទឹក អំបិល Albumine ។ ពេលមានអំពើខ្លាំងបណ្តាលឲ្យមាន Fibrinous Exudate ដែលខុសប្លែកពី Serous Exudate ដោយវាមានបណ្តាញ Fibronogene ក្នុងនោះ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែល serous Exudate និង Fibrinous Exudate មានបូកបញ្ចូលក្នុងល្បាយនៃ

Exudate នូវគោលិកាសនៃឈាម ពេលនោះ Exudate ដែលទទួលបានមានឈ្មោះថា Haemorrhagic Exudate ។ ដូច្នេះប្រភេទ Exudative type of Inflammation នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រភេទមួយទៀត។ ជាទូទៅនៅលើសរីរាង្គដែលទទួល Inflammation គេអាចពិនិត្យឃើញមានប្រភេទផ្សេងៗនៃ Exudative type នៅលាយឡំបញ្ចូលគ្នា។

I. serous Inflammation:

ទឹកថ្លានៃ Exudate ស្រដៀងទៅនិងសេរ៉ូមនៃឈាម ដែលមានល្បាយ៣-៥% protein ដែលធ្វើឲ្យ Inflammation ប្រភេទនេះខុសពីការហើមមានទឹក ដែលគេហៅថា Transudate គេចែកជា៣ ទំរង់ផ្សេងទៀត:

១. Serous Inflammation : មាន Exudate នៅចន្លោះជាលិកា នៅចន្លោះជាលិកាសន្ទានទណ្ឌរង់មានលក្ខណៈហើមប៉ោង ដោយ Hyperemia ដែលមាន Serous Exudate និង ការដុះជាលកោសិកានៅក្នុងជាលិកា។ ប៉ុន្តែទូទៅការហើមប៉ោងពុំ សុទ្ធតែជាលក្ខណៈនៃ Hyperaemia និង ការដុះជាលកោសិកាទេ។ និមិត្តហេតុនៃ Form Inflammation នេះគឺបណ្តាលពីរញ្ជាជ ដោយសារធាតុគីមី, សារធាតុពុល, និង Toxin ។

ប្រសិនបើនិមិត្តហេតុតែបន្តនោះ Process ប្រព្រឹត្តទៅជាប្រភេទខ្លះ (pus) និង Haemorrhagic inflammation ។

២. Serous Inflammation Hydrolis: គេឃើញមាន Exudate ផ្ទុកនៅក្នុងប្រអប់ដងខ្លួន និង ថ្នក់នៃសរីរាង្គ។

៣. Form of Diseases មានការបង្កើតជាពងបែក (pustule) ក្រោមអំពើនៃកត្តា Physical, Chmical ។ល។

II Fibrinous Inflammation:

មានលក្ខណៈជា Exudate ស្នូតបង្កើតពី Fibrine ។ អាស្រ័យដោយទីកន្លែងរបស់វា Exudate មាន២ប្រភេទ:

- Crupos (សើវៗ)
- Diphtheriaca(Deephy)

១- Crupos Inflammation ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយបង្កើតជាស្រទាប់ស្តើងៗ។ មេរោគបង្ក inflammation ប្រភេទនេះអាចជា Pasteurella, Pneumococci, Virus, Bacteria, Paratiphoid

១ល។ Inflammation ប្រភេទនេះមានសញ្ញា ដូចជាបង្កើតជាស្រទាប់ស្តើងៗនៃ Fibrin គ្របដណ្តប់លើក្លាសរមិល និង សរីរាង្គផ្សេងៗ ដែលដំបូងងាយស្រួលក្នុងរាបកចេញពិនិត្យឃើញហើម Hyperaemia ស្រាមសរីរាង្គសន្លឹង និង រលោង។ ២. Fibrinous Pericarditis, Pleuritis, Enteritis និង cropos Pneumonia ។

២- Diphtheria (Dee phy): មានលក្ខណៈជាការបង្កើត Fibrine នៅក្នុងដំរៅនៃជាលិកាទ្រង់ទ្រាយនេះតែងតែជួបប្រទះនៅលើពោះវៀន។ កន្លែងដែលទទួលរង Inflammation ប្រភេទនេះក្លាសរមិលមានសភាពស្ងួតគ្របដណ្តប់ដោយក្លាសស្តើងស្វិតពណ៌ប្រផេះក្លៀវ។ ច្រើនបង្កឡើងដោយសារ Bacterium salmonella ជាពិសេសជម្ងឺ Salmonellosis ដែលកោសិកានៅក្នុងតំបន់រាតត្បាតបានត្រូវដាច់ បង្កើតជាតំបន់ Necrosis និង (Aftae)-Ulcer។

C. Purulent inflammation:

បង្កដោយ Exudate ដែលមានគោលិកាសឈាមជាច្រើន ។ Exudative ប្រភេទនេះមានឈ្មោះថា ខ្ទះ ដែលកើតឡើងពីជាលិកាខ្ទះ (គោលិកាស) និង សេរ៉ូមខ្ទះ ដែលបានមកពី Plasma ឈាមមានអង់ស៊ីម ដែលរំលាយជាលិកាខ្ទះ ហើយដែលអាចជៀសចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Lymph និង ឈាមបាតុភូតនេះហៅថា Methastasis ។

- Abscess: មានខ្ទះស្ថិតនៅចន្លោះជាលិកា
- Suppuration (Empiema) មានខ្ទះនៅក្នុងប្រអប់ ឬ ប្រហោង ឬ រន្ធនៃ សរីរាង្គ។
- Phlegnone: Diffuse ខ្ទះនិង Exudate ខ្ទះនៅចន្លោះ Tissue Element។

D. Haemorrhagic Inflammation:

បង្កដោយ Exudate ដែលមានគោលិកាក្រហមឈាម រមែងជួបប្រទះនៅពេលមានជម្ងឺ ស្រួចស្រាវ និង ការពុលធ្ងន់ធ្ងរ។

E. Catarrhal Inflammation:

ច្រើនកើតមានលើក្លាសរមិល ដោយបង្កើតជា Exudate ខ្ទះ Serous រមិល ឬ មានលក្ខណៈជា Haemorrhagic ។

F. Gangrenous Inflammation

មានលក្ខណៈជាការរលាយនៃជាលិកា ពេលមានវត្តមាននៃ Microflora ។
ផលិតផលនៃជាលិការលាយនេះគឺ សារធាតុពុលដ៏ខ្លាំងក្លា ដែលអាំសម្លាប់សត្វយ៉ាងទាន់ហាន់ ។

១២.Proliferativr type of Inflammation

ប្រភេទ Inflammation នេះប្រព្រឹត្តទៅ ដែលនៅពេលនោះតាំងពីដំណើរការដំបូរនៃ Inflammation មានការដុះដាលលូតលាស់នៃ cell Element ហើយដែល Type inflammation ពីរផ្សេងទៀត មានសកម្មភាពខ្សោយ។ Proliferative inflammation ពេលខ្លះគេហៅថា Productive inflammation ដោយហេតុថាមានការដុះដាលលូតលាស់នៃកោសិកា, Stroma តែកោលិកា Parenchima បានត្រូវវែង Atrophy ឬត្រូវវែង Necrosis ។ ជួបប្រទះជាញឹកញាប់ពេល Tuberculosis និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនទៀត។ ជួនកាល Inflammation បានត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថា Special Inflammation ។ គេចែកជា: Focal and Diffuse។

ជំពូក៤.

ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ (Causative Agents)

ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរួម មាន៖

១. បាក់តេរី- (Bacteria)

គេជួបប្រទះបាក់តេរីនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងធម្មជាតិ។ បាក់តេរីមួយចំនួនធំ ជាសាប្រូហ្វីត- (Saprophytic Bacteria) ដែលរស់ នៅលើរុក្ខជាតិដាច់ ឬសាកសពសត្វ។ មួយចំនួនទៀត រស់នៅក្នុងសញ្ជាតិកាយ ក្នុងពោះ វៀន (Intestine) រន្ធច្រមុះ (Nostril) មាត់ (Mouth) ។ (Non-Pathogenic). ចំណែកមួយចំនួនទៀតជាអ្នក បង្ករោគ (Pathogenic)។ បាក់តេរី គឺជាឯកកោសិកា ហើយគេអាចពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍ តាមការដាក់ពណ៌ (Staining)។ ការលូតលាស់ (Multiplication) មិនមានភេទ (Asexual)។ បាក់តេរីមានទម្រង់ (Form) ដូចជា៖

- Coccus - រាងមូលតំរៀបគ្នាជាខ្សែ ឬ ចង្កោម៖ Streptococcus, Staphulococcus,
- Rod - រាងពងក្រពើ ដូចជា៖ Brucella, Pasteurella, Salmonella, ...
- Bacillus - រាងជាដំបង ដូចជា៖ Bacillus Anthracis, Clostridium, ...
- Spiral - មានរាងអង្កាញ់ ដូចជា៖ Leptospira, Treponema, ...
- Vibrio - មានរាងជាចំណិតខែ ដូចជា៖ Vibrio jujuni, Vibrio Cholera, ...

គេចែកបាក់តេរីទាំងអស់ជា២ក្រុម គឺ៖ (១) ក្រុមក្រាមអវិជ្ជមាន (Gram Negative) ដែលមានពណ៌ ផ្កាយក្រហម ឬ ក្រហម និង (២) ក្រុមក្រាមវិជ្ជមានក្រាម (Gram Positive) ដែលមាន ពណ៌ខៀវ ឬ ស្វាយពេល គេដាក់ពណ៌តាមក្រាម (Gram Stain)។

២- វីរុស (Virus) :

ជាតំរូវការងាយធ្វើការចំលង ហើយដែលលូតលាស់តែក្នុងកោសិកាជីវិត (Living Cell)។ ណ្វៃយ៉ូអា ស៊ីត Nucleic របស់វាអាចបង្វែរទិសនៃការសំយោគរបស់កោសិកា ឱ្យទៅជាការបង្កើតកោសិកាវីរុសថ្មីៗទៀត។ ជម្ងឺបង្កដោយវីរុស ភាគច្រើនណ្វៃយ៉ូ (Nucleus) ឬស៊ីតូប្លាស (Cytoplasm) នៃកោសិកាឯការពត្តាត ឃើញមានសារធាតុមូល ឬ ពងក្រពើ ដែលគេហៅថា Inclusion Bodies។ ការផ្តុំគ្នានៃកោសិកាដាច់ បណ្តាលដោយវីរុស គេហៅថា Negri-bodies ហើយដែលត្រូវគេពិនិត្យឃើញ Inclusion Dody nig Negri-body បានតាមរយៈនៃការសិក្សាលិកាវិទ្យា (Hystology)។ គួរកត់សំគាល់ថា វីរុសពុំអាច បានត្រូវសំលាប់ ដោយថ្នាំសំលាប់មេរោគទេ។

៣- រីកេតស៊ី (Rickettsias) :

ជាក្រុមមួយនៃអតិសុខុមប្រាណដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបាក់តេរី និង ស្រដៀងទៅ នឹងវីរុស។ វាមានទំហំតូចជាងបាក់តេរី (ប្រវែង ០.២-០.៣ មីក្រុង និង មានទំហំ ០.៤ មីក្រុង)។ ភាគច្រើននៃ រីកេតស៊ី ធ្វើការចំលងតាមរយៈ ពពួកអាត្រូប៉ូដ (Athropod) គឺជាក្រុមសត្វល្អិត (Insect) ពពួកសំបកខ្លួនរឹង (Crustacean) ដូចជា បង្កង ក្តាម ខ្យង ខ្មៅ និង ពពួក អារាក់យីណូអ៊ីដ (Arachinoid) ដូចជា ពីងពាង (Spider) ខ្នុយ ខ្លាជំរី (Scorpion)។ រីកេតស៊ីរស់នៅក្នុង កោសិកា និងជាលិការស់ ហើយមានទំរង់ មូល (Coccus) ពងក្រពើ (Rod) និង ខ្លះទៀតជាសរសៃឆ្មា (Filament)។ ពួកនេះជាពួកក្រាមអវិជ្ជមាន។ វាងាយ ងាប់នៅពេលប៉ះសារធាតុគីមី ភាពស្ងួត និង កំដៅ ហើយ ការលូតលាស់របស់វា ត្រូវអសកម្មក្រោមអំពើនៃថ្នាំ សំលាប់មេរោគ (ពួកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក)។

ការចំលងរបស់រីកេតស៊ី ប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈ ការខាំជញ្ជក់ឈាម នៃពពួក ចៃ តុកែ រុយ ល្បោម។ ការចំលងតាមរយៈ អាត្រូប៉ូដ ប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅនឹង រីកេតស៊ី និង អាត្រូប៉ូដនោះ។ លក្ខណៈពិសេស នៃ ពពួកអាត្រូប៉ូដ ដូចជា ទិច ខាំជញ្ជក់ឈាម ពាក់ព័ន្ធដល់ កំរិត និង សភាពខុសគ្នារបស់ រីកេតស៊ី ដូចជាករណី ជម្ងឺ Herato- Conjunctivitis និង Ornithosis បក្សីជាដើម។

៤- ពពួកផ្សិត (Fungus) :

ជាសមាជិករដ្ឋសត្វ (Kingdom) ពួកបន្ថែម។ ប៉ុន្តែពួកនេះពុំមានក្លរូហ្វីលទេ (Chlorophile) - វាជាប់រ៉ា ស៊ីត ឬ សាប្រូហ្វីត ហើយវាគ្មានឫស (Root) គ្មានសំបក (Stem) និងស្លឹក (Leaves) ទេ។ វាមានរូបរាងជា មែកធាង (Vegetative body ឬជា Mycelium ដែលផ្គុំដោយមែក (Filament/Hyphac)។ មែក (Branch) វានីមួយៗមានឫគ្មានផ្សំដោយកោសិកាដាច់ៗពីគ្នា។ ករណីខ្លះដូចជាផ្សិត (Yeast) មាន Hyphae តិចតួច។ ការបន្តពូជអាចមានភេទ (Sexual) ឬគ្មានភេទ (Asexual)។ ណ្ឌូយ៉ូនៃស្ព័រ (Spore) មាននាទីសំខាន់ក្នុងការ លូតលាស់ និង សាយភាយការបង្ករោគ។ Fungi មួយចំនួនធំ ដែលសិក្សាក្នុងផ្នែកបសុពេទ្យ គឺពពួកថ្នាក់ Hyphomycetes ឬ Fungi Imperfecti។

៥- ពពួកប្រូតូសូអា (Protozoa) :

ជាសមាជិកនៃក្រុម កោសិកាទំរង់ដូចគ្នា (Unicellular)។ វាខុសពីបាក់តេរីដែលជា Unicellular ដែរ ដោយប្រូតូសូអា មានលក្ខណៈ (Characteristic) ដោយមានសរីរាង្គ Cilia ដែលជាសរសៃឆ្មាខ្លី (Hair-Like Structure) មានចំនួនច្រើននៅលើភ្នាសខ្លួនរបស់វា

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

- ព្រូនសំប៉ែតវែង (Phylum Plathelminthe/Cestod)
- ព្រូនមូល (Phylum Nemahelminthe/Nematod)
- ព្រូនសំប៉ែតខ្លី (Phylum Tremahelminthe/Trematod)

ព្រូនសំប៉ែតខ្លីជាពួកបន្តពូជតាមភេទ (Sexual)។ ប៉ុន្តែពួកនេះមួយចំនួនធំជា Monosexual: សារពាង្គកាយមួយ រួមមានភេទពីរ គឺញីផងនិងឈ្មោលផង។ ដូចជា ពពួកដង្កូវថ្លើម (LiverFluk) ជាដើម។ ព្រូនមូលជាទូទៅ មានការបង្កកំណើតដោយមានភេទពីរដោយឡែកពីគ្នា គឺមានព្រូនញី និងព្រូនឈ្មោល។ ជាទូទៅព្រូនឈ្មោលមានទំហំតូចជាងព្រូនញី។ ដូចជា Ascaris ជាដើម។

ព្រូនសំប៉ែតវែងមានដងខ្លួនផ្សំឡើងដោយកង់ (Segment/Glottis): ដែលជាកង់ៗបន្តគ្នាបង្កើតជា សព្វកាយ។ ក្នុងកង់របស់វានីមួយៗមានប្រដាប់រំលាយអាហារ និង ប្រដាប់បន្តពូជទាំងពីរភេទ ដូច្នោះ ពួកនេះ ជា Monosexual។ ការលូតលាស់របស់ព្រូនសំប៉ែតវែងនេះ ទាមទារខួបជីវិត (Live Cycle) ហើយដែលមាន Host មួយជាសត្វមានផ្ទៃកង់ (Intermediate Host) ដូចជាពពួកតេញ៉ាជាដើម។

ខ- បរាស៊ីតក្រៅខ្លួន- ជាពពួកដែលរស់នៅ និងរាតត្បាតនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃសរពាង្គកាយរបស់ Host។ បរាស៊ីតក្រៅខ្លួនស្ថិតនៅក្នុង Phylum Arthropod ហើយដែលមាន:


- ពពួកសត្វល្អិត (Insect)
- ពួកអារ៉ាក់ណូអ៊ីដ (Arachnoid) ដូចជាពីងពាង ខ្លួយ ខ្សាដំរី ជាដើម

ពពួកបរាស៊ីតក្រៅខ្លួននេះ មានសរីរាង្គរបស់វាផ្តុំឡើងដោយ ជើង សំបកខ្លួនរឹង ដែលជាផ្នែកបង្កើតរូប រាង និង ដងខ្លួន: ក្បាល (Head) ទ្រូង (Thorax) និង ពោះ: (Abdomen) ហើយមានតែរូបផ្តុំ ខាងក្រៅ និង គ្មានរូបផ្តុំក្នុងទេ (No Endoskeleton)។

ពពួកសត្វល្អិតមានលក្ខណៈដូចជា មានជើងគួរ ហើយខ្លួនវាចែកចេញជា បីផ្នែក -- ក្បាល ទ្រូង និង ពោះ។ ពួកនេះមួយចំនួនធំ មានស្លាបពីរគួរ មួយចំនួនទៀតមានស្លាបមួយគួរដូចជា Dragofflies ហើយខ្លះទៀត គ្មានស្លាបទេ ដូចជាចៃ (Flea) និង ស្រមោច។ ពពួកតុកកែ (Tick) - មានខ្លួនរឹង និងទន់ ហើយ មេកមរមាស់ (Mite) ពេញវ័យមានជើង៤គួរនិង មានមាត់ច្បាស់លាស់ជំនួយវាឱ្យមានលទ្ធភាពតោងខាំសត្វ។ នៅតូចតុកកែ មានលក្ខណៈដូចសត្វល្អិត ដែលមានជើង ៣ គួរ គត់។

៧- បុព្វហេតុបង្កជម្ងឺផ្សេងទៀត ៖

ជាចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីកត្តាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពិតប្រាកដមួយដើម្បី
បកស្រាយ អំពីការវិវត្តន៍នៃជម្ងឺ។



គំនូសបំព្រួញ ៤: បុព្វហេតុបង្កជម្ងឺ

ក- បុព្វហេតុដែលបង្កដោយខ្លួនឯង ឬខាងក្នុង មានជម្ងឺជាច្រើន ដែលធ្វើការចម្លងតាមសែន។
 វា អាចជាការចម្លងតាមសែនរបស់ពូជ ឬ មេ-បាដែលផ្តល់ដល់កូនជាមរតកខ្សោយក្នុងការធន់នឹង
 ការរាតត្បាត ដូចជាករណី Canine haemophilia ឬ ផ្តល់ទៅឱ្យកូនជាមរតកលប់ (dominant
 inheritance) ដូចជាករណី (Curced limbs) សាច់ជុំកោង។ ករណីជាច្រើនទៀត
 ដែលជួបប្រទះនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជជាន់ឈាម (Homozygons) ដែល បណ្តាលឱ្យអំប្រើ យ៉ុង
 ឬកូនសត្វស្លាប់ជាច្រើន ហើយករណីខ្លះទៀត បណ្តាលឱ្យមានការលូតលាស់មិនប្រក្រតី
 នៃអំប្រើយ៉ុងជាដើម ។

បុព្វហេតុបង្ករោគបែបនេះ ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអាយុសត្វ, ពូជ, ភេទ, ប្រភេទ សត្វ
 ពណ៌សំបុរ, ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌកាយវិភាគវិទ្យា សរីរវិទ្យា របស់សត្វនីមួយៗផ្ទាល់ ។

ខ-បុព្វហេតុដែលបង្កពីខាងក្រៅខ្លួន

ដំណើរវិវត្តន៍នៃការចម្លងរោគ បានបង្កឡើងដោយសមត្ថភាព និងកម្លាំងរបស់មេរោគ
 ចំនួនដូចជា រីស, បាក់តេរី បរ៉ាសិត និងពពួកផ្សិតផ្សេងៗទៀតជាដើម។ លក្ខណៈ

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

ពិសេសនៃដំណើរវិត្តន៍ របស់ការចម្លងរោគនេះ គឺបណ្តាលពីខាងក្រៅសុទ្ធសាធ ដែល បង្កគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុង សាតាំងកាយសត្វ។ ពពួកភ្នាក់ងារបង្ករោគធ្វើការច្រៀតចូល ក្នុងសាតាំងកាយសត្វ និង ធ្វើការជ្រើសរើសកន្លែងរាតត្បាត និង រស់នៅ (Tropism) ហើយដែលបង្កើតឱ្យមានការប្រែប្រួល និងរោគសញ្ញាគ្លីនិច នៃជម្ងឺដោយមានការចូល រួមនៃប្រតិកម្មរបស់សាតាំងកាយ ក្នុងអំពើបង្កើត ភាពសាំផងដែរ។ លក្ខណៈ និង ភាពខុសគ្នានៃភ្នាក់ងារបង្ករោគនីមួយៗ បានត្រូវរកឃើញដោយ ការស្រាវជ្រាវលើរូបរាង, សមាសធាតុផ្សំ, សារធាតុពុល និង ការបង្ករោគរបស់វា តាមរយៈការធ្វើ តេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ និង ការវិភាគរោគសញ្ញាព្រមទាំងព័ត៌មានរាតត្បាតរបស់វា។

កត្តាជាបុព្វហេតុបង្ករោគមួយចំនួនទៀតក្រៅពីក្រុម អតិសុខុមប្រាណ (Animate) ទាំងឡាយ ជាភ្នាក់ងារបង្ករោគមិនចម្លង (Non-infective Agent)។ ពពួកទាំងនេះ មានដូចជា កត្តាចំណី អាហារ, អាកាសធាតុ (Climate) អំពើមេកានិច (Mechanical Act) អំពើរូប (Physical) ដូចជាកំដៅ (Heat) ត្រជាក់ (Cold) ពន្លឺ (Radiation) ។ល។ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ សុខភាពសត្វ ។

គ- បុព្វហេតុដែលបង្កដោយអំពើនៃរូបសាស្ត្រប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍

បព័ន្ធសរសៃប្រសាទ មានមុខនាទី និងសកម្មភាពជាយន្តការការពារ សាតាំងកាយ (Mechanical defense of organism)។ ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបានត្រូវគេចាត់ទុកជាសកម្មភាពសរសៃសាស្ត្រទប់ ទល់ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ។ ជម្ងឺអាចបង្កឡើងដោយការប៉ះទង្គិច (Impact) ទៅលើអារម្មណ៍បណ្តាលពី អំពើរូបផ្សេងៗ។ ដូចជាករណីស្រ្តេស កើតឡើងផ្ទុះៗ ឬ ញឹកញាប់ចូលរួមបង្កឱ្យមានជម្ងឺរលាក ក្រពះ (Gastric ulcer Gastritis) ចំពោះសត្វជ្រូក “ឯកសាររោគសាស្ត្រទូទៅ”។

៥. ផ្លូវចំលងរោគ

Route of Infection

មេរោគបង្កជំងឺអាចច្រៀតចូលទៅក្នុងសព្វកាយតាមផ្លូវ (Route) ជាច្រើនដូចជា:

១-ស្បែក (Skin) :

ស្បែកជាជាលិកាដ៏ធំ ដែលគ្របដណ្តប់ខ្លួនសត្វ ហើយជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់បាក់តេរី គ្រប់ប្រភេទ។ មាន បាក់តេរីមួយចំនួនរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ ប៉ុន្តែស្បែកអាចការពាររាល់ការ ច្រៀតចូលរបស់ពពួកបាក់តេរីទាំងនេះ ដោយអាចការពាររាល់ការច្រៀតចូលរបស់ ពពួកបាក់តេរីទាំងនេះ ដោយសារប្រព័ន្ធការពារមេការនិច (Epi-thelium) របស់ស្បែក។

ការចំលងមេរោគមួយចំនួនធំប្រព្រឹត្តទៅតាមស្បែក។ នៅពេលស្បែកមានរបួស (Trauma) គឺប្រព័ន្ធការ ពារមេការនិចរបស់ស្បែកបានត្រូវបំផ្លាញមេរោគអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងសព្វកាយបានយ៉ាងងាយ ដូចជាពពួក Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Corynebacterium, Leptospira, Clostridium និង ជាពិសេស Bacillus Anthracis ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពរាតត្បាតក្នុងសព្វកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការចំលងតាមស្បែកដែលគ្មានរបួសអាចជាពពួក បារ៉ាស៊ីត (Parasitic Infestation) ដូចជាពពួកដង្កូវ Strongyl អាចជ្រៀតចូលតាមស្បែកគ្មានរបួស។

ការខាំ ទិច ជញ្ជក់ឈាម នៃពពួក រុយ (Flies) មូស (Mosquitoes) ត្រកកែ (Tick) មេកម (Mite) សង្កើច (Bug) ជាដើមហេតុនៃការចំលងរោគតាមស្បែក ដូចករណីជំងឺ Babesiosis ឆ្លងពីសត្វមួយទៅសត្វ មួយទៀត តាមរយៈការទិច ឬខាំរបស់ Vector។

២-ប្រដាប់រំលាយអាហារ (Alimentary Tract/Digestive Tract) :

២.១. មាត់ (Mouth): ដូចស្បែកដែរ គេបានឃើញមេរោគមួយចំនួន ដែលច្រៀតចូល ទៅក្នុងកោសិកាតាមមុខរបួសនៃសាច់ដុំមាត់ (Buccal Mucosa) ដែលបណ្តាលពីការ មុតអង្គធាតុរឹងដុំចំណីរឹង បណ្តាល ឱ្យរលាក និង អាចបណ្តាលពីការដុះមិនស្មើនៃធ្មេញ។ ធ្មេញមិនស្មើនេះ ធ្វើឱ្យមានរបួសក្នុងមាត់ពេលទំពៀអាហារ -ករណីនេះ ផ្តល់លទ្ធភាពងាយ ស្រួលដល់ការរាតត្បាត ពីសំណាក់មេរោគក្នុងមាត់។

២.២. ពោះវៀន (Intestine): អតិសុខុមប្រាណអាចបង្កជម្ងឺតាមមធ្យេបាយពីរ:

- ការលូតលាស់នៃមេរោគក្នុងពោះវៀន (Multiplication of intestinal bacteria)
- ការបង្កើតសារធាតុពុលរបស់មេរោគ (Toxin) ដែលបំផ្លាញភ្នាសសរសៃឈាម និង ច្រៀតចូល ទៅក្នុងឈាម ពីពោះវៀន។ ពួក Bacillus អាចច្រៀតចូល និងលូតលាស់ នៅក្នុងពោះវៀន បានយ៉ាងប្រសើរ ហើយបណ្តាលឱ្យមានការរលាកនៅក្នុងពោះវៀន (Enteritis) រលាកភ្នាសសរសៃឈាម (Inflammation of blood vessel) និង រលាកជាលិកាក្រពេញទឹករងៃ (Lymphangitis)។ មេរោគអាចរាតត្បាត ពេញសព្វកាយ តាមរយៈឈាម (Septicemia)។

២.៣. ត្របកភ្នែក (Conjunctiva): បាក់តេរីមួយចំនួនដូចជា Brucella, Cryptococcus អាចចំ លងផ្ទាល់តាម ត្របកភ្នែកគ្មានរបួស។

២.៤. ប្រដាប់ដង្ហើម (Respiratory Tract): តាមរយៈការដកដង្ហើមចូល (Inhalation) មេរោគ ចូលទៅដល់ជាលិកាសួត។ ដូច្នេះផ្លូវដង្ហើមជាច្រកសំខាន់នៃការចំលងរោគប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពារមេកានិចនៃ ប្រព័ន្ធដង្ហើមចុះខ្សោយជាពិសេសចំពោះសត្វស្នម។ ការចំលងជម្ងឺរបេង (Tuberculosis) និង ជម្ងឺឆ្លងផ្សេង ទៀត ជាពិសេសជម្ងឺបង្កដោយរីស --ការចំលងតាមប្រដាប់ ដង្ហើមកើតឡើងជាញឹកញាប់។

២.៥. ប្រដាប់បន្តពូជ និងប្រព័ន្ធទឹកម៉ូត (Genito-Urinary Tract): ជម្ងឺ Brucellosis ជ្រូក ជម្ងឺ Trichomoniasis គោក្របី បានធ្វើការចំលងតាមរយៈការសេពមេប៉ូន (Coitus)។ ការរលាកនៅស្បូន (Endometritis/Metritis) និង ទ្វារបន្តពូជញឹក (Vaginitis) ពេលសត្វកើតកូន ជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផល ដល់ការរាតត្បាតនៃមេរោគគ្រប់ប្រភេទ។

២.៦. កន្សោមដោះ (Mammary Gland): ការចំលងភាគច្រើននៃករណីនេះបណ្តាលពីមានការ រលាកកន្សោមដោះ (Mastitis) ឬ ការចំលងប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈក្បាលដោះ (Teat)។

៦. របៀបចំលងរោគ

Mode of Infection

ការចំលងរោគអាចប្រព្រឹត្តតាមច្រើនរបៀបដូចជា:

១- ការប៉ះផ្ទាល់ (Direct Contact) :

១.១. ប្រដាប់បនពូជ (Genital Tract): ជម្ងឺ Brucellosis និង Trichomoniasis ធ្វើ ការចំលង តាមរបៀបប៉ះផ្ទាល់នៃប្រដាប់បនពូជសត្វញី និង ឈ្មោល ពេលបង្កាត់ពូជ។ ឬអាចចំលង តាមប្រដាប់ប្រដារ ប្រើប្រាស់សំរាប់បង្កាត់ពូជមិនស្អាត។

១.២. ស្បែក-ភ្នាសស្តើង (Skin/Epithelium): ការខាំនៃសត្វឈឺជម្ងឺឆ្លងចំលងទៅសត្វផ្សេង ទៀតតាមរយៈស្បែក។ ជម្ងឺឈាមខ្មៅគោក្របី (Anthrax) អាចឆ្លងទៅមនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់សាកសព សត្វស្លាប់ផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល -- តាមរយៈការប្រើប្រាស់សំភារៈធ្វើអំពីស្បែកសត្វស្លាប់ដោយជម្ងឺឈាម ខ្មៅ ដូចជាមួកស្បែកជើងខ្សែក្រវាត់ ក្នុងរោមសត្វ ។ល។

១.៣. ឆ្លងតាមរបួស (Wound Infection): ជម្ងឺតេតាណូស ដែលបង្កដោយ Clostridium Tetani ធ្វើការចំលងតាមការមុត ឬតាមរបួសផ្សេងៗ។

១.៤. ឆ្លងតាមតំណក់ (Droplet Infection): នៅពេលសត្វឈឺក្អក ឬ ក្រដាសមេរោគចំលងបាន ត្រូវព្រួសចេញមកក្រៅទៅក្នុងខ្យល់ជាមួយទឹកសំបោរ។ វាជាតំណក់មេរោគ ដែលមានសមត្ថភាពចំលងខ្ពស់។ តំណក់មេរោគនេះបានទៅប្រឡាក់ប្រឡូសនឹងចំណី ទឹក វាលស្មៅ ដែលសត្វផ្សេងទៀតលេបចូលទៅសព្វកាយ ហើយទទួលការចំលងរោគ។ ភាគច្រើននៃការចំលងប្រភេទនេះ មានចំពោះជម្ងឺរលាកស្រាមសួត (Pleuro-Pneumonia) និង សួត (Pneumonia) ជម្ងឺអុតក្តាម (Foot and Mouth Disease) ជម្ងឺសារទឹកគោ ក្របី (Haemorrhagic Septicemia) ជម្ងឺរបេង (Tuberculosis) ជម្ងឺញៀវកាសបក្សី (Newcastle Disease) ជម្ងឺអាសន្នរោគបក្សី (Folw Chollera) ។ល។

២-ដោយមានពីកំណើត (Congenital Transmission) :

មេរោគអាចចំលងទៅអំប្រើយ៉ូងតាមផ្លូវពីរ:

២.១. តាមអូវ (Oval Route/Vertical Infection): ជម្ងឺរាតសបក្សី (Bacillary White Diarrhoea) ដែលបង្កដោយ Salmonella Pullorum --មេរោគធ្វើការចំលងពីកន្សោមពងមេ (Ovum) ទៅ ស៊ីត/ អំប្រើយ៉ុង និងតាមរយៈទឹកកាម នៃសត្វឈ្មោលទៅក្នុងបំពង់អូវ (Oviduct) ។

២.២. តាមទងសុខ (Placenta): មេរោគចំលងតាមរយៈឈាមមេតាមទងសុខចំលងទៅអំប្រើយ៉ុង។ មេរោគកាចសាហាវមួយចំនួនធំ ដូចជា Brucella, Bacillus Anthracis និង វីរុសជម្ងឺប៉េស្តជ្រូក (Swine Fever) អាចចំលងតាមទងសុខ ទោះបីវាជារបាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំក៏ដោយ។

៣- ដោយប្រយោល (Indirect Contact) :

៣.១. តាមរយៈទឹក និង ចំណី: ចំណីអាហារ និងទឹកក្រខ្វក់ជាប្រភពនៃមេរោគបង្កជម្ងឺ។ ជម្ងឺប៉េស្តគោ-ក្របី (Rinderpest) សារទឹក (HS) របេង (TB) របេងពោះរៀន (Paratuberculosis) ជម្ងឺដង្កូវថ្លើម (Fasciosis) ជាដើមធ្វើការចំលងតាមរយៈទឹក ចំណីអាហារ។

៣.២. តាមរយៈទឹកដោះ: ជម្ងឺរបេង និង អុតក្តាម មេរោគមានក្នុងទឹកដោះសត្វឈឺ។ សត្វជីកទឹក ដោះសត្វឈឺបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងជម្ងឺជម្ងឺរបេងគោក្របីបានចំលងទៅមនុស្សភាគច្រើន តាមរយៈការផឹក ទឹកដោះសត្វឈឺ។

៣.៣. តាមរយៈសំភារៈប្រើប្រាស់ --សំភារៈប្រើប្រាស់ ដែលពុំបានធ្វើការសំលាប់មេរោគល្អ ក្លាយជាប្រភពចំលង។ តាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការព្យាបាលមេរោគអាចចំលងទៅសត្វមួយទៀតបានយ៉ាង ងាយ ដូចជាតាមម្ជុលចាក់ថ្នាំ (Needle) កាំបិទវះកាត់ ស្រោមដៃ ។ល។


៧. ការសិក្សាអំពីវិទ្ធិសញ្ញា

Symptomatology

ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាទៅលើរោគសញ្ញានៃជម្ងឺមួយចំនួន ។

ក- រោគសញ្ញា (Symptom): ជាការបញ្ជាក់អំពីភាពខុសប្រក្រតីនៃផ្នែកអារម្មណ៍ និង កាយសម្បទាសត្វ។ នៅក្នុងវេជ្ជបណ្ឌិត ដោយឡែក វេជ្ជសាស្ត្របសុព្យាបាល ការរៀបរាប់ដោយសត្វឈឺបែបនេះពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ឡើយ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ ម្ចាស់សត្វ ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងសត្វអាចរៀបរាប់ និង បកស្រាយប្រការប្រែប្រួល ចំពោះសត្វ របស់ខ្លួនបានខ្លះ ។

ខ- សញ្ញា (Sign) : វាគឺជាការបញ្ជាក់នៃជម្ងឺ ដែលបានពិនិត្យតាមលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់។ វាបានត្រូវធ្វើការពិនិត្យ ដោយបសុពេទ្យ គឺនិចដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសត្វដូចជា: ភាពស្លេកស្លាំងនៃអញ្ចាញធ្មេញ, ភ្លាស ស្នើង ទឹកនោមក្រហម គឺជាសញ្ញានៃ Anaemia និង Haematuria ដែលជារោគសញ្ញា (Symptoms) នៃជម្ងឺ ។



តំនូសបំព្រួញ ៥: រោគសញ្ញានៃជម្ងឺ

១- Subjective Symptoms

បញ្ជាក់អំពីការចាប់អារម្មណ៍ និង ការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍របស់សត្វឈឺ។ ប្រការនេះងាយអនុវត្តក្នុង វេជ្ជសាស្ត្រមនុស្ស ដែលអ្នកជម្ងឺអាចពន្យល់រៀបរាប់ អំពីប្រការដែលខ្លួនកំពុងជួបប្រទះដល់ត្រូវពេទ្យ ដូចជា កន្លែងមានការឈឺចាប់ អំពើ អាការៈប្រែប្រួលលើសរីរាង្គមួយចំនួនជាដើម ប៉ុន្តែវាជាប្រការដែលពុំអាចកើត

ឡើងក្នុងវេជ្ជសាស្ត្របសុពេទ្យ។ ដូច្នោះដើម្បីយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងនេះ ចំពោះសត្វ តម្រូវឱ្យមានការយក ចិត្តទុកដាក់ ពិនិត្យ អង្កេតសត្វឈឺផ្ទាល់ ដោយបសុពេទ្យ ឬ សាកសួរ ម្ចាស់សត្វ ។

២- Objective Symptoms :

គឺជាការកត់សំគាល់រោគសញ្ញាដែលសត្វឈឺមាន តាមរយៈការពិនិត្យតាមវិធីពិនិត្យមួយចំនួន។ ក្នុង ការអនុវត្តន៍ បសុពេទ្យបានប្រើប្រាស់ Objective Symptoms នេះនៅពេលដែល Subjective Symptoms ពុំអាចធ្វើបាន។ ការពិនិត្យ Objective Symptoms នោះ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា យកចិត្តទុកដាក់ដោយបសុពេទ្យ ទៅលើសត្វឈឺ ។

៣- Premonitory or Precursory Symptoms :

គឺជារោគសញ្ញាដំបូង ឬមានលក្ខណៈជាបម្រែបម្រួលខាងអារម្មណ៍ និង សកម្មភាពរបស់សត្វ។ តាម រយៈការប្រែប្រួលនេះ នាំឱ្យសុខភាពសត្វចុះខ្សោយ និង ឈានដល់ជម្ងឺដូចជាការល្អិតល្អៃដៃជើង, ហៀរទឹក ភ្នែកសំបោរ, សត្វទ្រុឌទ្រោម អន់ចំណី ។ល។ បានត្រូវគេពិនិត្យឃើញមុនពេលសត្វបញ្ចេញ Objective Symptoms ដូចជា ក្តៅខ្លួន, ស្នាមរលាក, រាគឈាម ។ល។

៤- Direct or Idiopathic Symptoms :

នេះបញ្ជាក់អំពីរោគសញ្ញាជាធម្មជាតិនៃសជម្ងឺ ហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តន៍របស់ជម្ងឺ ដែលជាជម្ងឺ មូលដ្ឋាន ហើយមិនមែនជាជម្ងឺឧកាសនិយម (Secondary) ប៉ះពាល់លើសរីរាង្គមួយចំនួន ដូចជារោគមាន សំបោរ និង ឈាមជាអេកសញ្ញាផ្ទាល់ (Direct Symptoms) របស់ជម្ងឺរាគម្ពល (Dysentry) ។

៥- Indirect or Sympathetic Symptoms :

មានន័យថា រោគសញ្ញាទាំងឡាយណា ដែលចូលរួមក្នុងការស្រាយបញ្ជាក់មិនផ្ទាល់លើគ្រោះថ្នាក់នៃ សរីរាង្គមួយចំនួនព្រមទាំងការប្រែប្រួលក្នុងសាច់ដុំកាយ ដូចជាក្នុង បណ្តាលពីការរលាកតម្រងនោម (Nephritis) សត្វផ្លែ, សញ្ញាចប់ដង្ហើម បញ្ហាពីការរីកលើស (Hypertrophy of Liver) ការខ្សោយនៃ សាច់ដុំផ្នែកខាងស្តាំ បណ្តាលពីជម្ងឺតម្រងនោមខាងស្តាំជាដើម។

៦- Typical Symptoms

ជារោគសញ្ញាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងខ្លាំង និង ច្បាស់ចំពោះប្រភេទជម្ងឺណាមួយ អ្នកពិនិត្យអាចធ្វើការ សម្រេចរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈរោគសញ្ញាដ៏ច្បាស់លាស់នេះ។ ជួនកាលរោគសញ្ញា Typical នេះ គេហៅថា Diagnostic Symptoms។ ឧទាហរណ៍៖ Septicemia ជាមួយការហើមសាច់ដុំ Crepitation គឺជា Typical Symptoms នៃជម្ងឺបូសខ្យល់ (B.L)។

៧- Atypical Symptoms

វារួមមានរោគសញ្ញាទាំងឡាយណា ដែលពុំមានលក្ខណៈទៀងទាត់ និង ច្បាស់លាស់ សម្រាប់បញ្ជាក់ជម្ងឺនា មួយបានប្រាកដ ។ ដូចជារោគសញ្ញាសរសៃប្រសាទនៃកូនគោ បណ្តាលពីជម្ងឺ Coccidiosis។

៨- Periodical or Remittent Symptoms

ជារោគសញ្ញាដែលរលប់បាត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយលេចចេញមកវិញម្តងទៀត បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយ វែង ឬ ខ្លីពុំទៀងទាត់។ ដូចជារោគសញ្ញាគ្រុនសន្ធឹមនៃជម្ងឺ (Canine distemper) និង រោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅ នៃជម្ងឺ Trypanosomiasis (Surra) ។

៩- Diagnostic or Pathognomic Symptoms

ជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ ចំពោះប្រភេទជម្ងឺណាមួយដោយផ្ទាល់ ហើយដែលបានត្រូវគេប្រើ ប្រាស់ជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យ នៃជម្ងឺដូចជារោគសញ្ញា វែង និង កន្ត្រាក់សាច់ដុំនៃជម្ងឺ Tetanus និង ឈាមហូរចេញពីរន្ធជម្មជាតិក្នុងករណីជម្ងឺ Anthrax ជាដើម ។

១០- Prognostic Symptoms

ជារោគសញ្ញាទាំងឡាយណា ដែលបង្ហាញពីគ្រឹះនៃការវិភាគដល់បសុពេទ្យ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យសភាព និង ប្រភេទជម្ងឺ។ ការព្យាករណ៍ (Prognosis) នៃជម្ងឺ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាបាល ដែលតំរូវឱ្យព្យាបាលបន្ត ឬ បញ្ឈប់។ ដូចជា High-blood Urea (មាន ូរោ ណិកៀងនេ ខ្ពស់ក្នុងឈាម) បង្ហាញអំពីការអស់ សង្ឃឹម នៃការព្យាបាល គឺសត្វនឹងស្លាប់មួយទៀត បន្ទាប់ពីមានការឈឺចាប់ក្នុងពោះ (Coli) ចុះថយចំពោះ សត្វសេះ បញ្ជាក់អំពីការរំហែក នៃសរីរាង្គក្នុងមួយចំនួន។

ក. ចង្កោមរោគសញ្ញា (Syndrom) --ជាលក្ខខណ្ឌ ដែលរួមបញ្ចូលដោយការវិវត្តន៍នៃជម្ងឺ។ ដូចជា អាស៊ីដូមីនប្រើប្រាស់សមរាប់រំលាយ អាហារ អាចបណ្តាលឱ្យមានការខ្សោយនៃថ្លើម និង

តំរង់នោម ខ្សោយ (Renal Insufficiency) ព្រមទាំងចង្កោមរោគសញ្ញា នៃការបំផ្លាញជាលិកាខួរក្បាល (Polyencephalomalacia Syndrome)។

ខ. ស្លាកស្នាម (Lesion) --ជាបំរែបំរួលទ្រង់ទ្រាយកោសិកា និង ជាលិកា ដែលបានត្រូវគេពិនិត្យ ឃើញនៅលើសរីរាង្គ ឬ ផ្នែកខ្លះនៃសរីរាង្គ។ វាអាចមានសណ្ឋានសើលើផ្ទៃជាលិកា ងាយពិនិត្យឃើញ ដោយភ្នែក ប៉ុន្តែស្លាកស្នាមជ្រៅនៅក្នុងជាលិកា ទាមទារមានការពិនិត្យដោយប្រើឧបករណ៍។ ស្លាក ស្នាមអាចត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ជាស្លាកស្នាមដំបូង (Primary Lesion) និង ស្លាកស្នាមបន្ត ឬ បន្ថែម (Secondary Lesion) ដែរ។ ស្លាកស្នាមដំបូង គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃបំរែបំរួលផ្ទាល់របស់ជម្ងឺ។ ស្លាក ស្នាមបន្ថែមបានត្រូវប្រែប្រួលជាគ្រោះថ្នាក់បន្តផ្តល់ទៅលើស្លាកស្នាមដំបូង។ ដូចជាការព្យាបាលដោយ ប្រើថ្នាំពុំបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីប្រយោជន៍ចៅ បណ្តាលឱ្យមានការហូរឈាមនៅក្នុងសាច់ដុំ។ល។

គ. ការព្យាករណ៍ (Prognosis) --គឺជាការវិភាគអំពីភាពមាន ឬ អស់សង្ឃឹម ចំពោះប្រភេទ ជម្ងឺណាមួយ។ វាមានសារៈសំខាន់ជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាការថែរក្សាសត្វឈឺ។ សត្វឈឺអាច ជាសះស្បើយពីជម្ងឺ ឬ ពុំអាចជាសះស្បើយបាន។ ជួនកាលសត្វអាចស្បើយពីសណ្ឋានជម្ងឺស្រួចស្រាវ ប៉ុន្តែ អាចជាបណ្តោះអាសន្ន ឬ អាចជ្រះស្រឡះ។ ក្នុងករណីបែបនេះគេត្រូវយកមកពិចារណាក្នុងការព្យា បាល។ បន្ទាប់ពី Prognosis ទៅលើជម្ងឺសត្វរួចមក។ ការប៉ាន់ស្មាននៃតំលៃ នៃការព្យាបាលត្រូវបានគិត គូរឱ្យបានសមស្រប។ ទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការព្យាបាល មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យបសុព្យាបាល។

ការទស្សនាវាយក្លិននៃជម្ងឺ អាស្រ័យទៅនឹង:

- ធម្មជាតិនៃជម្ងឺ
- បុព្វហេតុបង្កជម្ងឺ
- ជោគជ័យ ឬ បរាជ័យក្នុងការព្យាបាល
- ដំណាក់កាលនៃការស៊ីចំណី
- ទំលាប់របស់សត្វ
- លក្ខខណ្ឌកាយសម្បទា និង ប្រព័ន្ធសរីរាង្គ ឬ ភាពសំប្រាំង

ដែលកើតមានជាសញ្ញាដំបូង និង សញ្ញា ស្លាកស្នាមនៅនឹងកន្លែង ឬ សញ្ញានៃការប្រែប្រួលនាទីសរីរាង្គ។ ការសិក្សាទាំងនេះត្រូវបានគេ កត់ត្រា និង ចងក្រងឯកសារ ដើម្បីប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើ Prognosisជម្ងឺ។

ការបញ្ជាក់ Prognosis

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

- ដែលយល់ព្រម: (Favourable Prognosis)
- ឧទាហរណ៍: Uncomplicated Traumatic, Peritonitis in Cattle
- ដែលសង្ស័យមិនទុកចិត្ត: (Doubtful Prognosis)
- ឧទាហរណ៍ Traumatic Reticuloperitonitis ដោយមានការស្លិតជាប់គ្នានៃ Diaphragm ជាមួយ Abdominal Wall។
- សង្ឃឹមតិចតួច: (Poor Prognosis)
- ឧទាហរណ៍ Traumatic Reticuloperitonitis ដោយមាន Abscess ក្នុងថ្លើម
- គ្មានសង្ឃឹម: (Grave Prognosis)
- ឧទាហរណ៍ Traumatic Pericarditis ដោយមានវត្ថុរឹងស្រួចនៅក្នុងនោះ។

៨. ភាពស៊ាំវិទ្យា

(IMMUNOLOGY)

Immunity: គឺជាការការពារប្រឆាំង (Protection)
របស់សរីរាង្គកាយទល់នឹងជំងឺដែលបង្កដោយ Genetic Gent ទាំងឡាយ។

Immunity:បានត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាក្នុង Immunology and Allegology ព្រម
Infectious and Noninfectious disease។

ប្រវត្តិ (History): ដំបូងគេបានចោទជាសំណួរលើបញ្ហាមួយនៃជំងឺសើស្បែក
បង្កឡើងដោយវីរុស។ សត្វមួយភាគធំបានងាប់ដោយជំងឺនេះ

មួយភាគតូចបានជាសះស្បើយឡើងវិញ។ នៅ ព.ស ២៦៥០

ជនជាតិចិនបានធ្វើការសង្កេតលើការជាឡើងវិញនៃពួកសត្វឈឺនោះដោយចោទជាសំណួរថា
ហេតុអ្វីសត្វជាឡើងវិញទាំងមិនស្លាប់ ហើយមិនឈឺជំងឺនេះទៀត។ បន្តក្រោយមកជំងឺវីរុស (virus)

នេះបានកើតឡើងលើកុមារដែលភាគច្រើននៃកុមាររងគ្រោះទាំងនេះបានស្លាប់។
ការណ៍នេះធ្វើអោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានគំនិតប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មាន វីរុស ពេលគឺចាក់ចម្លង។

គេសង្កេតឃើញអត្រាស្លាប់បានថយចុះ។
មួយទៀតគេបានធ្វើការពិសោធន៍បន្តបន្ទាប់ដោយយកខ្សែកន្លះគោឈឺ Rinderpest-បេស្តិគោ ក្របី
ដែលប្រឡាក់ប្រឡូកដោយ virus

ទៅដាក់អោយប៉ះផ្ទាល់នៅលើបូកគោពុំទាន់ឈឺនៅឡើយដោយធ្វើអោយមានរបួសនៅកន្លែកន្លះគោប៉ះ
។

គេសង្កេតឃើញថាជំងឺដែលគេបានដាក់អោយឆ្លងតាមខ្សែកន្លះគោមានសណ្ឋានខ្សោយជាងជំងឺដែល
ឆ្លងជាលក្ខណៈធម្មជាតិ។ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៧៥៤ គេបានមានគំនិតរៀបចំធ្វើវ៉ាក់ស៊ាំង។

ក្នុងឆ្នាំ ១៧៩៨ ដោយលោក Pasteur Louis
ជនជាតិបារាំងបានធ្វើការពិសោធន៍លើជំងឺអសន្នរោគមាន (ដែលបង្កឡើងដោយ Bacteria
Pasteurella Multocida)។

លោក Pasteur
បានបណ្តុះបណ្តាលមេរោគដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។
បន្ទាប់មកគាត់ក៏សាកល្បងម្តងទៀតដោយចាក់បញ្ចូលមេរោគដែលគាត់បានបណ្តុះលើសត្វមាន
មាន់ទាំងនោះមិនឈឺឡើយ។ លោក ប៉ាស្ទើរ

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

បានពិសោធន៍ជាលើកទីពីរទៀតគឺពេលគាត់បណ្តុះមេរោគអោយសុទ្ធ (Pure)

ល្អជាងមុនគេសង្កេតឃើញថាមានឈឺ និងស្លាប់។ ការពិសោធន៍បានធ្វើអោយលោក ប៉ាស់ស្ទើរ សន្និដ្ឋានថាបក្សីណាដែលមានសភាពធន់និងជម្ងឺវាមិនស្លាប់ទេ។

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្តបន្ទាប់ទៀតលោក ប៉ាស់ស្ទើរបានសន្និដ្ឋានថា ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដូចទៅនិងព្រឹត្តិការណ៍នៃការដក់ពិសោធន៍របស់លោក Edword Jenner ដែលបានពិសោធន៍លើរុំសជម្ងឺលើសត្វគោដែរ។

គាត់បានអោយឈ្មោះគោលការណ៍ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃជម្ងឺឈាមខ្មៅ ដោយគាត់ប្រែក្លាយ បាក់តេរីបង្កជម្ងឺឈាមខ្មៅ (Anthrax) មិនអោយមានអនុភាព (Virulent) បណ្តុះក្នុងលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

A. Morphology and Function of Immune Systems:

តួនាទីនៃ Immune System គឺត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងវាបំបែកនៅ Antigenic (Genetic) នៃសរីរាង្គកាយដែលសិក្សាអំពីថាតើកោសិកាបំពេញនាទីក្នុង Immunity យ៉ាងដូចម្តេច? តើ Lymphocyte បំពេញនាទីយ៉ាងដូចម្តេច?

១. Immune System: រួមមាន៖

- ខួក្រហមឆ្អឹង (Bone Marrow), ទីមុសThymus, កូនកណ្តុរLymph Node/glade, កញ្ចប់កូទូRump Bursa, ចំពោះបក្សីSpleen, ផាល ជាលិកាLymphoid,(Mimdalim....) ស្លឹក និងសរីរាង្គដទៃទៀត។

Immune System: ថ្នាក់សត្វចែកចេញជា៖

- Central Organ:
 - Bone Marrow
 - Thymus
 - Lymphoid ប្រដាប់រំលាយអាហារ
- Peripheral Organ:
 - Lymph Node
 - Spleen
 - Lung
 - Skin

Immune System បក្សី៖

- Central
 - Bone Marrow

- Thymus
- Rump
- Reripheral
 - ជាលិកា Lymphoid ពោះវៀន
 - ផាល Spleen
 - សួត Lung
 - ស្បែក Skin

Thymus is Immune Organ យ៉ាងសំខាន់ដែលមានទីត្រួតពិនិត្យការលូតលាស់នៃជាលិកា Lymphoid នៅក្នុង Peripheral Organ ដែលជាការបន្សុំនៃសារពាង្គកាយទៅនឹងប្រតិកម្មនៃភាពសុំ។ ដោយសារ Thymus ទើប Lymphocyte នៃអំព្រឹយ៉ុង (Embrion) and (Post natal Orgaism) អាចមានភាពសុំបាន។

២. កោសិកាសំខាន់នៃ Immune Response or Immunization : កោសិកាដែលមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុង Immunization is Lymphocyte, Microphage and Macrophage។

a. Lymphocyte: តាម Process លូតលាស់របស់វាគេចែកចេញជា ២ ក្រុម ៖ Lymphocyte បង្កើតពីខួរឆ្អឹងឆ្លងកាត់ Thymus ដែលរងអំពើនៃ (Hormon) ជាលិកាអិល ដែលចែកទៅប្រពន្ធុ Periphery of Immune System មានឈ្មោះថា T-Lymphocyte។ ក្រុមមួយទៀត Lymphocyte ពុំលូតលាស់ឆ្លងកាត់ Thymus ចំពោះបក្សីក្រុមនេះ Lymphocyte លូតលាស់កាត់ក្រពេញកញ្ចុញ (Rump) ចំពោះជំនិកសត្វក្រុមនេះ Lymphocyte លូតលាស់ឆ្លងកាត់កោសិកា Lymphoid នៃសប្រដាប់វិលាយអាហារ(ឆ្អើម) ដែលគេអោយឈ្មោះថា B-Lymphocyte (Bone Marrow)។

➢ T-Lymphocyte ចូលរួមនៅក្នុង Reaction of Immune Cell ក្នុងសណ្ឋានជា Allergic Reaction។ T-Lymphocyte មានប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ជាមួយ Foreign Bodies បណ្តាលអោយមានការរលាក (Inflammation) ហើយដែលនៅពេលជាមួយគ្នានេះ B-Lymphocyte ដែលបង្កើតពីឆ្អើមបានត្រូវជំរុញអោយពេញវ័យឡើងដើម្បីចូលទៅក្នុង Plasma Cell បន្ទាប់មកនៅក្នុងPlasma បានប្រែក្លាយជាអង់ទីគី (Antibody) យ៉ាងច្រើន បន្ទាប់ពី ១០ ទៅ ១៤ ថ្ងៃនៃការជ្រាបចូលនៃ Antigen ។ T-Lymphocyte មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ Macrophase។ T-Lymphocyteបង្កើត Specific Antibodies ដែលមានសម្ភារភាពការពារជម្ងឺប្រភេទតែមួយ។ T-Lymphocyte ជាអ្នកជម្រុញ B-Lymphocyte មានសកម្មភាពរួមគ្នាការពារសារពាង្គកាយទល់នឹង Antigen ។

➢ B-Lymphocyte ក៏ដូចជា T-Lymphocyte ដែរតែមានទំហំតូចជាងដែលមាន diameter 8,5មីក្រុង មានទីជា Humorel immunity ដែលមាននៅក្នុង Plasma ឈាមហើយមាននាទីសំខាន់ក្នុងការការពារសារពាង្គកាយទល់នឹង Primary Entry of Antigen

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

ក្នុងសណ្ឋានជា Allergin Reaction (កើនរំញោជ)។ វាជាក្រុមមានកត់ចំណាំ Antigen បង្កើនអោយមានភាពស្ងប់ទល់និងជម្ងឺមួយប្រភេទ។

➢ Plasmocytes: តាមទ្រង់ទ្រាយនិងមុខងាររបស់វាគឺវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពី Lymphocyte។ វាជាកោសិកាពិសេសមានសភាពជាទឹករងៃ នាទីសំខាន់គឺ៖ Synthes និងបញ្ចេញទឹករងៃដើម្បីបង្កើនអង្គទីគីរ (Antibodies) ។

➢ Microphage (Neutrophile and Eosinophile): Neutrophile មាននាទីជា Phagocytosis។ ចំណែកឯ Eosinophile មាននាទី Phagocytosis ខ្សោយប៉ុន្តែវាមាននាទីបំបាត់ Toxin ដែលផលិតឡើងដោយ Antigen Parasite បានល្អ។

➢ Macrophage-Monocyte នៃឈាម Hystocyte នៃជាលិកាសណ្ឋាន និង Endothelium នៃប្លឺម Alveol Macrophage ស្ថិតនិង Fixative Macrophage នៃផាល ខួរឆ្អឹងខ្នង និង Lymph Node of Peritoneal and Pleural Macrophage ព្រមទាំង Osteoblast and Microgly Cell of Neurous System។


b- Form of Infectious Immun Response

Immunity ចែកជាពីរប្រភេទ៖

១- Passive Immunity: ជាប្រភេទ Immune Response មានសកម្មភាពការពារខ្លួនរយៈពេលខ្លី។ Passive Immunity កើតឡើងដោយសរីរាង្គកាយទទួលបានពីខាងក្រៅ Antibodies ស្រាប់។ ប្រភេទ Immunity នេះមានចំពោះកូនសត្វ និងសត្វដែលគេចាក់ Antibodies អោយ។ ឧទាហរណ៍ កូនគោទទួល Antibodies ពីមេរបស់វាតាមរយៈ Colostrum ដែលមានលទ្ធភាពការពារសារពាង្គកាយរយៈពេលពី 2-3 ខែនៅពេលសារពាង្គកាយគោទើបតែប្រទះ និងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ។ ឬករណីមួយទៀតចំពោះសត្វដែលគេចាក់បញ្ចូលអង្គទីសេរ៉ូម ដើម្បីអោយសត្វ អាចការពារខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបាន។

២- Active Immunity: ជា Immune Response ដែលបានមកពីប្រតិកម្មនៃសារពាង្គកាយប្រឆាំងនឹង Antigene បង្កើតបាន Antibodies។ Active Immunity នេះបានមកដោយចាក់វ៉ាក់ស៊ីន Vaccine និងសត្វឈឺហើយជាឡើងវិញ។

ចំពោះការចាក់វ៉ាក់ស៊ីន សារពាង្គកាយត្រូវការរយៈពេលពី ១៤ ទៅ ១៧ ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតបាន Antibodies គ្រប់គ្រាន់គិតចាប់ពីថ្ងៃចាក់វ៉ាក់ស៊ីនតំបូង។ រយៈពេលបង្កើត Immunity និងរយៈពេលដែល Immunity



មានសម្ភាពការពារសារពាង្គកាយសត្វអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទវ៉ាក់ស៊ីនដែលគេផលិត។ ហេតុនេះត្រូវមើលអោយបានច្បាស់នូវប្រទេទវ៉ាក់ស៊ីនមុនពេលប្រើប្រាស់វា (មើល dose រយៈពេលការពារសារពាង្គកាយសត្វ លេខវ៉ាក់ស៊ីន...)។

Mechanism របស់វាស្រដៀងនឹង Allergin Reaction Type 2 (ប្រតិកម្ម) ។ លក្ខណៈនិងជាលិកាមិនត្រូវគ្នានៃ Donor and Pecipient Transplantate ក្លាយជា Isoantigene (ដែលមាននៅក្នុងបន្ទុំជាលិកា Donor) ចំពោះ Recipient។

Isoantigenic Tissue of Donor នាំអោយមាន Immune Reaction from Recipient។ បំប៉នបំប្លែងនៃ Immune Reactient ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង Thymus Gland, Lymph Node និងនៅលើកន្លែងដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនោះ។ នៅកន្លែងទាំងនោះបន្ទាប់ពី ៣ ទៅ ៤ នៃការធ្វើ Transplantation គឺមានបរមាណជាច្រើនដែលខុសគ្នាក្រោយមកក្លាយទៅជា Immune

Lymphocyte ដែលជ្រៀតចូលទៅក្នុង Transplantate ដែលជាកន្លែង Cytoplasmic Action of Lymphocyte នាំអោយមាន Necrosis Cell ។

ខ្លឹមសារនៃ Immune of Transplantation ទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទជាលិការបស់ Donor and Recipient មិនដូចគ្នាដែលដឹកនាំទៅរកការបង្កើតសារធាតុបង្កាក់តំណើរ Function of Immune Systems។

ចំណែកនៅ Immune System វិញ Lymph Node Spleen ឃើញមានPlasmatic and Lymphocyte Reaction Auto-immune Reaction មាននាទីសំខាន់ក្នុង Plasmatic and Lymphocyte Reaction Auto-immune Reaction មាននាទីសំខាន់ក្នុង Pathology នៃជម្ងឺមួយចំនួនធំរបស់សត្វ និងមនុស្សដូចជា រលាកសរសៃចំណង់ Radiation Disease: Encephalic and Rheumatoid Arthritis ។ល។ រលាក (Born) និង Radiation Diseases³ Encephalo Myelitis, Glomerelonephritis, Miocarditis ។ល។

c- Immunity of Transplantation:

ភាសា Latin = Transplantare -ជាការបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងទៀត ផ្លាស់ប្តូរការកាត់ (Opera- tion) ផ្លាស់ប្តូរសរីរាង្គ ឬជាលិកា។ ជាលិកា ឬសរីរាង្គដែលត្រូវtate តែប្រើសម្រាប់ប្តូរអោយឈ្មោះថា Trans-plantate (Transplantate is the Tissue that has been used in a Transplant) ។

Immunity of Transplantation- បានត្រូវគេចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាលិកាស្បែក។ លើកទី១ រយៈពេលពី ២ ទៅ ៣ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរជាលិកាស្បែកមួយដុំ ចាប់ផ្តើមបង្កើតសរសៃឈាម និងភ្ជាប់ជាលិកា Recipient (អ្នកទទួល) ។ រយៈពេល ៤ ទៅ ៥ ថ្ងៃ Transplantate ក្លាយជាជាលិការស់ ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទី ៦ ទៅទី ៧ វាបានទទួលនិងទទួលទ្រទ្រង់បន្តិចបន្តួច និងមាន Swelling ។ ពេលនេះបើសិនជាមាន Infiltration នៃ Lymphocyte ច្រើននៅក្នុង Transplantate នោះវានឹងរលួយ។ បន្ទាប់មក Swelling នៃជាលិកាឡើងបណ្តាលអោយមាន Distrophy និង Necrosis នៃ Transplantate ។ រយៈពេល ១០ ទៅ១១ថ្ងៃ Transplantate ងាប់នឹង Inflammation ប្រាន Transplantate នោះអោយរលាយចេញ។

កត្តាសំខាន់នៃ Immunity of Transplantation គឺលក្ខណៈប្រភេទ និង សណ្ឋានជាលិកា ឬកោសិកានៃ Donor (អ្នកផ្តល់) និង Recipient (អ្នកទទួល)។ ប្រភេទ Exadative និងក្រុម Necrotic និង Alterative ។

+ Allergic Reaction-Type II (ក្រុមមានប្រតិកម្មយឺត)

កើនឡើងពីប្រតិកម្មរវាង Immune Lymphocytes និង Allergine ។ Immune-Lymphocyte ត្រូវបង្កើតឡើងនៅ Thymus gland, Lymph Node និង Spleen ឆ្លើយតបនឹងប្រតិកម្ម Allergen បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងជាលិកា។ ប្រតិកម្មបែបនេះមាននាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុង Pathogenesis នៃជម្ងឺ។

d- Morphogenesis of Auto-immune-Process:

ពេលរោគគេសង្កេតឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរនៃ Tissue ដែលជាហេតុនាំអោយមាន Auto-antigenic និង Auto-antibodies ធ្វើប្រតិកម្មជាមួយ Normal Tissue បណ្តាលអោយមាន Inflammation, Distrophy និង Necrotic Process ។ ដូចនេះ Auto-immune Diseases អាចបណ្តាលពី Immune Reaction (Agresy) ដែលផ្តោតទឹកកម្ទាត់ជាលិកាខ្លួនឯង។

អត្តន័យនៃ Auto-immune Process គឺជាបាតុភូតបណ្តាលមកពី Infectious Agent, Chemical substance Drugs (ថ្នាំ) រោគដោយកាំរស្មី និង Pathologic Factor ដទៃទៀតដែលធ្វើអោយផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈពិសេសនៃជាលិកា។ Antigene ផ្លាស់ប្តូរ Auto-antigene នៃជាលិកាទាំងនោះរងនៅការបំផ្លាញ។

ពេលមានជម្ងឺឆ្លងប្រតិកម្មកើនឡើងដោយវត្តមាននៃ T-lymphocyte និង B-mymphocyte RBm ព្រមទាំង Macrophases។

តំណក់កាលទី ១ មាន Micro និង Macrophase ធ្វើ Phase Cythosis ទៅលើ Antigene ហើយ Microphage រំលាយ Antigenអោយក្លាយជាធាតុនៃ Antigene ដែលគ្មានលទ្ធភាពបង្កគេចំណែក Macrophage វិញរំលាយ Antigene យ៉ាងសកម្មបំផុត ហើយបញ្ជូនព័ត៌មានទៅអោយ T និង B- lymphocytes ដែលត្រូវធ្វើ Phagocytosis បន្ត។

ដំណក់កាល Production កើតឡើងពីការបង្ហាញ T-lymphocyte ទៅជា Immune Lymphocyte B-lymphocyte បានត្រូវក្លាយទៅជាកោសិកា Plasmatic Cell ដែលធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលទៅលើទ្រង់ទ្រាយនៃសរីរាង្គរបស់ប្រពន្ធភាពសុំ។

ដំបូងជាលក្ខណៈ Inflammation និងការប្រែប្រួលនៃកោសិកា។ Ex: Inflammatory Lymph Node, Proliferation នៃ Endothelium, Emigration នៃ Neutrophile ជាដើម ។

e- Allergic Reaction

Allergic- ជាការបង្កើតប្រតិកម្មកាយវិញ្ញាណ (រំញោជ) នៃសារពាង្គកាយទល់នឹង Antigene និង Allergene ។

Allergic Reaction-type I (ក្រុមមានប្រតិកម្មលឿន) បណ្តាលអោយមាន Anaphylaxis (Anaphylactic Shock)។ នាទីសំខាន់គឺ Plasmatic Cell ។ ដំបូងមាន Antigene ភ្ជាប់ជាមួយ Antibodies នៅក្នុងជាលិកាក្រោមបាតុភូតនេះនាំអោយ Hydrolitic Ferment សកម្មដែលនាំអោយខូចខាតកោសិកា និង Gystamine Acetilcholine, Cerotonine។ល។ ក្លាយជាសើរ។ លទ្ធផលនេះនាំអោយមាន Inflammatory Hyperenia។

១- ការការពារជម្ងឺ (Diseas prevention)

ការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាវិធីបង្កការពារជម្ងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ប៉ុន្តែ កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ដូចជា៖ ការផ្តល់ចំណី ការថែទាំ អនាម័យ ការសម្អាតទ្រុងការសំលាប់មេរោគ (DesinfecTion)។

១-១- អនាម័យ (Hygene)- - អនាម័យនាំមកនូវសុខភាព ការផ្តល់ចំណីអាហារ ទឹក មានអនាម័យល្អ

បង្កអោយសត្វនូវលក្ខខ័ណ្ឌប្រកបដែលបញ្ចៀសសត្វអោយផុតពីការរាតត្បាតនៃមេរោគ និង ភាពទ្រុតទ្រោម។ បរិយាកាស និង ភាពអាចអូរនៃទ្រុងសត្វ បង្កអោយសត្វស្រួស។

១-២- ការសំលាប់មេរោគ (DesinfecTion) ការសំអាតសំលាប់មេរោគត្រូវបានគេធ្វើឡើង ក្នុងបំណងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃមេរោគ។ ការសំលាប់មេរោគមាន:

ការសំលាប់ដោយប្រើសារធាតុគីមី គេប្រើសារធាតុគីមីដូចជា: KMnO4 ; ហ្វ័រម៉ុល (Formol); ហ្វេណុល (Phenol); ក្លរ (Cl); បាស (Alkalin); អាស៊ីត (Acid)។ល។ ការសំលាប់ដោយប្រើវិធីរូប មានដូចជា: កំដៅ ; កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីអូលេ កាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ល។ ការសំលាប់មេរោគត្រូវតែធ្វើឡើង ដោយគ្មានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វ ប៉ុន្តែត្រូវធានានូវការសំលាប់មេរោគបានល្អ។

- **កម្ដៅ (Heat):** កំដៅនៅកំរិតខ្ពស់និងក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយអាចសំលាប់មេរោគបាន។ បាក់តេរីមួយចំនួនធន់នឹងអាកាសធាតុខ្ពស់ ដូចជាពពួកស្ត្រីរេបស៍ (Bacillus clostridium) ជាដើមអាចសំលាប់បាននៅសីតុណ្ហភាព ១០០ អង្សារសេក្នុងរយៈពេល ១ ម៉ោង។ គេប្រើកំដៅតាមច្រើនរបៀបដូចជា៖ ការស្ទោរ ការដុត ការចំហុយនៅសម្ពាធខ្ពស់ (Autoclave)

- **កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ និង កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីអូលេ (Sun Ultraviolet Rays):**

កាំរស្មីព្រះអាទិត្យរួមមាន៖កាំរស្មី X កាំរស្មី អាលហ្វា និង កាំរស្មីផ្សេងៗទៀតជាពិសេស Ultravole ដែលអាចបង្ហាញការលូតលាស់ និង ធ្វើការសំលាប់មេរោគយ៉ាងសកម្ម។ សព្វថ្ងៃគេបានបង្កើតអំពូលភ្លើងអគ្គីសនីដែលអាចបញ្ចេញកាំរស្មី Ultravole សំរាប់សំលាប់មេរោគក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និង បន្ទប់អនាម័យ។

សារធាតុគីមីប្រើសំរាប់សំលាប់មេរោគ:

សារធាតុគីមីត្រូវបានគេប្រើក្នុងកំហាប់ និង កំរិតច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារនូវផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ជីវិត សត្វ និង រុក្ខជាតិនៅជុំវិញ។ សារធាតុគីមីដែលប្រើញឹកញាប់មានដូចជា៖

- សូលុយស្យុងផេណុល (Phenol) 3-5 ភាគរយ
- Free chlorine 100-200 part/million
- Quaternary Ammonium compound 0.1-0.5%
- Solution KMnO4 (4%)
- Solution Methanol 1-5%
- Solution Hydroxide (caustic Acide)

សារធាតុគីមីប្រើសំរាប់លាងសំអាតប្រដាប់ប្រដារប្រើប្រាស់ ជាសូលុយស្យុងដែលជាទូទៅគេលាយក្នុងកំហាប់ពី 1-2%។

២- ការត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ (Disease Control):

ខាងក្រោមជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ:

- ការសិក្សាភាពរាតត្បាតជម្ងឺ (Epidemiology)
- ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺ (Disease Diagnosis)
- ការធានាស្ថានភាពគ្មានជម្ងឺ (Quarantine)

២-១- ការសិក្សាភាពរាតត្បាតជម្ងឺ (Epidemiology) ការផ្ទុះជម្ងឺឆ្លងក្នុងតំបន់មួយ ជាលក្ខណៈពិសេសនៃតំបន់នោះ ដែលតម្រូវអោយមានការកត់ត្រា និង ផ្សព្វផ្សាយដល់តំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នា។ ការកត់ត្រាត្រូវស្រង់យកមកអោយបានច្បាស់នូវអត្រាគ្រោះថ្នាក់ (Incedene Rate) អត្រាសត្វឈឺ (Mobidity Rate) អត្រាសត្វស្លាប់ (Motality Rate) អត្រាសត្វជាពីជម្ងឺ (Recovery Rate) ជាដើមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពមហន្តរាយនេះ

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

និងដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៃការរាលដាលក្នុងតំបន់ជិតខាង។ គួរកត់សំគាល់ថា មេរោគអាចរក្សាជីវិតរស់នៅក្នុងសារពាង្គសត្វ ដែលជាសះស្បើយពីជម្ងឺឬអាចរស់នៅក្នុងដី ទឹក រុក្ខជាតិ និង ប្រដាប់ប្រដារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតបានជាច្រើនឆ្នាំ។ វាទាមទារអោយមាន

វិធានការណ៍ពាក់ព័ន្ធដល់ដំដីដែលកំពុងផ្ទុះដោយការរីករាយក្រហមជម្ងឺ ដូចជា ជំងឺអ្វី? ជាប្រភេទ ជម្ងឺ Pandemic, Endemix ឬ Epidemix, Sporadic Diseases និងប្រសិនបើជម្ងឺត្រូវបាន គេសង្ស័យថាជាជម្ងឺ Zoonoses គេត្រូវមានវិធានការណ៍ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្ទាន់។ វិធានការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តមានដូចជា៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងហ៊ុំព័ន្ធតំបន់រាតត្បាត ការហាមឃាត់ដឹក នាំសត្វ និង ចរាចរណ៍ផលិតផលសត្វពីតំបន់ផ្ទុះជម្ងឺជាពិសេសបញ្ឈប់ការសំលាប់សត្វយកសាច់ នៅតំបន់នោះ។ សត្វស្លាប់ត្រូវទ្រុតពិនិត្យ និងអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសឲ្យបានសមស្រប។

២-២ - ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺ (Disease Diagnosis) --ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ជាវិធីយ៉ាងមាន ប្រសិទ្ធភាព សំរាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការព្យាបាលជម្ងឺ។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ត្រូវផ្អែកលើ៖

ការពិនិត្យតាមដានរោគសញ្ញា(Clinical Examination) --ជាការសិក្សារោគសញ្ញា សត្វឈឺ។ ជាបឋមគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យសភាពខាងក្រៅទូទៅ (General Appearance) សត្វដូច ជា៖ សភាពរោម ដំណើរ ការហូរទឹកសំបោរ ទឹកមាត់ ភ្នែក ច្រមុះ រន្ធកេទ។ល។ ព័ត៌មានអំពី អាយុ ពូជ ប្រវត្តិសត្វ ជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ជំនួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ប្រវត្តិសត្វអាចឆ្លុះ បញ្ចាំងឱ្យដឹង៖ អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភពដើមរបស់សត្វ ធ្លាប់ឈឺជម្ងឺអ្វីខ្លះ? នៅពេលណា? ការប្រើប្រាស់-- ជាកំលាំងអូសទាញ យកសាច់ ឬ ទឹកដោះជាដើម។ បន្ទាប់មកការពិនិត្យសភាព ប្រែប្រួលខ្លួនសត្វបានត្រូវគេធ្វើឡើងដូចខាងក្រោម៖

- វាស់សីតុណ្ហភាពខ្លួនសត្វ: សត្វក្តៅខ្លួន ឬ ធម្មតា
- វាស់ដីពចរ: ញាប់ ខ្លាំង ឬ ខ្សោយ
- មានស្នាមអ្វីខ្លះ៖ រលាក (Inflammation), raK (Diarrhoea), ភ្លៀន (Constipation)
- សត្វមានការឈឺចាប់ក្នុងពោះ: (Colic) ពេលស្ទាប (Palpation)
- សត្វមានបាក់ផ្អែង ក្រិច ...
- មានក្អួត (Vomition) ក្អក (Caugh)
- ការស៊ីចំណីដឹកទឹក: ស៊ីមិនបាន (Anorexia)
- ការចាប់ដង្ហើម (Dispnoae)

ការយកវត្ថុវិភាគ (Sampling)

វត្ថុវិភាគដែលត្រូវយកដើម្បីធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍មាន:

- វត្ថុវិភាគឈាម (Blood Sample): គេយកពីសរសៃឈាមវ៉ែនក--ចំពោះសត្វធំៗ ដូចជា គោ-ក្របី ចៀម និង ពពែរ។ ចំពោះជ្រូក គេយកពីសរសៃវ៉ែននៅត្រចៀក ឬ កន្ទុយ។ ឈាមបានត្រូវគេយកដើម្បីសិក្សា: ការប្រែប្រួលនៃលោហិតសាស្ត្រ (Hematology) ឈាមថ្នាំ (Serology) និង វិភាគគីមី (Chemical Test)។ ឈាមសំរាប់ផ្នែកលោហិតសាស្ត្រ ត្រូវយកដោយប្រើថ្នាំការពារឈាមកក (Anticoagulant) --ដើម្បីធ្វើការសិក្សាសភាពគោលិកា ឈាម-ស (White Blood Cells), ឈាមក្រហម (Red Blood Cells), អេម៉ូក្លូប៊ីន (Hb) និង អេម៉ាតូគ្រីត (Pack-Cell Volum) ជាដើម។ ឈាមសំរាប់ផ្នែក សេរ៉ូមសាស្ត្រ (Serology) ត្រូវបានគេយកដោយគ្មានការលាយថ្នាំការពារឈាមកកទេ។ គេទុកឈាមនេះក្នុងបំពង់ទីបបន្ទាប់ពីបូមរួច ហើយទុកឱ្យរង បន្ទាប់មកគេចាក់យកផ្នែកថ្នាំនៅខាងលើដែលជាសេរ៉ូមឈាម។ សេរ៉ូមឈាមនេះ ត្រូវយកគេយកទៅធ្វើតេស្ត ដូចជា: តេស្តករក (Agglutination Test) តេស្តរកអង់ទីកែរ (ELISA Test) ជាដើម។

- គំនៀសឈាម (Blood Smear): គំនៀសឈាមត្រូវធ្វើឡើងពីឈាមស្រស់ថ្មីៗយកពីសត្វហើយកៀសលើកញ្ចក់ ដោយមានកំរាស់ស្តើង និង ស្មើល្អ។ គេរៀបចំធ្វើគំនៀសឈាម ដើម្បីសិក្សារកវត្តមានបាក់តេរី ឬ ប្រូតូសូអា និង វិភាគសមាមាត្រគោលិកាឈាមស ដូចជា: Neutrophile, Basophile, Eosinophile, Monocyte និង Lymphocyte។

- ទឹករងៃ-សំបោរ (Secresion): ទឹកសំបោរ ទឹកភ្នែក និង ទឹកអិលផ្សេងៗ បានពីត្រចៀកប្រដាប់បន្តពូជ ត្រូវគេយកដោយតំបារសំឡីស្តើរីល ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះមេរោគ (Bacterial Culture) ឬ ធ្វើគំនៀសលើកញ្ចក់ដើម្បីរកវត្តមាន នៃបាក់តេរី ឬ បរ៉ាស៊ីត។

- លាមក (Faeces): លាមកសំរាប់ពិនិត្យ រកវត្តមានបរ៉ាស៊ីត និង សំរាប់ធ្វើការបណ្តុះមេរោគ (Coproculture) ត្រូវតែជាលាមកស្រស់យកចេញពីគូទសត្វ ឬ ត្រូវយកដោយតំបារសំឡី ស្តើរីលពីផ្នែកខាងក្នុង។

- វត្ថុវិភាគផ្សេងទៀតដូចជា: ថ្លើម ផាល តំរងនោម បេះដូងស្នូតពោះរៀន ខួរឆ្អឹង។ល។ បានត្រូវគេយកដើម្បីសិក្សា បាក់តេរីសាស្ត្រ (Bacteriology) ឬ បម្រែបម្រួលជាលិការិទ្យា (Histopathology)។ សរីរាង្គ និងជាលិកា ទាំងនេះបានមកពីការវះកាត់ សាកសពសត្វ (Autopsy)។

២-៣- ការធានាស្ថានភាពសត្វគ្មានជំងឺ (Quarantine) --គោលការណ៍ នៃ Quarantine នេះ បានត្រូវប្រទេសជាច្រើនយកមកអនុវត្តសំរាប់ត្រួតពិនិត្យសុខភាពសត្វនាំចេញ និង នាំចូល។ Quarantine ពុំ មែនអនុវត្តតែលើសត្វប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគេក៏ធ្វើ Quarantine លើមនុស្សផងដែរ

នៅប្រទេសរីកចំរើនទាំង ឡាយក្នុងពិភពលោក។ មូលដ្ឋាននៃការហ៊ុំបិទ (Enclosure) លទ្ធភាពរាលដាលនៃជម្ងឺបណ្តាលពីការធ្វើចរាចរ បានត្រូវគេចាត់ទុកជាវិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ជម្ងឺឆ្លងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការដឹកនាំសត្វពីតំបន់គ្មានជម្ងឺទៅ តំបន់មានជម្ងឺ ឬ ផ្ទុយមកវិញ អាចបង្កើតបរិមាណសត្វឈឺ និង ដូច្នេះពង្រីកតំបន់រាតត្បាតដោយជម្ងឺ។ ការ ដឹកនាំសត្វ និង ផលិតផលសត្វនៅក្នុងស្រុក និង ជាពិសេស ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀត ត្រូវតែមានការ ត្រួតពិនិត្យ និង ធានាតាមរយៈការធ្វើតេស្ត និង ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរោគបានត្រឹមត្រូវ។ ជាទូទៅ សត្វដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅក្នុងតំបន់ Quarantine ពី ១៤ ទៅ ២១ ថ្ងៃ ដើម្បីតាមដាន ពិនិត្យស្ថានភាព សុខភាព និង ធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺ។

២-៤-ការវះកាត់សាកសពសិក្សាស្លាកស្នាមជម្ងឺ (Autopsy/Postmortem Examination) -- ជម្ងឺ បង្កឱ្យមានស្លាកស្នាម រលាក ជំបៅ ឬប្រែប្រួលលើសរីរាង្គខាងក្នុង ជាលក្ខណៈប្រែប្រួលរបស់ ជាលិកា (Patho-Histology) និង កាយវិភាគវិទ្យា (Patho-Anatomy)។

បច្ចេកទេសធ្វើ Autopsy មុនចាប់ផ្តើមធ្វើ Autopsy ត្រូវសាកសួរ និង កត់ត្រាប្រវត្តិសត្វឱ្យបាន ច្បាស់លាស់ (អាយុ ភេទ ការចាក់វ៉ាក់សាំង? ឈឺពីពេលណា? ស្លាប់នៅពេលណា?)។ បម្រែបម្រួល ដែលពិនិត្យឃើញលើសរីរាង្គ ពេលវះកាត់ ត្រូវកត់ត្រាតាមលំដាប់លំដោយ។

សត្វធំ៖ ត្រូវដាក់សត្វផ្ទៀងទៅចំហៀងខាងឆ្វេង និង សត្វបក្សី៖ ត្រូវដាក់ផ្ទារពោះឡើងលើ។

- ជឿមរោមដោយទឹកចំពោះបក្សី, ចំពោះសត្វធំៗលាង ដោយប្រើប្រាស់ដុះ
- ពន្លាត់ស្បែកសត្វចាប់ពីផ្នែកពោះ
- កាត់យកផ្ចឹងសន្ទះទ្រូងចេញ
- បើកប្រអប់ទ្រូង៖ ពិនិត្យមើល សួត បេះដូង
- បើកប្រអប់ពោះ៖ ពិនិត្យថ្លើម ផាល ពោះរៀន ក្រពះ ក្រពេញកូនកណ្តុរ ក្លាសពោះ។ល។
- ពិនិត្យសាច់ដុំ សរសៃប្រសាទ សរសៃពួរ
- ពិនិត្យមើលជាលិកាខួរក្បាល ខួរផ្ចឹងខ្នង (Central Nervous System/CNS)

៩. វិធីកត់ត្រាប្រវត្តិសត្វឈឺ (Methods of Anamnesis)

ម្រោងសង្ខេបនៃការសាកសួរ និង កត់ត្រាប្រវត្តិសត្វឈឺ

I- ការសាកសួរ ឬ កត់ត្រាប្រវត្តិសត្វ (Anamnesis or History taking)

ក- ប្រវត្តិបច្ចុប្បន្ននៃសត្វឈឺ

ខ- ប្រវត្តិអតីតកាលនៃសត្វឈឺ

ចំពោះសត្វស្លាប់ Anamnesis អាចចែកជា:

1. ប្រវត្តិសត្វពេលនៅមានជីវិត (Anmnesis)
2. ប្រវត្តិសត្វក្រោយពេលសត្វស្លាប់ (Anamnesis Morbi)

II- ការពិនិត្យទូទៅ (General Examination)

ក - ការពិនិត្យដោយភ្នែក (Inspection)

- ការពិពណ៌នាអំពីសត្វឈឺ (ប្រភេទ ពូជ អាយុ ពណ៌សម្បុរ)
- ការពិនិត្យដោយភ្នែកលើរាងកាយសម្បទាទូទៅ (សភាពខ្លួនសត្វ ចរិតសត្វ សភាពធំធាត់របស់ សត្វ រោមស្បែក ការបន្ទោរបង់លាមក និង ទឹកនោម ការស៊ីចំណី ផឹកទឹក ដំណើរ។ល។)

ខ- ការត្រួតពិនិត្យគ្លីនិច (Clinical Examination)

1. សីតុណ្ហភាពខ្លួនសត្វ (Temperature)
2. ចលនា និង ចំនួនដង្ហើម (Pulse Rate)
3. ចលនា និង ចំនួនដង្ហើម (Respiratory Rate).
4. សភាព និង ពណ៌ភ្នាសស្តើង ដែលអាចមើលឃើញ (Visible mucous membrane)

III- ការត្រួតពិនិត្យពិសេស នៃប្រព័ន្ធសរីរាង្គមួយចំនួន (Special Examination)

- ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ (Digestive System)
- ប្រព័ន្ធទឹកនោម (Urinary System)
- ប្រព័ន្ធឈាមរត់ (Cardio-Vascular System)
- ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ (Vervous System)
- ប្រព័ន្ធដង្ហើម (Respiratory System)

- ប្រព័ន្ធបន្តពូជ (Reproductive System)
- ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ (Muskuloskeletal System)
- ប្រព័ន្ធកោសិកា (Lymphatic System)
- ត្រចៀក និង ភ្នែក (O.R.L)
- ស្បែក និង រោម (Skin and appendage)

IV- ការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ (Laboratory Analysis)

- ការពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍ នូវឈាម ក្រមរ ដំបៅ និង ស្បែក ទឹកដោះ ទឹកនោម សំបោរ...។ល។
- ការវិភាគគីមីជីវសាស្ត្រនៃឈាម ទឹកមោត។ល។
- ការធ្វើតេស្តសេរ៉ូមឈាម (Serological Test)
- ការធ្វើតេស្តជីវសាស្ត្រ (Biological Test)
- ការពិនិត្យជាលិការវិទ្យា (Radilological Examination)
- ការធ្វើតេស្តសកម្ម (Allergic Test)

បំរើបំរួលដោយការវះកាត់សាកសពសត្វជាការសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីបកស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺ។ នៅពេល ពិនិត្យឃើញមានបំរើបំរួលលើសពីរាងកាយចំនួន ការកត់ត្រាលក្ខណៈខុសប្រក្រតី ត្រូវបានគេកត់ត្រាលើក្រដាស បកស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យ ផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលបំរើបំរួល ពុំបានត្រូវពិនិត្យឃើញទេនោះ ការកត់ត្រា គឺគ្មាន លក្ខណៈខុសប្រក្រតី។

១០. បំណកស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ

INTERPRETATION

ការបកស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តា២:

ក - ការធ្វើឱ្យសកម្ម នៃ សម្មតិកម្ម សំរាប់ការបកស្រាយ (Activation of Hypothesis) ជាការប្រមូលផ្តុំ និង ពិចារណានៃលទ្ធផលពិនិត្យទិន្នន័យទាំងឡាយ: រួមមាន ប្រភេទសត្វ ពូជ សត្វ អាយុសត្វ ពណ៌សម្បុរ ព្រមទាំងប្រភេទផលិតកម្មរបស់សត្វ។

ខ - ការវាយតម្លៃ នៃ លទ្ធផលសម្មតិ សំរាប់ការបកស្រាយ (Hypothesis Evaluation) ជាការវាយតម្លៃនៃលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យគ្លីនិចទាំងឡាយដើម្បីសំរេចទទួលយកការបកស្រាយ លទ្ធផលគ្លីនិច ការពិចារណាលើលទ្ធផលសង្ខេបសភាពមាំមួន និង ប្រាកដដែលអាចទុកចិត្តបានជាការចាំ បាច់បំផុត។ សំរាប់ការវាយតម្លៃ និង សំរេចរោគវិនិច្ឆ័យនេះមាន: ការបញ្ជាក់ (Confirmation) ការដកចេញ ឬ កាត់ចោល (Elimination) ការរកភាពខុសគ្នា (Discrimination) និង ការត្រួតពិនិត្យ (Exploratin) នៃការរកឃើញរោគសញ្ញាគ្លីនិច។

បរិស្ថានស្ថិតនៅហុំព័ទ្ធជុំវិញ ជីវិតរបស់សត្វមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ឬ ប្រយោល ទៅលើសុខភាពសត្វ។ ការ ពិនិត្យដោយល្អិតល្អន់នៃបរិស្ថានសុខភាពសត្វ។ ការពិនិត្យដោយល្អិតល្អន់ នៃបរិស្ថានផ្តល់នូវការដឹកនាំធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ នៃជំងឺ ដែលកំពុងកើតមានលើសត្វណាមួយ ឬ សត្វមួយចំនួននៅក្នុងហ្វូង។ បរិស្ថានអាចជាខាងក្រៅ (Outdoor) ឬ បរិស្ថាន វាលស្មៅ ឬ បរិស្ថានក្នុងផ្ទះ (Housing environment)។

ក- បរិស្ថានខាងក្រៅ(Outdoor Environment): គឺជាតំបន់ដីវាលស្មៅ និង ដីដាំដំណាំផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានគេពិនិត្យ និង កំណត់ថា មានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ។ ដីសើមក្រខក់បង្កលក្ខខណ្ឌ ប្រកបដល់ការកកកើត និង លូតលាស់នៃពពួករុយ មូស ដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ ដីក្រខក់ផ្តល់ លទ្ធភាពបង្កជំងឺដូចជា: Leptospirosis។ ទឹកបឹង ត្រពាំងមិនហូរ (Stagnant pool) ផ្តល់លទ្ធភាព រាតត្បាតនៃពពួកដង្កូវថ្លើម។ ខ្សាច់ នៅឆ្នេរសមុទ្រ (Littoral sand) បណ្តាលឱ្យសត្វរស់នៅទីនោះ មាន បញ្ហានៃកង្វះអ៊ីយ៉ុងទង់ដែង (Cu) និង កូបាល់ (Co)។

វាលស្មៅបន្តកស្មៅ ទឹកដីនៅវាលស្មៅ ពេលខ្លះមានការប្រឡាក់ប្រឡូស ដោយភ្នាក់ងារចំលង រោគ និង សារធាតុពុលគីមី នៃកាកសំណល់ឧស្សាហកម្ម។ ប្រវត្តិនៃប្រភពបែបនេះគួរតែត្រូវបានគេ

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

កត់ត្រា យ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុត។ ជួនកាលថ្នាំសំលាប់កសិកម្មមួយចំនួន (Organo-phosphorous Compounds) ក្លាយជាប្រភព ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វ។

ខ- បរិស្ថានខាងក្នុង (Indoor Environment):
 ទ្រុឌសត្វពុំមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ពុំមានការផ្តល់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ភាព ក្រខ្វក់នៃផ្ទៃទ្រុឌ អាចរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លាញសុខភាពសត្វ។
 ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សាងសង់ទ្រុឌ ការធ្វើអនាម័យទ្រុឌ។
 សត្វដែលចិញ្ចឹម ក្នុងទ្រុឌតូចៗ ដើម្បីបំប៉ន យកសាច់ ងាយ មានជម្ងឺមេតាបូលីសដូចជា Keratosis in Cattle ជាដើម។

បរិយាកាសនៃបរិស្ថានជះឥទ្ធិពលទៅលើផលិតកម្មទឹកដោះ។លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស ដែលសមស្របសំរាប់ គោគឺ:

ប្រភេទគោ	សីតុណ្ហភាពទ្រុឌ (oC)
សំណើម (%)	
គោអាយុ ៣ឆ្នាំឡើង	១០-១៥
៨៥-៧៨	
គោជំទង់	១២-១៥
៨២-៧៨	
កូនគោ	១៥-២២
៧៨-៦៨	

ផលវិបាកបណ្តាលពីការប្រែប្រួលបរិស្ថាន

- ស្រួសបណ្តាលពីអកាសធាតុ បណ្តាលឱ្យសត្វពុំឃ្នានចំណី
- សីតុណ្ហភាពបរិស្ថានឡើងខ្ពស់ បណ្តាលឱ្យរុក្ខជាតិបាត់បង់សារធាតុការបូនច្រើន។ សត្វស៊ី រុក្ខជាតិ ស្ងួត ឬ ងាប់ បណ្តាលឱ្យមានជម្ងឺពកក (Goitre Hypertrophy of Thyroid gland) ។
- សីតុណ្ហភាពនៅជុំវិញខ្លួនសត្វ បន្ថយការប្រើប្រាស់ចំណី នៅក្នុងសារពាង្គកាយសត្វ ដូចជា បន្ថយទិន្នផលទឹក ដោះសត្វ និង ការច្រៀបជីវជាតិអាហារជាដើម។
- សីតុណ្ហភាព និង សំណើមទៅក្នុងបរិស្ថានខ្ពស់ មានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើប្រព័ន្ធការពារនៃ ប្រដាប់ដក ដង្ហើម និង រំលាយអាហារ។

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

- ភាពត្រជាក់ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ (ស្លូត) ការបញ្ចេញនៃអិលនៃក្លាសស្តើងបណ្តាលឱ្យមានការហើមប៉ោង នៅផ្នែកក្រោមក្លាសអិល (Submacus Oedema)។

- សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ធ្វើឱ្យថយសកម្មភាព ភាពស្តាំ សកម្ម និង ប្រសិទ្ធភាពអង់ទីកងដែលមាននៅក្នុង ខ្លួនសត្វ។

- ស្រ្តេសបរិស្ថានខ្លាំងក្លា បណ្តាលឱ្យមានការរលាកកន្សោមដោះ។ ទាំងនេះវាបណ្តាលពីចុះខ្សោយនៃ ការចាប់មេរោគ (Recuction of Phagocytic Abilities) នៃគោលិកាយាម Leucocyte។

- ការរោគគ្បាតដោយជម្ងឺដង្កូវថ្លើម (Liver fluke) លើសត្វគោទាក់ទិន និង សីតុណ្ហភាព និង ភ្លៀង។

- ព្រូន Nematode ក្នុងក្រពះ ពោះវៀន និង ព្រូនក្នុងស្លូត (Gastroenteritis) បណ្តាលឱ្យមានរលាក ពោះវៀន ក្រពះ (Gastroenteritis) និង រលាកទងស្លូត និង ស្លូត (Parasitic Bronchopneu-monia) ជាញឹកញយដោយសារសីតុណ្ហភាព និង សំណើមបរិយាកាសខ្ពស់។

- ក្នុងអំឡុងពេលគ្មានភ្លៀង ឬ ស្លូតយូរ បណ្តាលឱ្យសត្វមានលេចលើងនូវរោគសញ្ញាខ្វះវីតាមីនអា Vit.A។

- នៅរដូវក្តៅ ហើមសើម គោ និង ជ្រូករងនូវការបំផ្លាញដោយកំដៅ ហើយសត្វសេះអាចរងនូវបាតុ ភូត ដោយខ្វះទឹកក្នុងសារពាង្គកាយ។

- ផ្សែងពុលនៃឧស្សាហកម្ម ភាពអាប័អយធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រដាប់ដង្ហើមសត្វ ក្នុងខណៈដែលសត្វ ស៊ីស្មៅ ឬ រស់នៅទីក្បែរនោះ។

- កាកសំណល់ឧស្សាហកម្ម សារធាតុគីមី សារធាតុពុល។ល។ គឺជាប្រភពប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វ

- ទឹកក្រខ្វក់ ទឹកមានហ្គុយអុរុស (F) និង នីត្រាត (NO3) អាចជាប្រភពបណ្តាលឱ្យសត្វឈឺ។

- ពពួកវារីក្ខជាតិ (Algae) ដែលដុះពាសពេញនៅក្នុងទឹកត្រពាំង បឹង អាងទឹក ដែលនៅនឹងថ្នល់មិន ហូរនៅពេលសត្វផឹកទឹកនោះ ដោយពពួក Algae សត្វអាចទទួលការបំផ្លាញដោយសារធាតុពុល Neurotoxin និង Hepatotoxin របស់ពពួក Microtoxin នៃ Algae ទាំងនោះ។

១១. គោលការណ៍ នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

PRINCIPLES OF DIAGNOSIS

គឺជាវិធីសាស្ត្រ និងទេពកោសល្យដើម្បីធ្វើឲ្យយល់ដឹង និងបង្ហាញអំពីការបង្ក និងធម្មជាតិនៃជម្ងឺ ។

១. ការបែងចែកនៃវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ:

ក. ការថតត្រូ: (Radiology) ជាវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ដែលផ្តល់លទ្ធផលរហ័ស ប៉ុន្តែអាចផ្តល់នូវលទ្ធផលលំអៀងមិនសូវប្រាកដ ។

ខ. រោគវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ (Direct diagnosis) ជាការពិនិត្យផ្ទាល់ទៅលើសត្វដោយភ្នែក ដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវទ្រង់ទ្រាយនៃស្លាកស្នាម និងស្លាកស្នាមដែលជារោគសាស្ត្រ ។

គ. រោគវិនិច្ឆ័យប្រៀបធៀប (Differential Diagnosis) ជាវិធីសាស្ត្ររកកាតខុសគ្នានៃជម្ងឺដោយធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយជម្ងឺស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ។

ឃ. ការវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើការដកចេញរោគសញ្ញា (Method of Elimination) នេះជាវិធីវិនិច្ឆ័យរោគដោយធ្វើការដកចេញរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នានៃជម្ងឺផ្សេងៗ ដែលផ្អែកលើព័ត៌មាននិងហេតុផលច្បាស់លាស់ ។

ង. រោគវិនិច្ឆ័យសាកល្បង (Tentative Diagnosis) នេះជាវិធីបញ្ជាក់ជម្ងឺ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្តូរបុព្វបទជាក់ស្តែង ឆ្លងតាមការពិនិត្យគ្លីនិច ។ វិធីវិនិច្ឆ័យដ៏ប្រាកដមួយ ពុំអាចធ្វើទៅបានដូចជាគ្មានមន្ទីរពិសោធន៍ និងលទ្ធភាពធ្វើតេស្តផ្សេងទៀត ។

ច. រោគវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើរោគសញ្ញា (symptomatic Diagnosis) នៅពេលដែលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើបុព្វហេតុបង្ករោគ ពុំមានលទ្ធផលធ្វើបាន (Etiologically diagnosis is not Possible) និង ការបញ្ចេញរោគសញ្ញាមានសក្ខីណៈខ្សោយ ការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយភ្នែកលើការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋាននៃរោគសាស្ត្រ ហើយប្រការនេះបានត្រូវគេវិភាគទៅតាមការវិនិច្ឆ័យរោគតាមបម្រែបម្រួលនៃរោគសញ្ញា ។

ឆ. រោគវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើហ្វូងសត្វ (Herd Diagnosis)

ជម្ងឺអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើហ្វូងសត្វទាំងមូល នៅកន្លែងមួយចំនួន ។ ក្នុងការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺ គេផ្អែកលើការស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ចំនួនសត្វមួយភាគធំក្នុងហ្វូង ។ ក្នុងករណីបែបនេះការស្លាប់ស្លុង សាកសួរព័ត៌មានស្តីពីហ្វូងសត្វ ជាប្រការសំខាន់ណាស់ ។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្អែកលើការសិក្សាហ្វូងសត្វនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងតាមចំណុចដូចខាងក្រោម ៖

១. ការពិនិត្យពេញលេញទៅលើសត្វក្នុងហ្វូងដែលទទួលការរាតត្បាត និងមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ជាងគេ។

២. ការស្រាវជ្រាវល្អិតល្អន់ ទៅលើបរិស្ថាននៅកន្លែងដែលសត្វរស់នៅដូចជា៖ វាលស្មៅ លក្ខខ័ណ្ឌទ្រុងសត្វ ចំណីនិងទឹកដែលផ្តល់ឲ្យសត្វ ។

៣. ការវះកាត់សាកសពសត្វ (post-mortem examination) ដើម្បីបញ្ជាក់ការប្រែប្រួលសរីរាង្គខាងក្នុងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ សត្វដែលឈឺធ្ងន់អាចបានត្រូវគេសម្លាប់តាមរយៈការចាក់សម្លាប់ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាជាបន្ទាប់ ឬក៏ទេចចោល ។

៤. យកវត្ថុវិភាគចាំបាច់ បញ្ជូលទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ដូចជា លោហិតសាស្ត្រ (Hematology) ការបណ្តុះមេរោគក្នុងលាមក (Coprology) បរាសិតសាស្ត្រ(Parasitology) អតិសុខុមប្រាណសាស្ត្រ(Microbiology) សេរ៉ូមសាស្ត្រ(Serology) តុកូស៊ីនសាស្ត្រ(Toxicology) និងរោសាស្ត្រជាលិការិទ្យា(Histopathology) ជាដើម ។

៥. សត្វទាំងអស់នៅក្នុងហ្វូង បានត្រូវរៀបចំគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនាញផ្សេងៗ ដើម្បីកសាងឲ្យបាននូវ រោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ម្នុំ និងដាក់ចេញនូវដំណោះស្រាយដ៏សមស្របដើម្បីសង្គ្រោះ ហ្វូងសត្វឲ្យបានជោគជ័យ ។

ជ. រោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពិសោធន៍

ជាការសិក្សាបញ្ជាក់ទៅលើវត្ថុវិភាគពីសត្វឈឺ ឬសង្ស័យថា ឈឺដើម្បីបង្ហាញនូវលទ្ធផលរោគវិនិច្ឆ័យ សមស្របនិងច្បាស់លាស់។ វត្ថុវិភាគអាជាឈាម (Blood) ទឹកនោម (Urine) ក្រមប្រដំបៅ លើស្បែក (skin scraping) លាមក (Faeces) សរីរាង្គក្នុង (Viseral organs) ។ ល។ ឯកសារវិធីយក វត្ថុវិភាគ និងបញ្ជូនវត្ថុវិភាគទៅមន្ទីរពិសោធន៍ ។

១២. ប័ណ្ណពិនិត្យកាយសម្បទា

Sheet for Physical Examination

លេខ/No:, ថ្ងៃ ខែ/Date

ម្ចាស់សត្វ/Owner....., អាសយដ្ឋាន/Address.....

ប្រភេទសត្វ/Animal Spp....., ភេទ/Sex....., អាយុ/Age.....,

ទំងន់ /Weight....., ពូជ/Breed....., ពណ៌/Colour.....,

សីតុណ្ហភាព/Temp....., ដំបូល/Pulse rate.....

ចលនាដង្ហើម/Resp. rate.....

ទំលាប់ ភាពសមមាត្រ..... សភាពទឹក.....

(Attitude)

(Conformity)

(Hydration)

- ភាពឃ្នានចំណី..... ក្រពេញជាលិកាក្រោមស្បែក.....
(Appetite status) (Super ficial lymph node)

- ប្រព័ន្ធសាច់ដុំ.....ប្រព័ន្ធដង្ហើម.....
(Musculo-Skeletal system) (Respiratory syst.)

- ពណ៌ភ្នាសស្បើង....., ស្បែក ,ត្រចៀក..... ភ្នែក.....
(Colour of membrane) (Skin) (Ear) (Eye)

- ប្រព័ន្ធលាមរត់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ.....
(Cardiovascular syst.) (Digestive syst.)

- ប្រព័ន្ធទឹកមោត.....ប្រព័ន្ធបន្តពូជ.....
(Vrinary syst.) (Genmetal syst.)

- ប្រព័ន្ធប្រសាទ..... ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន.....
(Nervous syst.) (Endocrine syst.)

កំណត់សំគាល់ /Remarks:

រោគវិនិច្ឆ័យ/Diagnosis:

ព្យាបាល/Treatment:

បសុពេទ្យ/Clinician: ថ្ងៃ ខែ/Date.....

សំគាល់: N- Normal; A- Abnormal

(Diagnostic Report)

មហាវិទ្យាល័យវេ.ស

ផ្នែករោគសាស្ត្រ

Faculty of Animal V.M
Pathology)

(Division of

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

ម្ចាស់ឈ្មោះ:.....ClinicNO.....

អាសយដ្ឋាន.....បសុពេទ្យ.....

.....អ្នកវិភាគរោគសាស្ត្រ.....

- ប្រភេទសត្វ: Cattle.....ពូជ.....ភេទ.....
- អាយុ.....ទម្ងន់.....ស្នាមសម្គាល់.....
- សត្វស្លាប់ ឬសម្លាប់?.....សត្វស្លាប់នៅពេលណា?.....
- ធ្វើ Autopsy នៅពេលណា?.....

១/ ប្រវត្តិសត្វ (History Taken):.....

Symptom: Diarrhoea or Emaciation Sometime Animal may be Clinically normal.

២/ Macroscopic Finding: សណ្ឋានសាកសព (State of Carcass)

Intergumentary System: Emaciated

- ស្បែក Gelatinous Atrophy
- រោម.....

- Respiratory System

- o ប្រមុះ (Nose): Ulceration/Mucopurulent Material

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

- បំពង់ខ្យល់(Trachea): Lesion start from bronchiol to alveolus
- ស្បែក(Lung): Broncho Pneumonia/Caseous lobular broncho pneumonia (whole lobes are affected)

Lymph node³ Tubercular nodules Characteristic lesion

Gastro-Intestinal System

– Gastro-Intestinal System:

- ធ្មេញ (Teeth) Lesion is enclosed with fibrous capsul
- អណ្តាត(Tongue).....
- បំពង់អាហារ(Oesophagus).....
- ក្រពះ(Stomach)'.....
- ពោះវៀន(Inteline) : Small.....Large.....Nodule Gaseous
- ល្អិត(Livre) : Mesenteric lymph gland affected when intestine was infected, Hematogenous infection nodular lesion thick Capsul/Yellow surface Abscess/ Cirrhotic form
- ផ្កាសាយ(Spleen):.....

- Peritonitis:
- Viseral Layer³ Are thickened by granulation tissue
- Mostly in Calves adult always Secondary
- * Myco-Strain:

Human Strain (Myco-Tuberculosis) Infective to Human and Animal

Bovine Strain (Myco-bovis) - infected to man and Animals

Avian train (Myco- Avium)- infective to fowls and animals

Cold Blood Swain (Myco-Marinum)- infective to cold blood Animals

Vole bacillus (Myco-microti)- infective to Voles only

* Route of Infection:

a- Aerogenous or Inhalation

- By droplet infection
- Dush inhalation (feces, Urine...)

b- Enterogenous or ingestion

- Buccal Mucosa
- Pharygeal Mucosa
- Intestinal Mucosa

c- Usual Routes

- Cutaneous in Contact Case
- Congenital Via Plascenta, Umbilicus
- Genital by Copulation (ពាក់គ្នា)
- Mammary through the teats into the udder

Cattle

- Caseation and Calcification

- Not so

- Zone of lymphocyte is present

- Tuberculous organism be demonstrated in the lesion

- sometime depend

Horse

- Rare, Lesions are chronic and proliferative

- Appearance is like Sarcoma

- Not present

- Difficult to find T. organism in the lesion

- Spleen always

Bovine

-Nodule is caseation and calcification and surrounded by fibrous capsules

- Caseation in hepatic lesion liquefies

- Lymph node enlarge and caseation and calcification

Avian

- Lesion is prolife Rative-chronic

-Hepatic lesion is not liquefy or calcify

- lymph node -slightly enlarge

on congenital affected tuberculosis

- Cardiovascular System:
 - សរសៃឈាម (Blood Vessel).....
 - បេះដូង (Heart).....
- Urinary System:
 - តម្រង់នោម(Kidney) Start from interstitial tissue into the Cortex/Miliary form
 - ផ្លោកនោម(Urinary Bladder) Lesion Spread from Kidney is Possible
- Skeletal System:
 - ប្រពន្ធខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង (CNS) Meningitis (Cerebral)
 - ក្រពេញទឹករងៃ(Lymph Node) pulmonary lymph node Necrosis
 - សភាពឆ្អឹង(Bone) Mostly in youngខួរឆ្អឹង (Bone Marrow)³ Tubercular granuloma
 - សាច់ស្អុំ (Muscle).....
- Reproductive System:
 - Mastitis: Increased in size and firm in consistency (Normal in section is garnish white and soft but in tuberculosis yellowish or brown and hard in consistency

Gross Diagnosis: Caseous lobular Broncho-pneumonia

Comment: Tuberculosis

Date of Report.....

Slide No.....

1- Microscopic Finding:

- បេះដូង(Heart).....
- ពោះវៀន (Intestine): Small (duodenum Jejunum, ileum).....
- Large (Colon, Coecum, retum).....
- សួត(Lung) Mycobacterium Organism is present

សញ្ញាណរោគសាស្ត្រសត្វ

- ថ្លើម (Liver).....
- ផាស (Spleen).....
- តម្រងនោម (Kidney).....
- ខួរក្បាល (Brain) (Medular, Cerebrum, cerebellum).....
-
-
- Nerve.....
-

Final Diagnosis: Date:.....

Signature Tuberculis

Diagnosis:

- 1- Tuberculin Test (Cattle-Skin of neck region Pig-skin of ear, Fowl- Wattle
- 2- TB must be differentiated from asperation Pneumonia (Lung Absceses), Traumatic Reticulitis and contagious bovine Pneumonia
- 3- Find Charateristic lesion at Autopsy
- 4- Biological Test:
 - Inaculation to Guinea-Pig
 - Necropsy after 6-7 Weeks-Tuberculosis lesion

របាយការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យ

(Diagnostic Report)

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

ម្ចាស់ឈ្មោះ:.....ClinicN^o.....

អាស័យដ្ឋាន.....បសុពេទ្យ.....អ្នកវិភាគរោគសាស្ត្រ.....

.....

- ប្រភេទសត្វ៖ Cattle.....ពូជ.....ភេទ.....
- អាយុ.....ទម្ងន់.....ស្នាមសម្គាល់.....
- សត្វស្លាប់ឬសម្លាប់?.....សត្វស្លាប់នៅពេលណា?.....
- ធ្វើ Autopsy នៅពេលណា?.....

១/ ប្រវត្តិសត្វ (History Taken):.....

Symptom: Diarrhoea or Emaciation Sometime Animal may be Clinically normal.

២/ Macroscopic Finding៖ សណ្ឋានសាកសព (State of Carcass)

Intergumentary System: Emaciated

- ស្បែក Gelatinous Atrophy
- រោម.....

- Respiratory System

- o ប្រមុះ (Nose): Ulceration/Mucopurulent Material
- o បំពង់ខ្យល់(Trachea): Lesion start from bronchiol to alveolus
- o សួត(Lung): Broncho Pneumonia/Caseous lobular broncho pneumonia (whole lobes are affected)

Lymph node³ Tubercular nodules Characteristic lesion

Gastro-Intestinal System

- Gastro-Intestinal System:

- o ធ្មេញ (Teeth) Lesion is enclosed with fibrous capsul
- o អណ្តាត(Tongue).....
- o បំពង់អាហារ(Oesophagus).....
- o ក្រពះ:(Stomach):Mucosa.....

- ក្រពះ:(Stomach) Mucosa Smooth
- ពោះវៀន(Intestine) Small –Ileum.....Large- thinckaned from 2 – 20 times
- ថ្លើម(Liver).....
- ផាល(Spleen).....
- Peritonitis.....

Mycobacterium:

- Para-tuberculosis (Strain):
 - Bovine- not affected to sheep
 - Ovine- affected in sheep of Scotland and Cattle also
- Route of Infection – Ingestion
- Diagnosis:
 - 1- Symptom
 - 2- 2- examination of Bowel Washings
 - 3- Make smear from rectal Pinch to find acid- fast organism
 - 4- Intradermal test by Johnin in the neck
 - 5- Intravenous Johnin Test
 - 6- Lesion of the Bowel at Postmortem and Microscopic demonstration of the Organisms in the epithelioid cells in Section
 - 7- Lymphocyte blood Lymphocytes + antigen get Stimulated- Positive get not Stimulated- Normal

• **Cardiovascular System:**

- សរសៃឈាម(Blood Vessel).....
- បេះដូង(Heart).....

• **Urinary System:**

- តម្រងនោម (Kidney) Start from interstitial tissue into the Cortex/Miliary form
- ផ្លែកនោម (Urinary Bladder)³ Lesion Spread from Kidney is Possible

• **Skeletal System:**

- ប្រពន្ធខួរក្បាល និងឆ្អឹងខ្នង (CNS):
- ក្រពេញទឹករងៃ (Lymph Node): Lymphangitis (Mesenteric lymph gland)
- សភាពឆ្អឹង(Bone):.....ខួរឆ្អឹង(Bone Marrow):.....

- សាច់ដុំ(Muscle):
- Reproductive System:.....
.....
.....
.....
.....

Gross Diagnosis.....

Comment.....

Date of Report.....

Slide N^o:

3- Microscopic Finding:

- បេះដូង (Heart)³ Arterisclerosis of Intestinal Vessel
- ពោះវៀន (Intestine): Small (duodenum, Jejunum, ileum):Thickened Villi and Intestinal Gland Disappear/Giant Cell Large (Colon, Coecum, rectum)³ Tubercle Formation Mesenteric lymph node-Swollen and Jucy
- ថ្លើម (Liver)³ Foci of Epithelioid Cell and lymphocyte
- ផាស្បាត (Spleen).....
- តម្រងនោម (Kidney).....
- ខួរក្បាល (Brain) (Medular, Cerebrum, cerebellum).....
.....
.....
- Nerve:
.....

Final Diagnosis:

Date:.....

Johne's Disease

Signature

Paratuberculosis

របាយការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យ

(Diagnostic Report)

មហាវិទ្យាល័យវ.ស

Faculty of Animal V.M

ផ្នែករោគសាស្ត្រ

(Division of Pathology)

ម្ចាស់ឈ្មោះ:.....ClinicN^o.....

អាសយដ្ឋាន.....បសុពេទ្យ.....

អ្នកវិភាគរោគសាស្ត្រ.....

- ប្រភេទសត្វ៖ Buffeloes.....ពូជ.....ភេទ.....
- អាយុ.....ទម្ងន់.....ស្នាមសម្គាល់.....
- សត្វស្លាប់ ឬសម្លាប់?.....សត្វស្លាប់នៅពេលណា?.....
- ធ្វើ Autopsy នៅពេលណា?.....
- រោគវិនិច្ឆ័យគ្លីនិច (Clinical Diagnosis).....

១/ ប្រវត្តិសត្វ (History Taken):.....

Symptom: Black/Green/Blue region on the Skin, t^o, Crepitation when Palpation Lymb-lame

២/ Macroscopic Finding៖ សណ្ឋានសាកសព (State of Carcass)

Intergumentary System: Emaciated

- ស្បែក Lesion Dark when it is opened, and smelling fluid
- រោគសញ្ញា.....

- Respiratory System
 - o ច្រមុះ (Nose): មានបញ្ហាហូរឈាមថ្លា
 - o បំពង់ខ្យល់(Trachea):.....
 - o សួត(Lung): Interlobular Edema
- Gastro-Intestinal System: Blood
 - o ធ្មេញ (Teeth).....
 - o អណ្តាត(Tongue).....រលាក.....
 - o បំពង់អាហារ(Oesophagus).....
 - o ក្រពះ:(Stomach) Mucosa Smooth
 - o ពោះវៀន(Intestine) Small -Ileum.....Large- thinckaned from
 - o ថ្លើម (Liver) ងាយផុយរលួយ
 - o ផាល (Spleen)³ Yellow Necrotic foci Containing gas
- Cause: Clostridium Chauvoei
- Route of Infecction:

- Ingestion
- Wound Infection (Castratom Shearing)
- Dignosis:
 - Smear Examination of Fluid of Swelling (Gram +, ropd Shap, subterminal Spores)
 - Biological Test:

យកជាលិកាសាច់ដុំរលាកមួយចំណិតដាក់ក្នុង Steril Saline បន្ទាប់មកច្រោះ។

ទឹកចម្រោះនោះត្រូវយកត្រាំក្នុងទឹកក្តៅ ៦០អង្ស រយៈពេល ១ ទៅ២ម៉ោង។

យកមួយមីលីលីត្រនៃសូលុយស្យុងនេះចាក់ឡើយ Guinea Pig

តាមស្បែកជាមួយគ្នានេះគេចាក់សូលុយស្យុង Chlorid 10%តាមក្រោយ។

ប្រសិនបើសូលុយស្យុងនោះមាន Spore នៃ Clo. Chauvoei Guirea Pig ងាប់បន្ទាប់ពី

៤៨ម៉ោងក្តោយចាក់។ រយៈកកញ្ចក់ផ្ចិតថ្លើមមើលវត្តមាន Organism ដែលមាន Gram + និងមាន Sub-terminal spore។

- Fluorescent Antibody Techmique។
- Cardiovascular System:
 - សរសៃឈាម (Blood Vessel).....
 - បេះដូង (Heart) Fibrino-Hemorrhagic Pericarditis and Endocarditis (Auricle-Ulcerative Endocarditis), Dark, degenerative Changes/Thrombi
- Urinary System:
 - តម្រងនោម (Kidney) Degeneration
 - ផ្លែកនោម (Urinary Bladder).....
- Skeletal System:
 - ប្រពន្ធខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង (CNS)
 - ក្រពេញទឹករងៃ (Lymph Node) Regional lymph gland swollen and Hemorrhage
 - សភាពឆ្អឹង (Bone).....ខួរឆ្អឹង (Bone Marrow).....
 - សាច់ដុំ (Muscle) Gas នៅកន្លែងសាច់ដុំរលាក Black due to the formation Iron sulphide (Fe from blood and Muscle) and H₂S
- Reproductive System:.....
-
-
-

Gross Diagnosis: Fibrino-Hemorrhagic Pericarditis/Endocarditis

Comment: Muscle Fibro Inflammation Emphysema

Report..... Date of
Slide
No:.....

3/ Microscopic Finding:

- បេះដូង (Heart) Hemorrhagic Inflammation (Valve)
- ពោះវៀន (Intestine): Small (duodenum, Jejunum, ileum): Intestine: Present Numerous Bacteria/Leucocytic Infiltration Large (Colon, Coecum, rectum)³ Tration
- សាច់ដុំ Degeneration/coagulation Necrosis (Caused by Toxin), ជាកោសិកាសាច់ដុំក្បែរ Neighbouring affected muscle show fatty degeneration
- ប្លឺម (Liver) Degeneration
- ផាស (Spleen) Degeneration
- តំរងនោម (Kidney).....
- (Brain) (Medular, Cerebrum, cerebellum).....
-
-
-
- Nerve.....

Final Diagnosis: Date:.....

Johne's Disease Signature.....

Blackleg